

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ****Видизик 0.2% гел за очи****Vidisic 0.2% eye gel****carbomer / карбомер**

17.30.01.01.01 Листовка - Гранулирана	3201 20.10.08
Към РУ №: .....	
Одобрено: 22/16.09.08	

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Видизик и за какво се използва
2. Преди да използвате Видизик
3. Как да използвате Видизик
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Видизик
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИДИЗИК И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА****Терапевтични показания**

Заместване на слъзната течност в случаите на нарушен производство на сълзи, симптоматично лечение на "сухо око".

**2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИДИЗИК****Противопоказания:**

*Кога не трябва да употребявате Визидик?*

Не употребявайте Визидик, в случай на свръхчувствителност към лекарственото вещество или някое от помощните вещества на този лекарствен продукт.



**Обърнете специално внимание при употребата на Видизик**

*Какви предпазни мерки трябва да се съблюдават?*

**Моля, забележете:** Преди прилагане на Видизик, носещите контактни лещи трябва да ги свалят и да почакат 15 минути преди да ги поставят отново.

**Употреба на Видизик с други лекарства**

*Кои други лекарствени продукти имат влияние върху действието на Видизик или могат да бъдат повлияни от Видизик?*

Досега не са известни специфични взаимодействия.

**Моля, забележете:**

Ако Видизик се използва съвместно с други очни капки, трябва да има интервал от приблизително 5 минути между приложенията. Ако Видизик се използва съвместно с други очни мази, трябва да има интервал от приблизително 15 минути между приложенията.

Видизик трябва да бъде винаги последния приложен лекарствен продукт.

**Бременност и кърмене**

*Какво трябва да имате предвид при бременност и кърмене?*

Не са провеждани проучвания с Видизик при бременни жени, но от друга страна няма подозирани фактори, насочващи против употребата на Видизик по време на бременност и кърмене.

Въпреки това, този лекарствен продукт може да се прилага по време на бременност и кърмене само след внимателна преценка на възможните ползи, срещу възможните рискове.

**Шофиране и работа с машини**

*Какво трябва да съблюдавате, при улично движение или ако работите с машини или работите без сигурна опора?*

След приложение на този лекарствен продукт в конюнктивалния сак на окото, може да се прояви замъгливане на зрението само за няколко минути като се виждат ивици. Затова, докато зрението е замъглено Вие не трябва да шофирате или да работите с машини.

**3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИДИЗИК**

**Дозировка, начин на употреба и продължителност на приложение**

Bulgarien



*Колко Визидик трябва да употребявате и колко често трябва да го прилагате?*

Лечението на синдрома на "сухо око" изисква индивидуализиран режим на дозиране.

В зависимост от тежестта и интензитета на оплакванията, трябва да се поставя 1 капка в конюнктивалния сак 3-5 пъти дневно или по-често, както и около 30 минути преди лягане.

Видизик е подходящ за продължително лечение.

Когато Видизик се използва за терапия на сухо око, което обично се превръща в дългосрочно и продължително лечение, е необходима консултация с очен лекар.

#### **Ако сте използвали повече от необходимата доза Видизик**

*Какво трябва да направите, ако приложената доза Видизик е много голяма (планирано или предозиране поради грешка)?*

Не са известни случаи на предозиране.

#### **Ако сте пропуснали да използвате Видизик**

*Какво трябва да правите, ако дозата на Видизик която сте приложили е много малка или ако сте пропуснали доза?*

Ако дозата е твърде малка или сте пропуснали доза, моля, поставете гела за очи, възможно най-скоро, за да наваксате пропуснатата доза. Не прилагайте двойна доза гел за очи, а в последствие следвайте същия режим на дозиране и интервали/ритъм, споменат по-горе или каквото Ви е препоръчал лекаря.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

*Какви нежелани реакции могат да се появят по време на лечение с Видизик?*

В изолирани случаи могат да се проявят реакции на непоносимост към активното или някое от помощните вещества. Видизик съдържа консерванта цетримид, който може да предизвика, особено при по-често и продължително прилагане, очно дразнене (парене, зачеряване и усещане за чуждо тяло) и може да увреди епитела на роговицата.

Ако имате такива симптоми за продължително лечение на сух кератоконюнктивит трябва да се предпочитат лекарствени продукти без консервант.

*Какви мерки трябва да се предприемат, ако се проявят нежелани реакции?*

Ако се проявят реакции на свръхчувствителност или очно дразнене, моля, прекъснете лечението и се консултирайте с Вашия лекар.

Моля, забележете:



Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

## 5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВИДИЗИК

### Специални бележки за стабилността на лекарствения продукт

Лекарственият продукт не трябва да се употребява след изтичане на срока на годност (виж външната опаковка и тубата).

Изхвърлете всяко неизползвано количество шест седмици след първото отваряне на тубата. Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

## 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### Какво съдържа Видизик

- Активното вещество е: карбомер (*carbomer*)  
1 g гел за очи съдържа 2 mg карбомер (вискозитет 40.000 – 60.000 mPa.s).

- Другите съставки са: цетримид, сорбитол, натриев хидроксид и вода за инжекции.

### Как изглежда Видизик и какво съдържа опаковката

Опаковка, съдържаща 10 g гел за очи в туба

### Притежател на разрешението за употреба и производител

Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH,  
Brunsbuettel Damm 165-173,  
13581 Berlin,  
Германия  
Тел.: +49 (0)30 33093-300  
Факс: (++49) (30) 33093-350  
E mail: ophthalmika@bausch.com

Дата на последно одобрение на листовката: юли 2005



**Dr. Mann Pharma /**  
**www.mannpharma.de**

(Printing No.)  
(EDP-No.)


(Лого Dr. Mann Pharma)  
(Лого Bausch&Lomb)

**Dr. Mann Pharma****Свойства**

Видизик е течен гел. Той е лесен и удобен за употреба, когато следвате инструкциите за приложение. Поради големия си вискозитет, Видизик е особено подходящ за лечение дори на тежки симптоми на синдрома на "сухо око". Видизик образува защитен филм с висока способност за прилепване и трайност и дълго поддържа роговицата и конюнктивата влажни, така че при тежки случаи са достатъчни относително малко на брой дози (3 до 5 пъти дневно) за намаляване на оплакванията и подобряване на състоянието.

Видизик е с добра поносимост. Когато се налага, той също може да се прилага по-често.

Видизик се произвежда при стерилни условия и е обект на стриктни критерии за качество. Затова, внимавайте да не докосвате върха на тубата с пръстите си, когато използвате тубата и не допирайте върха на тубата до повърхността на окото. След употреба, затворете тубата като поставите защитната капачка.

**Моля, забележете!****Указания за употреба!**

Наклонете назад главата си и нежно дръпнете надолу долния си клепач с показалеца. С другата си ръка вземете тубата, надолу във верикално положение, без да докосвате окото, и поставете една капка в конюнктивалния сак. Опитайте да затворите бавно клепача и да го движите така, че гелът за очи да се разпредели равномерно.

**Моля, забележете!**

Гелът произведен от Dr. Mann Pharma е наличен в тури с плоска капачка, позволяваща тубата да се поставя в изправено положение.



**Моля, забележете:**

Вискозитетът, споменат в частта „активно вещество“ (виж по-горе) е изразена в съответствие със законовите изисквания и се отнася само за активното вещество (= карбомер) на този лекарствен продукт. Крайният продукт Видизик е с вискозитет 3,800-5,600 mPa·s.



Уважаеми пациенти,

Вашият офтالмолог е диагностицирал, че Вие страдате от "сухо око". Тази клинична картина е толкова често нарушение, че един от пет пациента, които бъдат прегледани от очен лекар страдат от състоянието сухо око.

Има много причини, като намалено произвеждане на сълзи в напреднала възраст, работа в стая с климатик, работа пред монитор, или хормонални промени по време на менопаузата. Накрая, в развитието на състоянието сухо око играе роля и негативното влияние на околната среда и климата.

#### Какво разбираме под термина "сухо око"?

По време на деня ние мигаме приблизително 14 000 пъти. С всяко мигателно движение върху повърхността на очната ябълка се разпределя много тънък слъзен филм, който я прави гладка, чиста и влажна, и защитава окото от замърсители. Когато се наруши обема или състава на слъзния филм, настъпва феномен на изсушаване на корнеята и конюнктивата, и пациентът изпитва симтоми като парене, чувство за сухота в окото, и за "песъчинки", чувство на напрежение, и чувствителност към светлина.

#### Какво можете да направите?

Вашият лекар Ви е назначил заместител на сълзи за облекчение на Вашите оплаквания. В допълнение към последователната употреба на продукта като е назначено, трябва да следвате долните препоръки:

- Проветрявайте апартамента или къщата си няколко пъти дневно
- Погрижете се да пияте достатъчно течности (поне 2 литра дневно)
- Често излизайте на чист въздух
- Не насочвайте свежия въздух от климатика към очите си
- Почивайте по време на работа пред монитор.

**Въпреки това, е важно също да се консултирате редовно с Вашия офталмолог за последващо проследяване, защото състоянието на сухо око, могат да доведат до сериозно заболяване, ако се третират погрешно или неадекватно.**

*Допълнителна информация можете да получите от представителството на Dr. Mann Pharma.*

За да се опазва околната среда Dr. Mann Pharma е използвала само изцяло рециклируеми материали като полиетилен (PE), хартия и картон за опаковане на този офталмологичен продукт

