

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ABRICORT® 0,25 mg/g ointment
АБРИКОРТ® 0,25 mg/g маз
Флуоцинолонов ацетонид

**ИАЛ
ОДОБРЕНО!**
ДАТА R-8531/12-11-08

**ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА
ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

- *Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.*
- *Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!*
- *Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.*

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Абрикорт® маз и за какво се прилага
2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Абрикорт® маз
3. Как се прилага Абрикорт® маз
4. Възможни нежелани реакции
5. Условия на съхранение
6. Допълнителна информация

Абрикорт маз

Лекарствено вещество в 100 g маз: Флуоцинолонов ацетонид (Fluocinolone acetonide) 0.025 g,

Помощни вещества: пропиленгликол; полисорбат 60 ; лимонена киселина, безводна; метил парагидроксибензоат; пропил парагидроксибензоат; бял вазелин.

Абрикорт® маз 15 g в двойно лакирани алуминиеви туби

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД

ул."Атанас Дуков " 29

1407, София България

България Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771


Производител

"Балканфарма-Разград" АД

бул."Априлско въстание" №68

Разград-7200

Тел. 084613318



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АБРИКОРТ МАЗ И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Абриорт маз съдържа флуоцинолон, синтетичен кортикоステроид с противовъзпалителен и антиалергичен ефект.

Абриорт маз се прилага за лечение на краткотрайно лечение на локални неинфекцирани дерматози и възпаления, придружени от сърбеж и алергични промени по кожата като:

- Дерматити (контактен, атопичен, инсектен);
- Екземи (алергична контактна);
- Еритема мултиформе;
- Лупус еритематозус;
- Псориазис вулгарис;
- Лихен рубер планус.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С АБРИКОРТ МАЗ

Абриорт маз не се прилага при:

- лица с доказана в миналото свръхчувствителност към някои от компонентите на продукта;
- морбили, варицела, рубеола, други вирусни кожни заболявания, микози;
- акне вулгарис, розацея и периорален дерматит.

При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:

Не се препоръчва продължителна употреба на продукта над 2 седмици. При продължително лечение нараства рисъкът от нежеланите реакции и системни ефекти. При деца резорбцията е по-голяма, затова те са изложени на по-голям рисък от появя на системните ефекти на кортикоステроидите.

При развитие на инфекция на засегнатото място се прилагат подходящи антибактериални и антигъбични средства. Ако инфекцията продължава, лечението с продукта се прекратява.

Прилагането на продукта върху клепачите трябва да става с повищено внимание поради опасност от изостряне симптомите на съществуващи перде на очите и повищено въtreочно налягане (катаракта и глаукома).

Прилага се с повищено внимание при пациенти със съществуваща кожна атрофия.

Ако се използват оклузивни превръзки или се третират големи участъци от кожата съществува опасност от увеличаване на системната резорбция на препарата и засилване на системните му ефекти.

Съдържанието на парабени (метил и пропил парагидроксибензоат) в Абриорт маз може да причини уртикария, контактен дерматит и много рядко бронхоспазъм.

Приложение на Абриорт маз и прием на храни и напитки



Абрикорт маз е продукт за локално приложение.

Бременност

Преди прием на каквите и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

При бременност и кърмене да се избягва прилагането на продукта, особено продължително време, в големи количества и върху обширни повърхности.

Кърмене

Преди прием на каквите и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

При бременност и кърмене да се избягва прилагането на продукта, особено продължително време, в големи количества и върху обширни повърхности.

Шофиране и работа с машини

Абрикорт маз не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Приемане на други лекарства

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или сте приемали скоро други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар

Няма данни за установени лекарствени взаимодействия. Въпреки това по време на лечението пациентът не трябва да се ваксинира срещу вариицела и други заболявания, особено ако продуктът се прилага на обширни площи.

Дани за помощните вещества

Съдържанието на парабени (метил и пропил парагидроксибензоат) в Абрикорт маз може да причини уртикария, контактен дерматит и много рядко бронхоспазъм.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА АБРИКОРТ МАЗ

Винаги прилагайте Абрикорт маз според инструкциите на лекуващия лекар!

Продуктът е за локално приложение.

Абрикорт маз се прилага под формата на тънък филм се прилага върху засегнатия участък 1-2 пъти дневно в зависимост от тежестта на заболяването. Оксмените части се обръзват, за да се осигури директен контакт с лезиите. Тази форма на продукта се прилага при дерматози със изразена сухота на кожата, като при нея е налице по-дълбоко проникване на лекарственото вещество.

За лечение на псoriазис или на трудно подаващи се на лечение дерматози могат да се използват и оклузивни превръзки. Те се сменят 3-4 пъти дневно или по-често, по преценка на лекаря. При проява на резистентност или допълнителна



инфекция трябва да се прекрати използването на оклузивна превъръзка и да се продължи лечението с подходящо антимикробно средство.

Непрекъснато лечение с продукта може да се прилага не повече от 2 седмици.

Продуктът не се прилага при деца до 2 години. При деца над 2 години се прилага с внимание и върху малка кожна повърхност. Не се прилага върху лицето, освен в случаите на абсолютна необходимост и то не по-дълго от 1 седмица.

Ако сте приели по-голямо количество от лекарството:

При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар!

Наблюдаваните при предозиране симптоми съвпадат с описаните по-горе нежелани лекарствени реакции, особено при по-продължително лечение и при приложение върху големи площи.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всеки друг лекарствен продукт, Абрикорт маз може да предизвика нежелани лекарствени реакции

При продължително прилагане на Абрикорт маз могат да се появят акне, зачеряване (стериоидна пурпura), атрофия на епитела и подкожната тъкан, сухота на кожата, промени в пигментацията, стрии, разширени кожни съдове, периодичен дерматит.

Когато продуктът се прилага върху интертригинозна и флексорна повърхност или върху лицето, тези промени могат да се получат и за по-кратко време. При прилагане върху клепачите може да се развие перде на очите и повишено вътречно налягане (катаракта и глаукома).

Понякога могат да се появят уртикария или други кожни обриви, както и влошаване на съществуващите промени.

При продължително прилагане върху големи площи локалните кортикоステроиди могат да проникнат в кожата в достатъчни количества, за да се появят някои от нежеланите лекарствени реакции, характерни за системно приложените кортикостероиди.

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ


При температура под 25⁰C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност: 2 (две) години

След първоначално отваряне на опаковката, съдържанието да не се употребява повече от 28 дни!

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ



За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД
ул."Атанас Дуков " 29
1407, София България
България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Ноември 2008 г.

