

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ДОКСИПРОКТ ПЛЮС 40 mg/ 20 mg/ 250 mg/g маз DOXIPROCT® PLUS 40 mg/ 20 mg/ 250 mg/g ointment

калциев добезилат монохидрат/ лидокаинов хидрохлорид/ дексаметазонов ацетат
Calcium dobesilate monohydrate/ lidocaine hydrochloride/ dexamethasone acetate

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка :

1. Какво е ДОКСИПРОКТ ПЛЮС и за какво се използва
2. Преди да приемете ДОКСИПРОКТ ПЛЮС
3. Как да приемате ДОКСИПРОКТ ПЛЮС
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на ДОКСИПРОКТ ПЛЮС
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №:	11-3645, 01.12.08
Одобрено:	09.10.07

1. КАКВО Е ДОКСИПРОКТ ПЛЮС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ДОКСИПРОКТ ПЛЮС е маз съдържаща calcium dobesilate monohydrate (калциев добезилат монохидрат), протектиращ съдовите агент, lidocaine hydrochloride (лидокаинов хидрохлорид), локален анестетик и dexamethasone acetate (дексаметазонов ацетат), кортикостероид повлияващ възпалението.

Показан е при лечението на вътрешни и външни болестно променени хемороиди, анален пруритус, анална екзема, анитис, перианитис, крипититис, папилитис, остра хемороидна тромбоза, анални фисури, пре- и постоперативно лечение, в случаите на оперативно отстраняване на болестно променени хемороиди.


2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗАТЕ ДОКСИПРОКТ ПЛЮС

Не използвайте ДОКСИПРОКТ ПЛЮС:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към лекарствените вещества или към някоя от останалите съставки на ДОКСИПРОКТ ПЛЮС,

Обърнете особено внимание с ДОКСИПРОКТ ПЛЮС:

- в случай на бъбречна недостатъчност, продължителното лечение с ДОКСИПРОКТ ПЛЮС трябва да се избягва. То трябва да се избягва поради възможна системна резорбция на кортикостероида дексаметазон ацетат.
- в случай на кръв в изпражненията или при подозрения за наличие на такава, както и при едновременна поява на болка или треска е необходима консултация с лекар.
- в случай на реакции на свръхчувствителност, лечението трябва да бъде преустановено.



Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене:

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Важна информация относно някои от съставките на ДОКСИПРОКТ ПЛЮС:

ДОКСИПРОКТ ПЛЮС съдържа помощното вещество бутилхидроксианизол, което може да има дразнещ ефект върху очите, кожата и лигавиците.

3. КАК ДА УПОТРЕБЯВАТЕ ДОКСИПРОКТ ПЛЮС

Винаги прилагайте ДОКСИПРОКТ ПЛЮС точно както Ви е казал Вашият лекар. Трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Обичайната доза е 2-3 апликации дневно.

Мазта се прилага сутрин и преди лягане, ако е възможно, след дефекация.

В случай на вътрешни болестно променени хемороиди да се използва каниолата, която се завинтва към тубата. Вкарайте каниолата, колкото е възможно по-дълбоко в ануса и натиснете леко тубата, докато я изваждате. При такова прилагане, тубата е достатъчна за 8 апликации.

В случаите на външни болестно променени хемороиди или анален пруритус, няколко пъти дневно да се нанася тънък слой маз.

Вашият лекар определя продължителността на лечението. Не променяйте начинът на приложение на ДОКСИПРОКТ ПЛЮС самостоятелно. Консултирайте се с лекаря, ако имате впечатлението, че ефикасността от лечението е твърде слаба или изразена.

Ако сте приложили повече ДОКСИПРОКТ ПЛЮС, отколкото е трябвало:

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте забравили да приложите ДОКСИПРОКТ ПЛЮС:

Не прилагайте двойна доза, за да наваксате пропуснатата единична доза.

Ако сте спрели употребата ДОКСИПРОКТ ПЛЮС:

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

акто всички лекарства, ДОКСИПРОКТ ПЛЮС може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщените нежелани реакции са промяна в чревния пасаж, преходни усещания за парене, локална болка.

Не може да бъде изключено появата на атрофия на кожата на третираната област, след продължително лечение с ДОКСИПРОКТ ПЛЮС.

Могат да настъпят реакции на свръхчувствителност, съвместно с кожни реакции и/или треска, които могат да са с алергичен произход.



Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКСИПРОКТ ПЛЮС

Съхранявайте на място недостъпно за деца.

Мазта трябва да се пази от топлина.

Не използвайте ДОКСИПРОКТ ПЛЮС след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и тубата, след съкращенията «ГОДЕН ДО:». Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте ДОКСИПРОКТ ПЛЮС ако забележите видими белези на нарушаване качеството на продукта.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа ДОКСИПРОКТ ПЛЮС:

- Лекарствените вещества са calcium dobesilate monohydrate (калциев добезилат монохидрат), lidocaine hydrochloride (лидокаинов хидрохлорид) и dexamethasone acetate (дексаметазонов ацетат).
- Помощните вещества са полисорбат 80, пропилгалат, бутилхидроксианизол, безводна лимонова киселина, цетилов алкохол, полиетиленгликол 300, полиетиленгликол 1500, полиетиленгликол 4000 и пропиленгликол.

Как изглежда ДОКСИПРОКТ ПЛЮС® и какво съдържа опаковката

Алуминиева туба с 20 g.

Притежател на разрешението за употреба:

OM Portuguesa, Rua da Industria No 2, Quinta Grande, 2720-302 Amadora, Португалия

Производител:

- отговорен за освобождаване на продукта за територията на ЕС:

OM Portuguesa, Rua da Industria No 2, Quinta Grande, 2720-302 Amadora, Португалия

и

OM PHARMA, 22 rue du Bois-du-Lan, 1217, Meyrin 2 / Geneva, Швейцария

Дата на последно одобрение на листовката: Октомври 2008

