

**Информация за пациента**  
**Tavipex - capsules 150 mg gastro-resistant capsules**  
**Тавипек - 150 mg стомашно устойчиви капсули**

**Активно вещество:** Лавандула, етерично масло (Lavandulae latifoliae aetheroleum)

**Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.** Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 14 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Тавипек и за какво се използва
2. Преди да приемете Тавипек
3. Как да приемате Тавипек - капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тавипек
6. Допълнителна информация

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b>	
<small>Листовка - Приложение 2</small>	
Към РУ №: 3589	24.11.08
Одобрено: N-8/24-11-2008	

## **1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАВИПЕК И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

**Как действа Тавипек:**

Тавипек – капсули съдържат лавандулово масло, чиста растителна активна съставка, която е етерично масло от лавандула.

Тавипек, улеснява отхрачването, притежава антимикробен ефект и повишава неспецифичните защитни сили на организма.

**За какво се използва:**

Растителен лекарствен продукт

Използва се като отхрачващо и спомагателно средство към антибиотичното лечение при:

- остър и хроничен бронхит (възпаление на бронхиалните пътища)
- бронхиектазии (разширение на бронхиалните пътища)
- кашлица при пушачи
- синусит (възпалени синуси)

## **2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕМЕ ТАВИПЕК**

**Не премайте Тавипек** ако сте алергични (свръхчувствителни) към лавандулово масло или към някоя от останалите съставки на Тавипек.

**Обърнете специално внимание при употребата на Тавипек** ако симптомите продължават или ако не се наблюдава подобряване на състоянието след употребата на Тавипек. Вие трябва да се консултирате с Вашия лекар колкото е възможно по-бързо. Няма изпитвания за приложение и дозировка при деца, по тази причина Тавипек не се прилага при деца под 12 годишна възраст.

### **Прием на други лекарства**

До сега лекарствени взаимодействия не са наблюдавани. Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

### **Прием на Тавипек с храни и напитки**

До сега взаимодействия не са наблюдавани.

### **Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Тавипек може да се използва по време на бременност и кърмене.

### **Шофиране и работа с машини**

Тавипек не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

### **Важна информация относно някои от съставките на Тавипек**

Оцветител Е 110- може да причини алергични реакции. Глицерол - може да причини, главоболие, стомашно дразнене, диария.

## **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТАВИПЕК - КАПСУЛИ**

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни и деца над 12 години: по 2 капсули 3 пъти дневно

Тавипек - капсули трябва да се поглъщат цели с малко течност, 30 минути преди хранене.

**Ако се приели повече Тавипек – капсули от необходимата доза - Няма известни случаи на предозиране.**

**Ако сте пропуснали да приемете Тавипек - Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.**

**Ако сте спрели приема на Тавипек - Ако имате някъкви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.**

## **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства Тавипек може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**Нечести:** В зависимост от индивидуалната чувствителност и от приетите дози, може да се наблюдават нежелани реакции от страна на стомашно чревния тракт като уригване и леко гадене. Вашият дъх може да мирише слабо на етерично масло. Това може да се приеме даже за приятно. Възможни са алергични реакции.


## **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТАВИПЕК**

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте в оригиналната картонена кутия, за да се предпази от светлина.

Не използвайте Тавипек след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия след Годен до: (месец, година). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Какво съдържа Тавипек** - Активното вещество е: лавандулово масло - Помощни вещества: глицерол 85%, желатин, оцветители: оранжево жълто S (E110), Еудражит L30 D-55, натриев лаурилсулфат, пропиленгликол, полисорбат 80, глицеролов моностеарат 40-55.

**Как изглежда Тавипек и какво съдържа опаковката** - Стомашно-устойчиви капсули, меки в блистери.

20 капсули (2 блистера, всеки съдържащ 10 капсули);

30 капсули (3 блистера, всеки съдържащ 10 капсули), поставени в картонена кутия.

**Притежател на разрешението за употреба и производител:** Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H. 6060 Absam/Tirol, Австрия

**За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употреба.**

1164 София, ж.к. Лозенец, ул. "Митрополит Кирил Видински" 6-8, тел./факс 02/866 33 58

E- mail : montavit@montavitbg.com

**Дата на последно одобрение на листовката февруари 2008 г.**

