

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 3598 / 24.11.08
Одобрено: 23 / 30.09.08

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Forane / Форан

Изофлуран (Isoflurane)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да Ви бъде приложено това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, хирург или анестезиолог.
- Това лекарство е предписано лично на Вас.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар, хирург или анестезиолог

В тази листовка:

1. Какво представлява Forane и за какво се използва
2. Преди да Ви бъде приложен Forane
3. Как се прилага Forane
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Forane
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FORANE И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Forane принадлежи към групата лекарствени продукти, наречени инхалаторни (приемани чрез вдишване) анестетици. Той се използван за въвеждане и поддържане на дълбок, безболезнен сън (обща анестезия) по време на операция.

2. ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕН FORANE

Уведомете Вашия лекар, в случай че приемате някакви лекарства.

Съобщете на Вашия лекар, хирург или анестезиолог, ако имате установена алергия към изофлуран или друг анаестетик, както и ако Вие или някой от семейството Ви сте имали състояние наречено злокачествена хипертермия (бързо покачване на телесната температура) по време на анестезия с изофлуран или друг анестетик.



Съобщете на Вашия лекар или анестезиолог, ако преди това Ви е прилагана обща анестезия, особено ако това се е повторило през кратък интервал от време. В редки случаи някои анестетици може да доведат до появата на проблеми, като пожълтяване на кожата (жълтеница).

Уведомете Вашия лекар или анестезиолог, ако страдате от някакво друго заболяване, което не е свързано с настоящата операция, като например бъбречни проблеми, тежко главоболие, гадене, повръщане или нервномускулно заболяване (състояние, засягащо мускулите, напр. мускулна дистрофия на Дюше).

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или анестезиолог, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Не забравяйте да уведомите Вашия лекар, особено ако приемате лекарства принадлежащи към групата на така наречените не-деполяризиращи миорелаксанти (използвани за отпускане на мускулите).

Бременност и кърмене


Както при всички останали лекарства, така и в този случай е важно да информирате Вашия лекар или анестезиолог, ако сте бременна или кърмите.

Вашият лекар или анестезиолог ще прецени възможността за прилагане на този продукт в случай на бременност или кърмене, както и ще обсъди с Вас всички ползи и рискове, свързани с неговото приложение (включително и възможните рискове за плода).

Шофиране и работа с машини

Този лекарствен продукт може да окаже значително влияние върху способността Ви за шофиране или работа с машини. Ето защо, Вие не трябва да извършвате тези дейности, докато не отзвучат всички ефекти на анестезията, както и непосредствените ефекти от самата хирургичната операция.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА FORANE



Този лекарствен продукт ще Ви бъде приложен единствено от или под наблюдението на лекар имащ съответен опит с използването на подобни продукти (анестезиолог).

Този лекарствен продукт се прилага само в болнична обстановка, при наличието на специално оборудване (техника) за проследяване на Вашето състояние и съответно лечение (реанимация), в случай на необходимост.

Подходящата за Вас доза Forane ще бъде определена от Вашия анестезиолог и зависи от възрастта Ви, тегло и вида на предстоящата операция.

Forane е инхалаторен (чрез вдишване) анестетичен газ. Течният Forane преминава в състояние на газ с помощта на така наречения изпарител. Понякога е необходимо пациентите да вдишват Forane газ през маска, но обикновено първо се прилага инжекция с друг анестетик, която да доведе до по-бързо заспиване на пациента, след което се преминава към приложението на Forane. Forane има силен, но в рамките на нормата аромат, като приложението му води до бързо и лесно заспиване.

Ако Ви е приложена по-голяма от необходимата доза Forane

Дозата на този лекарствен продукт се определя от Вашия анестезиолог, което свежда до минимум възможността за предозиране.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Forane може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При прилагане на какъвто и да е анестетик, при събуждане е възможна появата на гадене, повръщане, кашлица и треперене.

Както и при останалите анестетици, по време на анестезия може да възникнат състояния на понижено кръвно налягане (артериална хипотония), забавено, повърхностно дишане (потискане на дишането) и повишение на телесната температура (малигнена хипертермия).

Нивата на флуоридите в кръвта може леко да се повишат по време или непосредствено след анестезията, което се дължи на разграждането на изофлуран в организма. Това няма



вредно въздействие и те скоро се връщат към нормата. Съобщавани са и случаи на увеличение броя на белите кръвни клетки.

В някои случаи изофлуран може да доведе до появата на сърцебиене или неритмичен пулс по време на анестезия.

Не се притеснявайте от представения по-горе списък с възможни нежелани реакции. При Вас може да не се появи нито една от тях.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или анестезиолог.

След преустановяване приема на Forane

Вие ще се събудите в рамките на няколко минути.

Ако имате някакви необичайни или неочаквани симптоми след анестезията със Forane, незабавно уведомете Вашия лекар или анестезиолог.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля попитайте Вашия лекар, анестезиолог или хирург.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ FORANE

- Съхранявайте на място, недостъпно за деца
- Този лекарствен продукт трябва да се съхранява под 25°C, в добре затворена бутилка.
- Forane не трябва да бъде използван след срока на годност отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

