

И А Л  
О Д О Б Р Е Н О !

ДАТ. ОТП. R-7377/10.10.08

Преди употреба внимателно прочетете написаното в листовката

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА  
CEFALEKSIN - KALUGEROVO 250 mg and 500 mg capsules hard  
ЦЕФАЛЕКСИН КАЛУГЕРОВО 250 мг и 500 мг твърди капсули

● СЪСТАВ

Всяка капсула цефалексин съдържа cefalexin monohydrate (цефалексин монохидрат) еквивалентен на 250 мг или 500 мг cefalexin (цефалексин).

● ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърди желатинови капсули

● ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ЦЕФАЛЕКСИН КАЛУГЕРОВО

Цефалексин е антибиотик от групата на цефалоспорините.

Прилага се за лечение на бактериални инфекции, причинени от чувствителни към антибиотика микроорганизми – инфекции на дихателните пътища, пикочо-полови инфекции -/остър и хроничен пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит, епидидимит/, инфекции на кожата и меките тъкани -/абцеси, флегмона, пиодермии, инфектирани фистули/, оториноларингологични инфекции: отит, ангина, синусит.

**ВНИМАНИЕ!**

● КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА ЦЕФАЛЕКСИН КАЛУГЕРОВО?

Цефалексин не бива да се приема при свръхчувствителност към цефалексин или някой друг цефалоспоринов антибиотик.

● СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ако отговорите с ДА на някой от следните въпроси или не сте сигурен, се посъветвайте с вашия лекар преди да приемате цефалексин:

- Имали ли сте обриви или алергична реакция (сърбеж, оток на лицето и/или изпотяване, задух) след приемане на антибиотици, като пеницилини или цефалоспорини, или към други лекарствени средства?
- Бременна ли сте?
- Кърмите ли?
- Имате ли проблеми с бъбреците?
- Приемате ли други лекарства?
- Имате ли стомашно-чревни заболявания (напр. колит)?

● ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

При лечение с антибиотик, какъвто е цефалексин, може да се развие т. нар. псевдомембранозен колит, в резултат на нарушение на нормално развиващите се в червата микроорганизми. При поява на тежка и упорита диария е необходимо да спрете приема на цефалексин и да уведомите лекуващият лекар.

При поява на алергична реакция (кожен обрив, сърбеж, оток на лицето, езика, клепачите, задух) спрете приема на цефалексин и уведомете лекуващият лекар.

Продължителната употреба на цефалексин може да доведе до развитие на нечувствителни към антибиотика микроорганизми.



**Ако забележите обрив по кожата, зачервяване и сърбеж, трудно преглъщане, диария, болки по ставите, обща слабост и затруднено дишане – СПРЕТЕ ВЕДНАГА ДА ПРИЕМАТЕ ЦЕФАЛЕКСИН И СЪОБЩЕТЕ НА ВАШИЯ ЛЕКАР ЗА СЪСТОЯНИЕТО СИ.**

● **ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Винаги информирайте вашият лекар или фармацевт когато приемате и други лекарства.

При едновременно приемане на цефалексин с някои други антибиотици, като аминогликозиди, полимиксин В, ванкомицин и някои други лекарства, като метотрексат, колистин, диуретици (фуросемид, етакринова киселина) се повишава риска от увреждане на бъбреците.

Холестирамин значително намалява резорбцията на цефалексин в стомашно чревния тракт при едновременно приложение.

Пробенецид потиска елиминирането на цефалексин през бъбреците и повишава концентрацията на антибиотика в кръвта.

Цефалексин намалява ефективността на естроген съдържащите орални контрацептиви.

● **БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ**

По време на бременност и кърмене винаги се съветвайте с вашият лекар или фармацевт преди да приемате лекарски продукт.

**Помощни вещества**

Магнезиев стеарат

**КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА ЦЕФАЛЕКСИН КАЛУГЕРОВО?**

● **НАЧИН И ПЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Капсулите се приемат с чаша вода.

● **ДОЗИРАНЕ**

Следвайте инструкциите на вашия лекар.

**Възрастни:** в зависимост от тежестта на инфекцията, дозата е

- 1 капсула от 250 мг – 4 пъти дневно, или
- 2 капсули от 500 мг – 2 пъти дневно, или
- 2 капсули от 500 мг – 3-4 пъти дневно.

**Деца над 7 години:** дозата се определя в зависимост от теглото на детето и тежестта на инфекцията

- **Неусложнени инфекции** - От 12.5, 25 до 50 мг/кг/ден разделени на 2-4 приема.
- **При тежки или хронични инфекции** дозата може да достигне до 100 мг/кг/ден..
- **Възпаление на средното ухо** – 75 – 100 мг/кг разделени на 4 приема.
- **Инфекции на пикочните пътища** – 25-50 мг/кг разделени на 2 приема.

Цефалексин Калугерово капсули не е подходящ за приложение при деца под 7 годишна възраст с оглед на лекарствената форма и невъзможност за прецизно дозиране.

● **ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО**



Цефалексин трябва да се приема за указания от вашия лекар период от време. Не спирайте приема на лекарството, защото сте се почувствали по-добре. Симптомите ви могат да се влошат отново.

● **КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, АКО СТЕ ПРИЕЛИ ПОВЕЧЕ КАПСУЛИ, ОТКОЛКОТО ВИ Е ПРЕДПИСАНО (ПРЕДОЗИРАНЕ)?**

Симптомите на предозирание са гадене, повръщане, болка в корема, диария, кръв в урината. В такива случаи е необходимо незабавно да се потърси лекарска помощ. За да се намали резорбцията на лекарството в стомашно чревния тракт може да се приложи активен въглен.

● **НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Цефалексин Калугерово капсули могат да предизвикат следните нежелани реакции:

Стомашно-чревни – гадене, повръщане, диария, коремна болка.

Пикочо-полови – възпаление на влагалището и външните полови органи, причинено от гъбички, сърбеж в гениталната и аналната област.

От страна на централната нервна система – замаяност, главоболие, при високи дози и при пациенти с бъбречна недостатъчност могат да се наблюдават гърчове.

Рядко цефалексин може да повлияе временно функцията на бъбреците или черния дроб, или да промени броя на клетките в кръвта.

Възможно е да се появят алергични реакции след прием на цефалексин, проявяващи се с кожни обриви, уртикария, зачервяване и сърбеж, оток на лицето и/или клепачите.

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА ПОТЪРСИТЕ ВАШИЯТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА СЪВЕТ. ИНФОРМИРАЙТЕ ГИ ЗА ВСЯКА НЕЖЕЛАНА РЕАКЦИЯ, КОЯТО СТЕ ЗАБЕЛЯЗАЛИ И НЕ Е ОТБЕЛЯЗАНА В ТАЗИ ЛИСТОВКА.

● **СРОК НА ГОДНОСТ - 3 години.**

**Не използвайте препарата след датата посочена на вторичната опаковка**

● **СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява при температура под 25° С на сухо и недостъпно за деца място.

**ПРОИЗВОДИТЕЛ**

Фирма "ГАЛЕН-ФАРМА" ООД

4462 с. Калугерово

Пазарджишка област

В ТАЗИ ЛИСТОВКА НЕ Е ДАДЕНА ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА ЛЕКАРСТВО. АКО СЛЕД ПРОЧИТАНЕТО И ВЪЗНИКНАТ НЯКАКВИ ВЪПРОСИ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР.

**ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА:** август 2008г

