

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**ВЕНЛИФТ XL 37.5 MG КАПСУЛИ С УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ, ТВЪРДИ  
ВЕНЛИФТ XL 75 MG КАПСУЛИ С УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ, ТВЪРДИ  
ВЕНЛИФТ XL 150 MG КАПСУЛИ С УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ, ТВЪРДИ**

**Венлафаксин**

**VENLIFT XL 37.5 MG PROLONGED RELEASE CAPSULES, HARD  
VENLIFT XL 75 MG PROLONGED RELEASE CAPSULES, HARD  
VENLIFT XL 150 MG PROLONGED RELEASE CAPSULES, HARD**  
**Venlafaxine**

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- *Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.*
- *Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.*
- *Това лекарство е предписано лично за Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.*
- *Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.*

В тази листовка:

1. Какво представлява **ВЕНЛИФТ XL** и за какво се използва
2. Преди да приемете **ВЕНЛИФТ XL**
3. Как да приемате **ВЕНЛИФТ XL**
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на **ВЕНЛИФТ XL**
6. Допълнителна информация

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЕНЛИФТ XL И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА


Венлифт XL е антидепресант от групата лекарства, наречени инхибитори на пресинаптичното усвояване на серотонин и норадреналин (SNRIs). Тази група лекарства се използва за лечение на депресия и други състояния като тревожност. Счита се, че пациентите с депресия и/или тревожност могат да бъдат с по-ниски нива на серотонин и норадреналин в мозъка. Все още не е напълно изяснено, как действат антидепресантите, но те може да помогнат чрез повишаване на нивата на тези вещества в мозъка.

Венлифт XL лекува депресия при възрастни. Венлифт XL също така служи за лечение на следните тревожни разстройства: генерализирано тревожно разстройство, социална фобия (страх или избягване на социални и поведенчески ситуации) и панически разстройства (пристъпи на паника). Лечението на депресията или тревожните разстройства е важно, за да Ви се помогне да се почувствате по-добре. Ако не се лекувате, Вашето състояние може да не се подобри и да стане по-сериозно и по-трудно за лечение.

### 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ВЕНЛИФТ XL

**Не приемайте Венлифт XL**

- Ако сте алергичен (свръхчувствителен) към венлафаксин или други съставки на Венлифт XL. (Една алергична реакция може да включва обрив, сърбеж, отичане на лицето, устните или ръцете/стъпалата или затруднения в дишането).
- Ако приемате или наскоро (в последните две седмици) сте приемали друг лекарствен



продукт, известен като необратим моноамино оксидазен инхибитор (МАОИ), използван за лечение на депресия или болест на Паркинсон. Не трябва да приемате необратими МАО инхибитори едновременно с други лекарства, включително Венлифт XL, защото това може да предизвика сериозни, дори животозастрашаващи ефекти. Не приемайте също МАО инхибитори поне една седмица след преустановяване на приема на Венлифт XL (виж също раздел «Серотонинов синдром» и «Прием на други лекарства»).

#### **При употреба на Венлифт XL обърнете специално внимание**

- Ако приемате едновременно с Венлифт XL и други лекарства, които могат да увеличат риска за поява на серотонинов синдром ( виж раздел «Прием на други лекарства»).
- Ако имате проблеми с очите като глаукома (повишено налягане в окото)
- Ако страдате от високо кръвно налягане
- Ако страдате от проблеми със сърцето
- Ако имате припадъци (гърчове)
- Ако страдате от ниско ниво на натрий в кръвта (хипонатриемия)
- Ако имате склонност да получавате синини и имате склонност към кръвоизливи (получавали сте кръвоизливи), или ако приемате лекарства, които могат да увеличат риска от кръвотечения.
- Ако нивата на холестерол стават високи
- Ако страдате от или сте имали мания или биполарно разстройство (усещане за прекалена тревога или еуфория) или някой от Вашата фамилия е имал или има подобни проблеми.
- Ако сте страдали от агресия (агресивно поведение)

Венлифт XL може да предизвика безпокойство, при което се изпитва нужда от движение, често придружавано с невъзможността да се остане на едно място в седнало или изправено положение. Ако това Ви се случи, трябва да уведомите Вашия лекар.

Моля, консултирайте се с Вашия лекар, ако тези твърдения се отнасят за Вас, преди да приемете Венлифт XL.

#### **Мисли за самоубийство и влошаване на депресията или тревожното разстройство**

Ако страдате от депресия и / или имате тревожно разстройство, понякога може да изпитвате желание за самонараняване или да имате мисли за самоубийство. При започване на лечение с антидепресанти силата на подобни желания и мисли може да се увеличи, тъй като при тези лекарства е необходимо да мине известно време (обикновено две и повече седмици) преди те да започнат да действат.

Вие сте с по- голяма вероятност това да ви се случи:


- Ако преди сте имали мисли за самоубийство или самонараняване
- Ако сте в млада възраст. Информацията от клинични проучвания е показала повишен риск за опити за самоубийство при индивиди в млада възраст (на възраст под 25 години), които страдат от психични нарушения и се лекуват с антидепресанти.

Ако изпитвате желание за самонараняване или имате мисли за самоубийство, по което и да е време, обърнете се незабавно към Вашия лекар или отидете незабавно в болница.

Може да Ви е от полза да споделите с роднина или близък приятел, че страдате от депресия или имате натрапливи състояния, като ги помолите да прочетат тази листовка. Бихте могли да помолите, ако забележат депресията Ви да се влошава или състоянието Ви да става по-лошо, както и ако констатираат промени в поведението Ви, да Ви кажат за това.

#### **Сухота на лигавицата на устата**

При 10 % от пациентите, лекувани с венлафаксин се съобщава за сухота на лигавицата на устата.



Това може да увеличи риска за поява на кариес. Ето защо следва да обърнете специално внимание върху устната си хигиена.

### Употреба при деца и юноши под 18 годишна възраст

Венлифт XL обикновено не следва да се прилага при деца и юноши под 18 годишна възраст. Също трябва да знаете, че пациенти под 18 годишна възраст имат увеличен риск от нежелани реакции като опити и мисли за самоубийство и враждебност (преобладаваща агресия, поведение на противопоставяне, гняв), когато приемат лекарства от този клас. Въпреки това, Вашият лекар може да предприеме Венлифт XL на пациент под 18 годишна възраст, защото е решил/ а, че това е в интерес на пациента. Ако Вашият лекар е предписал Венлифт XL на пациент под 18 годишна възраст и Вие искате да обсъдите това, моля обърнете се към него/ нея. Трябва да уведомите Вашия лекар, ако някой от изброените по-горе симптоми се появи или влоши при пациент под 18 години, който приема Венлифт XL. Освен това, съществуват ограничени сведения относно дълготрайния ефект на Венлифт XL върху растежа, сексуалното узряване и познавателното, емоционално и поведенческо развитие.

### Прием на други лекарства

Моля, информирайте своя лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Вашият лекар ще реши, дали може да приемате Венлифт XL с други лекарства.

Не започвайте или не спирайте каквито и да е лекарства, включително и тези, купени без рецепта, натурални и билкови продукти преди да сте се консултирали за това с лекар или фармацевт.

- Моноамино оксидазни инхибитори (MAOIs: виж подробности по-горе, в "Не приемайте Венлифт XL").
- Серотонинов синдром:
- Серотониновият синдром е потенциално животозастрашаващо състояние (виж раздел «Възможни нежелани реакции»), което може да възникне при употребата на венлафаксин едновременно с други лекарства. Примери за такива лекарства са:
- Триптани (използват се при мигрена)
- Лекарства за депресия, включващи инхибитори на реабсорбцията на серотонин и норадреналин (SNRIs), селективни инхибитори на обратното залавяне на серотонин (SSRIs), трициклични антидепресанти или други лекарства, съдържащи литий
- Лекарства, съдържащи линезолид, антибиотици (използвани за лечение на инфекции)
- Лекарства, съдържащи моклобемид, обратим MAO инхибитор (за лечение на депресия)
- Лекарства, съдържащи сибутрамин (за отслабване)
- Лекарства, съдържащи трамадол (болкоуспокояващо)
- Продукти, съдържащи St. John's Wort (жълт кантарион), натурални или билкови продукти за лечение на умерена депресия
- Продукти, съдържащи триптофан (използван при проблеми със съня и депресия)

Белезите и симптомите на серотониновия синдром могат да включват комбинация от следните:

Безпокойство, халюцинации, загуба на координация, сърцебиене, повишена температура, внезапни промени в кръвното налягане, засилени рефлексии, диария, кома, гадене, повръщане. Незабавно потърсете лекарска помощ, ако смятате, че имате серотонинов синдром.

Следните лекарства също могат да взаимодействат с Венлифт XL и следва да се прилагат с повишено внимание. Важно е да уведомите лекаря, ако приемате лекарства съдържащи:

- Кетоназол (за лечение на гъбични инфекции)
- Лекарства за лечение на душевни разстройства, напр. халоперидол или рисперидон

- Метопролол (бета блокер за лечение на високо кръвно налягане и проблеми със сърцето)

### **Прием на Венлифт XL с храна и напитки**

ВЕНЛИФТ XL трябва да се приема с храна.

Трябва да избягвате употребата на алкохол, докато приемате ВЕНЛИФТ XL.

### **Бременност и кърмене**

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или възнамерявате да забременеете. Започнете прием на ВЕНЛИФТ XL само след като сте обсъдили с Вашия лекар потенциалната полза и риск за Вас и Вашето дете.

Ако приемате ВЕНЛИФТ XL по време на бременността, трябва да информирате лекаря си, тъй като Вашето бебе може да прояви някои симптоми, когато се роди. Това може да стане в първите 24 часа след раждането и възможните ефекти могат да включват недобро хранене и проблеми с дишането. Ако бебето Ви има някой от тези симптоми след като се роди и се безпокоите, трябва да се свържете с Вашия лекар и/или медицинска сестра, за да потърсите съвет.

Венлафаксин преминава в кърмата. Съществува риск за ефекти върху бебето. Трябва да обсъдите с Вашият лекар, за да се реши дали трябва да спрете кърменето или да спрете лечението с ВЕНЛИФТ XL.

### **Шофиране и работа с машини**

Преди да разберете, как Ви влияе това лекарство, не шофирайте и не управлявайте каквито и да е машини.

## **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ВЕНЛИФТ XL**

Винаги приемайте ВЕНЛИФТ XL точно както Ви е предписал лекарят. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте своя лекар или фармацевт.

Препоръчителната обичайна начална доза за лечение на депресия, генерализирано тревожно разстройство и социална фобия е 75 mg веднъж дневно. Лекарят Ви може да увеличи дозата постепенно, ако се налага дори и до максималната от 375 mg на ден при депресия. Ако Ви лекуват за паническо разстройство, лекарят ще започне с по-ниска доза (37,5 mg), като постепенно увеличи дозата след това. Максималната доза при генерализирано тревожно разстройство, социална фобия и паническо разстройство е 225 mg на ден.

Всяка капсула трябва да се преглътнете цяла с чаша вода по време на хранене, приблизително в едно и също време всеки ден, сутрин или вечер. Не разчупвайте, не смачквайте, не дъвчете капсулите и не ги поставяйте във вода преди да ги преглътнете.

ВЕНЛИФТ XL трябва да се приема с храна.

Ако страдате от чернодробни или бъбречни проблеми, обсъдете това с Вашия лекар, тъй като дозата в този случай може да бъде различна.

Не прекратявайте приема преди да сте се посъветвали за това с Вашия лекар. (Виж раздел «Ако спрете приема на ВЕНЛИФТ XL»)

**Ако сте приели повече от необходимото количество ВЕНЛИФТ XL**



Ако сте приели повече от предписаното количество ВЕНЛИФТ XL, веднага се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Възможни са следните симптоми на предозиране: промени в сърдечния Ви ритъм, различна степен на нарушено съзнание /варираща от сънливост до кома/, замъглено зрение, припадъци или гърчове и повръщане.

#### **Ако забравите да вземете ВЕНЛИФТ XL**

Ако сте забравили да вземете дозата си, вземете я веднага щом си спомните. Ако обаче е приближило вече времето за следващ прием, изпуснете пропуснатата доза и се върнете към обичайния си режим на прием. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената доза.

#### **Ако спрете приема на ВЕНЛИФТ XL**

Не спирайте приема на капсулите и не намалявайте дозата без да се посъветвате с лекаря си, дори да се чувствате по-добре. Ако лекарят Ви счита, че вече не се нуждаете от ВЕНЛИФТ XL, той/ тя ще Ви посъветва да намалите дозата си преди напълно да спрете лечението. Ако приемът на венлафаксин се преустанови внезапно или дозата се намали прекалено бързо е възможно някои пациенти да почувстват симптоми като умора, замаяност, сънливост, главоболие, безсъние, кошмари, сухота на лигавицата на устата, загуба на апетит, гадене, нервност, тревожност, възбуда, шум в ушите, тръпки или рядко усещане като преминаване на ток, слабост, изпотяване, припадъци или грипозодобни симптоми.

Вашият лекар ще Ви посъветва за това как постепенно да преустановите лечението с венлафаксин и ако почувствате някой от тези симптоми или други, които са обезпокоителни, посетете отново лекаря си за допълнителен съвет.

Ако имате допълнителни въпроси за употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, ВЕНЛИФТ XL може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не се притеснявайте, ако видите малки бели топчета или гранули в изпражненията си след като сте приели Венлифт XL. В капсулата, съдържаща Венлифт XL има малки сфери или малки бели топчета, които съдържат активното вещество венлафаксин. Тези сфери се освобождават в стомаха от капсулата и попадат в стомашно-чревния тракт. Докато се предвижват по неговата дължина, сферите постепенно освобождават венлафаксин. Тялото на самата сфера не се разтваря и се изхвърля от организма с изпражненията. Ето защо дори и изпражненията да съдържат сфери, Вашата доза венлафаксин постепенно се е абсорбирала.

#### **Алергични реакции**

Ако някое от следните се случи, спрете приема на Венлифт XL и веднага кажете на лекаря си или отидете до най-близкото отделение на бърза помощ:

- Стягане в областта на гърдите, трудно дишане с хриптене, затруднено дишане и преглъщане
- Подуване на лицето, гърлото, ръцете и стъпалата
- Нервност, безпокойство, замаяване, треперене, внезапно зачервяване на кожата и/или



- горещи вълни
- Тежък обрив, сърбеж или поява на мехури по кожата

#### Сериозни нежелани реакции

Ако забележите някой от следните симптоми, може да имате нужда от спешна лекарска намеса:

- Сърдечни проблеми като: ускорен или неритмичен пулс, повишено кръвно налягане
  - Зрителни смущения като замъглен поглед, разширени зеници
  - Неврологични проблеми като: замайване, мравучкане, нарушена координация, припадъци или гърчове
  - Психиатрични проблеми като: хиперактивност и еуфория
- Симптоми на отнемане (виж «Как да приемате Венлифт XL»)

#### Пълен списък на нежеланите лекарствени реакции

Наблюдаваните нежелани реакции са степенувани както следва:

много чести: докладвани при повече от 1 на 10 пациента
чести: докладвани при 1 до 10 на 100 пациента
нечести: докладвани при 1 до 10 на 1,000 пациента
редки: докладвани при 1 до 10 на 10,000 пациента
много редки: докладвани при по-малко от 1 на 10,000 пациента
с неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

- **Нарушения на кръвта и лимфната система**

*Чести:* синини; черни или кървави изпражнения, които могат да бъдат белези на вътрешно кървене  
*С неизвестна честота:* намален брой на тромбоцитите в кръвта, водещ до повишен риск за поява на синини или кървене; нарушения на кръвта, които могат да доведат до увеличен риск от инфекции

- **Нарушения на метаболизма и храненето**

*Чести:* загуба на телесна маса; увеличен холестерол

*Нечести:* напълняване

*С неизвестна честота:* леки промени в кръвните нива на чернодробните ензими; намалено ниво на натрий в кръвта; сърбеж, пожълтяване на кожата или склерите на очите, тъмна урина или грипopodobни симптоми- признаци на възпаление на черния дроб (хепатит); объркване, увеличен прием на течности; анормална секреция от млечната жлеза

- **Нарушения на нервната система**

*Много чести:* сухота на устната лигавица; главоболие

*Чести:* анормални сънища; намалено либидо; замаяност; повишен мускулен тонус; безсъние; нервност; мравучкане; седация; тремор; объркване; усещане за отчужденост (или изолация) от себе си и реалността

*Нечести:* липса на чувства и емоции, халюцинации, неволеви съкращения на мускули, възбуда, нарушен баланс и координация

*Редки:* усещане за неспокойство или неспособност да се остане на едно място в седнало или изправено положение; припадъци или гърчове; усещане за свръх възбуда или еуфория

*С неизвестна честота:* висока температура с ригидни мускули, объркване или възбуда и изпотяване или усещане за спазми, които не могат да се контролират, това може да са симптоми на сериозно състояние, известно като невролептичен малигнен синдром; еуфорични усещания, сънливост, непрекъснати бързи движения на очите, непохватност, неспокойствие, опиянение, подуване или ригидност на мускулите, това са симптоми на серотонинергичен синдром; дезориентация и объркване, често съпроводени с халюцинации (делириум); скованост, спазми и произволни движения на мускулите; мисли за самонараняване и самоубийство

- **Нарушения на очите; Нарушения на ухото и лабиринта**

*Чести:* замъглено виждане

*Нечести:* нарушени вкусови възприятия; шум в ушите /тинитус/

*С неизвестна честота:* силна болка в окото и намалено или неясно зрение

- **Сърдечни нарушения; Съдови нарушения**

*Чести:* повишено кръвно налягане; зачервяване на лицето; сърцебиене

*Нечести:* замаяване /особено при рязко ставане/, припадък, ускорено сърцебиене

*Неизвестни:* понижено кръвно налягане; анормален, ускорен или неритмичен пулс, което би могло да доведе до загуба на съзнание

- **Респираторни нарушения**

*Чести:* прозяване

*С неизвестна честота:* кашлица, хриптене, недостиг на въздух и висока температура, това са симптоми на възпаление на белия дроб, свързано с увеличаване на броя на белите кръвни клетки (пулмонарна еозинофилия)

- **Стомашно-чревни нарушения**

*Много чести:* гадене

*Чести:* намален апетит; запек; повръщане

*Нечести:* скърцане със зъби; диария

*С неизвестна честота:* силна болка в областта на корема или гърба, което може да бъде признак на сериозен проблем с червата, черния дроб или панкреаса)

- **Нарушения на кожата и подкожната тъкан**

*Много чести:* изпотяване (включително нощно изпотяване)

*Нечести:* обрив; косопад

*С неизвестна честота:* обрив по кожата, с поява на мехури и излющване; сърбеж; умерен обрив

- **Нарушения на мускулно-скелетната и съединителната тъкан**

*С неизвестна честота:* необяснима мускулна болка; болезненост и слабост (рабдомиолиза)

- **Нарушения на бъбреците и пикочните пътища**

*Чести:* затруднено уриниране; чести позиви за уриниране

*Нечести:* задръжка на урината

- **Нарушения на възпроизводителната система и гърдата**

*Чести:* анормална еякулация/ оргазъм (мъже); липса на оргазъм; еректилна дисфункция (импотентност); менструални смущения като прекомерно кървене или кървене извън цикъла

*Нечести:* анормален оргазъм (жени)

- **Общи**

*Чести:* слабост (астения); тръпки

*Нечести:* чувствителност към слънчева светлина

*С неизвестна честота:* подуване на лицето или езика, недостиг на въздух или затруднено дишане, често с кожни обриви (това може да бъде сериозна алергична реакция)

Венлифт XL понякога може да предизвика нежелани лекарствени реакции, които да не усетите като: повишено кръвно налягане, анормален пулс, леки промени в кръвните нива или чернодробните ензими, нивото на натрия или холестерола. По-рядко може да се повлияе функцията на тромбоцитите, което да доведе до повишен риск от кървене и склонност към поява на синини. Ето защо лекарят може да прецени, че се налага да се правят кръвни тестове, особено в случай, че дълго време приемате този лекарствен продукт.

Ако някоя от нежелателните лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете лекаря или фармацевта си.

## 5. СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕНЛИФТ XL

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.



ВЕНЛИФТ XL не трябва да се използва след изтичане срока на годност, отбелязана върху опаковката. Срокът за годност се отнася за последния ден от посочения месец.

Не изисква специални условия на съхранение.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят с отпадни води или домакински отпадъци. Попитайте фармацевта си за това, как да изхвърляте лекарства, от които повече не се нуждаете. Тези мерки ще допринесат за опазване на околната среда.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа ВЕНЛИФТ XL**

#### **ВЕНЛИФТ XL 37.5 mg капсули с удължено освобождаване, твърди**

Активното вещество е венлафаксин.

Всяка твърда капсула с удължено освобождаване съдържа 42.43 mg венлафаксин хидрохлорид, еквивалентен на 37.5 mg венлафаксин.

Помощните вещества на тези капсули са:

Сърцевина на сферите: микрокристална целулоза, хипромелоза

Покритие с удължено освобождаване: етилцелулоза, повидон (К 30), триацетин, талк

Капсула:

Тяло

Червен железен оксид (E 172)

Титанов диоксид (E171)

Желатин

Натриев лаурил сулфат

Капак

FD & C Blue 1 (E 133)

D & C Yellow 10 (E 104)

FD & C Red 40 (E 129)

Титанов диоксид (E171)

Желатин

Натриев лаурил сулфат

#### **ВЕНЛИФТ XL 75 mg капсули с удължено освобождаване, твърди**

Активното вещество е венлафаксин.

Всяка твърда капсула с удължено освобождаване съдържа 84.85 mg венлафаксин хидрохлорид, еквивалентен на 75 mg венлафаксин.

Помощните вещества на тези капсули са:

Сърцевина на сферите: микрокристална целулоза, хипромелоза

Покритие с удължено освобождаване: етилцелулоза, повидон (К 30), триацетин, талк

Капсула:

Тяло





Червен железен оксид (E 172)

Титанов диоксид (E171)

Желатин

Натриев лаурил сулфат

Капак

Червен железен оксид (E 172)

Титанов диоксид (E171)

Желатин

Натриев лаурил сулфат

**ВЕНЛИФТ XL 150 mg** капсули с удължено освобождаване, твърди

Активното вещество е венлафаксин.

Всяка твърда капсула с удължено освобождаване съдържа 169.71 mg венлафаксин хидрохлорид, еквивалентен на 150 mg венлафаксин.

Помощните вещества на тези капсули са:

Сърцевина на сферите: микрокристална целулоза, хипромелоза

Покритие с удължено освобождаване: етилцелулоза, повидон (K 30), триацетин, талк

Капсула:

Тяло

Червен железен оксид (E 172)

Жълт железен оксид (E 172)

Титанов диоксид (E171)

Желатин

Натриев лаурил сулфат

Капак

Червен железен оксид (E 172)

Жълт железен оксид (E 172)

Титанов диоксид (E171)

Желатин

Натриев лаурил сулфат

Черно печатно мастило:

Шеллак

Пропилен гликол

Концентриран амоняк

Черен железен оксид (E 172)

Калиев хидроксид

**Как изглеждат ВЕНЛИФТ XL и какво съдържа опаковката**



ВЕНЛИФТ XL се предлага в три концентрации: 37.5mg, 75mg и 150mg.

Всяка концентрация ВЕНЛИФТ XL е различно маркирана от едната страна и без надпис от другата.

**ВЕНЛИФТ XL 37.5 mg**

Капсулите от 37.5 mg са с размер "2" и са със розово тяло и сива непрозрачна капачка, надписани с черно мастило- RVn върху капачката и 37.5 върху тялото на капсулата.

Капсулите от 37.5 mg са в опаковки от по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100  
За медицинските специалисти са на разположение също и бутилки от по 100.  
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

**ВЕНЛИФТ XL 75 mg**

Капсулите от 75 mg са с размер "1" и са с розово непрозрачно тяло и капачка, надписани с черно мастило- RVn върху капачката и 75 върху тялото на капсулата.

Капсулите от 75 mg са в опаковки от по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100  
За медицинските специалисти са на разположение също и бутилки от по 100.  
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

**ВЕНЛИФТ XL 150 mg**

Капсулите от 150 mg са с размер "0" и са с непрозрачно, с цвят на карамел тяло и капачка, надписани с черно мастило- RVn върху капачката и 150 върху тялото на капсулата.

Капсулите от 75 mg са в опаковки от по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100  
За медицинските специалисти са на разположение също и бутилки от по 100.  
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

**Притежател на разрешението за употреба:**

RANBAXY UK LIMITED  
20 Balderton Street  
London W1K 6TL  
Великобритания

**Производител:**

1. Ranbaxy Ireland Limited,  
Spafield, Cork Road,  
Cashel, Co-Tipperary,  
Ирландия
2. Cemelog-BRF Kft,  
2040 Budaörs,  
Vasút u. 2.  
Унгария

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите-членки на ЕИП под следните имена:

**Предложено име – Притежател на разрешението за употреба**

Австрия, Белгия, Дания, Люксембург, Холандия, Норвегия, Швеция - Venlafaxine Ranbaxy  
България- Венлифт XL  
Чехия, Словакия - Ranfaxiran prolong



Германия- Venlafaxin BASICS  
Естония, Литва, Латвия- Venlobax  
Гъция- Venlafaxine  
Унгария, Ирландия - Venlift XL  
Италия - Venlafaxina Ranbaxy Italia  
Исландия- Venlafaxin Ranbaxy  
Полша - Venlabax Ranbaxy  
Португалия - Venlafaxina Ranbaxy  
Румъния – Adoxa EP  
Словения - Venlafaksin  
Великобритания – Ranfaxiran XL

**Дата на последното одобрение на листовката**  
Август, 2008 г.

