

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

TETRACYCLINE ACTAVIS 3% ointment
ТЕТРАЦИКЛИН АКТАВИС 3% маз
Тетрациклин



ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

- Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!
- Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Тетрациклин Актавис маз и за какво се прилага
2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Тетрациклин Актавис маз
3. Как се прилага Тетрациклин Актавис маз
4. Възможни нежелани реакции
5. Условия на съхранение
6. Допълнителна информация

Тетрациклин Актавис маз
Тетрациклин

Лекарствено вещество в 1g маз: Тетрациклинов хидрохлорид 32,46 mg, екв. на 30 mg Тетрациклин

Помощни вещества: метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, течен парафин, твърд парафин, ланолин, бял вазелин

Tetracycline Actavis маз 20 g в двойно лакирани алуминиеви туби

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕТРАЦИКЛИН АКТАВИС МАЗ И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Тетрациклин Актавис е широкоспектърен антибиотик, който спира развитието на болестотворни микроорганизми, а във високи дози ги унищожава.

Тетрациклин Актавис маз се прилага за локално лечение на кожни инфекции, причинени от чувствителни на тетрациклин микроорганизми, включително акне.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С ТЕТРАЦИКЛИН АКТАВИС МАЗ

Тетрациклин Актавис маз не трябва да се прилага при свръхчувствителност към тетрациклин или някое от помощните вещества.

При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:

Поради съдържащия се в продукта тетрациклин може да се получи леко жълто оцветяване на кожата, което свети при облъчване с ултравиолетови лъчи. Този ефект се отстранява при използване на кисели сапуни.

При поява на сенсибилизация, третирането с продукта трябва да се прекрати.

При лечение на акне продуктът трябва да се употребява поне 2 седмици, за да се забележи подобрене. Понякога затова е нужно повече време. При липса на ефект или влошаване на симптомите след 6-8 седмично лечение трябва да се обсъди друга терапия.

По време на лечението с продукта не трябва да се използват козметични кремове и грим върху лекуваните области.

Приложение на Тетрациклин Актавис маз и прием на храни и напитки

Тетрациклин Актавис е продукт за приложение върху кожата и не се очаква неблагоприятно взаимодействие с храни и напитки.

Бременност и кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

Тетрациклин Актавис маз следва да се прилага по време на бременност и кърмене след внимателна преценка на съотношението полза/риск от страна на лекаря.

Не се препоръчва лечение на кожни инфекции в областта на гърдите поради опасност от контакт на продукта с кърмачето по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Тетрациклин Актавис маз не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Приемане на други лекарства

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или скоро сте приемали скоро други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар

Няма установени лекарствени взаимодействия.

Данни за помощните вещества

Тетрациклин Актавис маз съдържа т. нар. парабени, които могат да станат причина за алергични реакции и в редки случаи да доведат до астматични пристъпи.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА ТЕТРАЦИКЛИН АКТАВИС МАЗ

Винаги приемайте Тетрациклин Актавис маз според инструкциите на лекуващия лекар!

Тетрациклин Актавис маз се прилага 1-3 пъти дневно на тънък слой върху засегнатите места чрез леко втриване под формата на масаж след внимателно почистване на кожата с хладка вода.

Ако сте приели по-голямо количество от лекарството

При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар!

Няма съобщения за предозиране с продукта.

Ако сте пропуснали да приложите Тетрациклин Актавис маз

Ако сте пропуснали да приложите поредната доза, то приложете я час по-скоро.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всеки друг лекарствен продукт, Тетрациклин Актавис маз може да предизвика нежелани лекарствени реакции

Продуктът се понася добре и при продължително приложение. Най-често наблюдаваните нежелани лекарствени реакции при прилагане на Тетрациклин Актавис маз се изразяват в дразнене, зачервяване, парене, сърбеж и лющене на кожата, но те са редки.

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25° С!

Срок на годност: 2 (две) години

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД

ул. "Атанас Дуков " 29

1407 София, България

Производител

"Балканфарма-Разград" АД

бул. "Априлско въстание" №68

7200, Разград

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД

ул. "Атанас Дуков " 29

1407 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Ноември 2008 г.

