

СПЛ...
15.12.08

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

БЕТАК 20 mg филмирани таблетки

BETAC 20 mg film coated tablets

бетаксолोलов хидрохлорид / betaxolol hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.


- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Бетак и за какво се използва
2. Преди да приемете Бетак
3. Как да приемате Бетак
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Бетак
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БЕТАК И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Бетак е едно от групата лекарства, наричани кардиоселективни бета-адренорецепторни блокери.



Бетак се използва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) или на определен тип болка в гърдите, известна като стенокардия.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ БЕТАК

Не приемайте Бетак

- ако сте **алергични** (свърхчувствителни) към бетаксолोल или към някоя от останалите съставки на таблетките (те са изредени в точка 6, Допълнителна информация).
- ако имате **сърдечно-съдово заболяване** (различно от това, за което приемате **Бетак**)
- ако приемате някои лекарства, известни като флоктафенин или султоприд.

Обърнете специално внимание при употребата на Бетак

Преди да приемете Бетак трябва да информирате Вашия лекар, ако:


- Вие сте с **астма** или друго **белодробно** заболяване
- Вие имате **диабет** и **сте на инсулин**
- Вие имате **чернодробно** или **бъбречно** заболяване
- Вие имате проблеми с **щитовидната жлеза**
- Вие сте с **глаукома**
- Вие сте с **псориазис**.

Ако нещо от гореизброените се отнася за Вас, консултирайте с Вашия лекар, който ще реши как да постъпи.

В случай на оперативна интервенция, Вие трябва да информирате анестезиолога, че приемате Бетак.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Особено важно е да информирате лекаря, ако приемате:



- Други лекарства за понижениe на кръвното налягане
- Лекарства за понижениe на кръвната захар
- Лекарства за лечение на сърдечни заболявания, като вазодилататори.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или планирате бременност, или ако кърмите, преди да приемете това лекарство трябва да кажете на Вашия лекар.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Бетак може да повлияе на Вашата способност за шофиране или за работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Бетак

Тези таблетки съдържат лактоза монохидрат. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към лактоза, преди прием на това лекарство се консултирайте с Вашия лекар.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ БЕТАК

Винаги приемайте Бетак точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Вашият лекар ще Ви каже колко таблетки трябва да вземате и кога да го правите.

Вашият лекар ще реши каква доза трябва да вземате.

Като правило обичайната доза за възрастни е 20 mg дневно.

В случай на тежка **бъбречна недостатъчност**, обичайно дозирането трябва да започне с 5 милиграма, веднъж дневно. Дозата може да се повишава с 5 милиграма на всеки две седмици до достигане на максималната препоръчителна доза от 20 милиграма дневно.

В случай на **хронична хемодиализа** (хемодиализа или перитонеална диализа), началната препоръчителна доза е 5 mg/дневно. Впоследствие се препоръчва дозата да



се повишава с 5 милиграма на всеки две седмици до достигане на максималната доза от 20 милиграма дневно.

В случай на **чернодробна недостатъчност**, обичайната доза за възрастни е 20 mg дневно.

Пациенти в старческа възраст

Пациентите в старческа възраст трябва да започнат лечение с бетаксолोल с по-ниска доза, обичайната начална доза е 5 mg веднъж дневно.

Бетак не се препоръчва при деца и юноши (под 18-годишна възраст).

Ако сте приели повече от необходимата доза Бетак

Ако сте приели инцидентно повече от предписаната Ви доза, свържете се с най-близкото спешно отделение или незабавно информирайте Вашия лекар или фармацевт. Запомнете да вземете опаковката и всички останали таблетки със себе си. Предозирането може да причини замаяност, слабост и ниско кръвно налягане.

Ако сте пропуснали да приемете Бетак


Ако пропуснете доза от това лекарство, вземете я възможно най-скоро. Въпреки това в случай че е приближило времето за Вашата следваща доза, прескочете изпуснатата доза и се върнете към обичайния си режим на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Бетак

Много е важно да продължавате са приемате лекарството, докато лекарят препоръчва. Не го спирайте, ако се чувствате по-добре.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ



Както всички лекарства, Бетак може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много тежки нежелани реакции (редки):

Трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако получите някой от следните симптоми след прием на тези таблетки:

- Оток на устните, лицето, устата, езика и гърлото
- Кожен обрив
- Болка в гърдите
- Нерегулярен сърдечен ритъм или промени в сърдечния Ви ритъм
- Тежки замаяност или слабост.

Чести нежелани реакции (неизискващи незабавна медицинска интервенция):

- главоболие
- виене на свят
- гадене, коремна болка
- умора, слабост

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5. СЪХРАНЕНИЕ НА БЕТАК

Съхранявайте на място недостъпно за деца.

Таблетките да се съхраняват под 25⁰ С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпазят таблетките от светлина и влага.

Не използвайте Бетак след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка след «Годен до: ». Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Бетак

- Активната съставка е бетаксолोल (*betaxolol*) (като хидрохлорид). Всяка таблетка съдържа 20 mg бетаксололов хидрохлорид.
- Другите съставки са лактоза монохидрат, целулоза, микрокристална, натриев нишестен глюколат, силициев диоксид, колоиден безводен, магнезиев стеарат, титанов диоксид (E171), поли(винилов алкохол), талк, лецитин, ксантанова гума.

Как изглежда Бетак и какво съдържа опаковката

Бетак 20 mg филмирани таблетки са бели, кръгли, изпъкнали филмирани таблетки, с делителна черта.

Бетак 20 mg филмирани таблетки са налични в блистерни опаковки. Налични са картонени кутии с 30, 50 и 100 таблетки.

Не всички видови опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Medochemie Ltd,
1-10 Constantinoupoleos street,
3011 Limassol,
Кипър

Този лекарствен продукт е разрешен в страните-членки на ЕЕА със следните имена:



България: Betac,
Чешка република: Betamed,
Латвия: Betac,
Полша: Betaxolol Medochemie,
Словакия: Betac.

Дата на последно одобрение на листовката януари 2008.

