

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕНИТЕЛЯ

ЛАГ

Рено!

ДАТА 14.01.09

Бримонидин тартрат Тева 0,2% капки за очи, разтвор

Brimonidine tartrate Teva 0,2% eye drops, solution

Бримонидин тартрат (Brimonidine tartrate)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Бримонидин тартрат Тева 0,2 % капки за очи, разтвор и за какво се използва
2. Преди да приложите Бримонидин тартрат Тева 0,2 % капки за очи, разтвор
3. Как да прилагате Бримонидин тартрат Тева 0,2 % капки за очи, разтвор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бримонидин тартрат Тева 0,2 % капки за очи, разтвор
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БРИМОНИДИН ТАРТРАТ ТЕВА 0,2 % КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Това лекарство е капки за очи, което се използва, за да контролира глаукома. То съдържа бримонидин, който намалява високото налягане в окото и принадлежи към група лекарства, наречени алфа-2 адренергични рецепторни агонисти.

Бримонидин се предписва, за да намали високото налягане в окото, когато очните капки, съдържащи бета-блокери не могат да бъдат използвани, или когато е необходимо второ лекарство за намаляване на налягането в окото до желаното ниво.

Вашето око съдържа бистра водниста течност, която храни окото отвътре. Течността се дренира постоянно извън окото и се замества от нова течност. Ако течността не може да се дренира достатъчно бързо, налягането в окото се повишава и това би могло постепенно да увреди Вашето зрение. Бримонидин действа като намалява производството на течност и повишава количеството на течността, която се дренира. Това намалява налягането в окото, докато продължава да храни окото.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЛОЖИТЕ БРИМОНИДИН ТАРТРАТ ТЕВА 0,2 % КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР

Не използвайте Бримонидин тартрат Тева 0,2 % капки за очи, разтвор:

- ако сте алергични (свъръхчувствителни) към бримонидин или към някоя от останалите съставки на това лекарство.
- ако пациентът е под две годишна възраст
- ако приемате инхибитори на моно-амино-оксидазата (MAO-инхибитори) или други антидипресанти.



Обърнете специално внимание при употребата на това лекарство

Преди да приложите това лекарство, кажете на Вашия лекар:

- Ако Вие имате или сте имали в миналото
 - депресия или други психични проблеми
 - проблеми със сърцето или кръвното налягане
 - намалено или нарушенено снабдяване с кръв, което засяга мозъка, долните или горните крайници
 - бъбречни или чернодробни проблеми
- Ако носите контактни лещи. Не поставяйте капките, докато носите лещите. Изчакайте поне 15 минути след като сте поставили капките, преди да поставите отново лещите. Консервантът в това лекарство, нареченベンзалкониев хлорид, може да предизвика раздразване на окото, а освен това е известно, че променя цвета или обзиветява меките контактни лещи.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или нас скоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство. Кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Това лекарство не трябва да се използва по време на бременност, освен ако Вашият лекар все още Ви го препоръчва.

Това лекарство не трябва да се използва, ако кърмите.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство може да предизвика съниливост, умора или замъглено видждане при някои пациенти. Не шофирайте или не работете с машини, докато тези симптоми не изчезнат. Ако имате никакви проблеми, посъветвайте се с Вашия лекар.

Важна информация за някои от съставките на това лекарство

Това лекарство съдържа 0,05 mg/ml /бензалкониев хлорид: вижте "Обърнете специално внимание при употребата на това лекарство".

3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ БРИМОНИДИН ТАРТРАТ ТЕВА 0,2 % КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР

Винаги използвайте Бромонидин тартрат Тева 0,2 % капки за очи, разтвор точно, както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
За очно приложение.


Обичайната доза е една капка от това лекарство, два пъти дневно през около 12 часа. Не променяйте дозата или не спирайте лекарството, без преди това да говорите с Вашия лекар.
Ако използвате това лекарство заедно с други капки за очи, оставете поне пет минути между поставянето на Бромонидин тартрат Тева 0,2 % капки за очи, разтвор и други капки.

Указания за употреба

Не трябва да използвате бутилката, ако защитната обватка на шийката на бутилката е счупена преди да я използвате за първи път.

Измийте ръцете си преди отварянето на бутилката.

Наклонете главата си назад и погледнете към тавана.



1. Внимателно дръпнете надолу долния клепач, докато не се оформи малко джобче.
2. Обърнете бутилката с капачката надолу и стиснете, за да освободите една капка във всяко око, което се нуждае от лечение.
3. Пуснете долния клепач и затворете окото.
4. Оставете окото затворено и натиснете с пръст ъгъла на окото (мястото, където окото се среща с носа) за едно минута.

Ако не успеете да поставите капка в окото, опитайте отново.

За да се предпазите от инфекция, не допускайте връхчето на бутилката да се допира до окото или където и да е на друго място. Поставете винтовата капачка отново, за да затворите бутилката веднага след като я използвате.

Деца под 12 годишна възраст и бебета

Бримонидин не се препоръчва за употреба при пациенти под 12 годишна възраст и не трябва да се използва при бебета и деца под 2 годишна възраст.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Бримонидин тартрат Тева 0,2 % капки за очи, разтвор

Възрастни

Ако сте приложили повече от това лекарство, отколкото е необходимо, е много малко вероятно това да причини никаква вреда. Поставете следващата капка в обичайното време. Ако се притеснявате, говорете с Вашия лекар или фармацевт. Ако погълнете от това лекарство, тогава трябва да се обадите на Вашия лекар.

Бебета

При бебета (до 4 седмична възраст), на които е приложен бримонидин са съобщени няколко случая на предозиране. Белезите включват съниливост, вялост, ниска телесна температура и затруднения в дишането.

Ако се появи някой от тези признания, назабавно се обадете на Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате Бримонидин тартрат Тева 0,2 % капки за очи, разтвор

Ако забравите да използвате Вашето лекарство, използвайте единична капка във всяко око, на което е необходимо лечение, колкото е възможно по-скоро след като си спомните и се върнете към обичайния ритъм. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Бримонидин тартрат Тева 0,2 % капки за очи, разтвор

За да действа, както трябва, Вие трябва да използвате Бримонидин тартрат Тева 0,2 % всеки ден.

Не спирайте да използвате Вашето лекарство, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го направите.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Бримонидин тартрат Тева 0,2 % може да предизвика нежелани реакции въпреки, че не всеки ги получава.

Много чести (засягащи повече от един човек на 10)



- Раздразване на окото и алергични реакции в окото, зачерьяване на окото, парене, смъдене, сърбеж, чувство за чуждо тяло в окото, бели петна под клепача, замъглено видждане
- Главоболие, съниливост
- Сухота в устата
- Уморяемост.

Чести (засягащи по-малко от 1 човек на 10, но повече от 1 човек на 100)

- Възпаление около окото, оток, зачерьяване и възпаление на или под клепача, лепнещи или болезнени очи, сълзи, чувствителност към светлина, малки наранявания по повърхността на окото, сухота в окото, бледи клепачи, зрителни проблеми
- Замайване, нарушения на вкуса
- Симптоми, наподобяващи настинка
- Храносмилателни проблеми
- Слабост.

Нечести (засягащи по-малко от 1 човек на 100, но повече от 1 на 1 000)

- Общи алергични реакции
- Депресия
- Палпитации, ефекти върху сърдечния ритъм
- Сухота в носа.

Редки (засягат по-малко от 1 човек на 1 000, но повече от 1 на 10 000)

- Скъсено дишане.

Много редки (засягащи по-малко от 1 човек на 10 000)

- Възпаление на окото или намаляване размера на зеницата
- Безсъние
- Прилошаване
- Високо или ниско кръвно налягане.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНИВАТЕ БРИМОНИДИН ТАРТРАТ ТЕВА 0,2 % КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Бримонидин Тартрат Тева 0,2 % % капки за очи, разтвор след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


Не замразявайте и не поставяйте в хладилник.

Извърлете бутилката 28 дни след отварянето ѝ дори, ако има останал разтвор.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа това лекарство:



- Активното вещество е бримонидинов тартрат (*brimonidine tartrate*). Един милилитър от разтвора съдържа 2,0 mg бримонидинов тартрат, еквивалентни на 1,3 mg бримонидин.
- Другите съставки саベンзалкониев хлорид разтвор 50%, поливинилов алкохол, натриев цитрат, монохидрат на лимонената киселина, натриев хлорид, вода за инжекции и натриев хидроксид или хлороводородна киселина за корекция на pH.

Как изглежда това лекарство и какво съдържа опаковката

Капки за очи, разтвор.

Бистър, зеленикаво-жълт разтвор в 5 ml пластмасова бутилка с винтова капачка.

Размер на опаковката: 1, 3 и 6 бутилки. Не всички опаковки могат да се пуснат в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Тева Фармасютикалс България ЕООД
ул. "Н.В.Гогол" № 15, ет.1,
1124 София
България

Производители

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő
Унгария

TEVA UK Ltd.
Brampton Road, Hampden Park,
Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Великобритания

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, Postbus 552
2003 RN Haarlem
Холандия

TEVA Santé SA
Rue Bellocier, 89107 Sens
Франция


IVAX Pharmaceuticals, s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
747 70 Opava –Komárov
Чехия

Дата на последна редакция
Януари 2009

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕИП под следните имена:

Холандия

Brimonidinetartraat 2 mg/ml PCH, oogdruppels



Австрия	Brimonidintartrat Teva 0.2 % Augentropfen
България	Бримонидин тартрат Тева 0,2% капки за очи, разтвор
Германия	BRIMO-Teva® 2mg/ml Augentropfen
Дания	Brimonidine Teva
Гърция	Brimonidine Teva 0,2% Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα
Естония	Brimonidina Teva 2 mg/ml colirio en solución EFG
Финландия	Brimonidine Teva
Франция	Brimonidine Teva 2 mg/ml, collyre en solution
Норвегия	Brimonidine Teva
Полша	BrimoTeva
Португалия	Brimonidina Teva
Румъния	Brimonidine Tartrat Teva 2 mg/ml
Словения	Brimonidine Teva
Словакия	Brimonidin -Teva 0.2%
Обединено кралство	Brimonidine tartrate 0.2%w/v (2 mg/ml) eye drops, solution

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Тева Фармасютикалс България ЕООД
Ул. "Н.В.Гогол" № 15, ет.1,
1124 София
България

