

П1
ОДОБРено!
ДАТА R-696/05.02.09

Листовка:указания за употреба

Моля, прочетете внимателно тези указания за употреба, тъй като те съдържат важна за Вас информация.

Това лекарство може да бъде закупено и без рецепт. За постигане на оптимален терапевтичен успех обаче, Бронхиум Таблетки трябва да се приема съгласно указанията.

- Запазете листовката приложена в опаковката, възможно е в по-късен момент да пожелаете да я прочетете отново.
- За всяка вид допълнителна информация или съвет, моля консултирайте се с Вашия фармацевт.
- В случай, че състоянието Ви се влоши или нямате подобрение след 5 дни, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Bronchicum Compressed Lozenges

Бронхиум Таблетки

Активно вещество:

Thyme liquid extract (течен екстракт от мащерка).

Всяка таблетка съдържа: Thyme liquid extract (течен екстракт от мащерка) (1: 2-2,5) 100 mg

Разтвор за извлечане: амонячен разтвор 10% : глицерол : етанол 90 % (т./т.): вода (1 : 20 : 70 : 109)

Помощни вещества: захароза; повидон; ментол; цинеол; силициев диоксид, колоиден безводен; магнезиев стеарат; арабска гума; стеаринова киселина .

Съдържание на опаковката

PVC/алуминиеви блистери x 20 таблетки за смучене.

Оригинални опаковки с 20 и 50 таблетки за смучене.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

1. Какво представлява Бронхиум Таблетки и в какви случаи се използва това лекарство

Бронхиум Таблетки е лекарство от растителен произход.

Бронхиум Таблетки се прилага за подпомагане на муколизата (втечняване на секретите) в дихателните пътища и откашлянето.

Тази информация се основава на дългогодишен опит.

При треска, задух и ако оплакванията са неясни или продължават повече от 5 дни, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Притежател на разрешението за употреба:

Санофи-Авентис България ЕООД

1303 София, бул. Ал. Стамболовски 103

България

Производител:

A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln, Германия



2. Какво трябва да имате предвид преди да приемете Бронхикум Таблетки

Продуктът не трябва да се приема при данни за свръхчувствителност (алергия) към мащерка или някое от помощните вещества.

Поради липса на достатъчно изследвания, Бронхикум Таблетки не трябва да се използва от бременни жени, по време на кърмеме или от деца под 6 годишна възраст.

При пациенти със захарен диабет трябва да се вземе под внимание съдържанието на захароза в таблетките – 816 mg / таблетка.

Взаимодействия с други лекарства

Не са известни.

Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт ако приемате, или насокор сте приемали други лекарства, дори и ако са такива, отпускані без рецепта.

3. Как трябва да се приема Бронхикум Таблетки

Моля, приемайте Бронхикум Таблетки винаги точно по указанията в тази листовка. Моля, говорете с Вашия лекар или фармацевт, когато възникнат въпроси или колебания.

Оставете Бронхикум Таблетки да се разтвори бавно в устата.

Ако не е предписано друго от лекар, е подходяща следната дозова схема:

1-2 таблетки се смучат бавно до пет пъти дневно.

Доколкото е възможно, разпределете приема на таблетките на равни интервали през деня.

Продължителността на приемане не е ограничена, но моля, вземете под внимание информацията дадена в раздел 1.

Симптоми на интоксикация (отравяне) с Брохикум Таблетки могат да се изключат напълно.

Ако сте пропуснали прием, продължете да вземате лекарството по обичайния начин.

4. Какви нежелани реакции могат да възникнат

Както всички лекарства и Бронхикум Таблетки е възможно да предизвика нежелани реакции. При оценката на нежеланите лекарствени реакции са взети следните:

Много често–повече от 1 на 10 пациента

Често–повече от 1 на 100 пациента

Рядко–повече от 1 на 1000 пациента

Рядко в отделни случаи–повече от 1 на 10 000 пациента

Много рядко–1 или по-малко на 10 000 пациента или изолирани случаи.

В отделни много редки случаи могат да се появят алергични кожни реакции като кожен обрив или копривен обрив (екзантема, уртикария), както подуване на лицето, в устата и/или фарингеалното пространство (едем на Квинке).



В такъв случай, моля, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, така че да се предприемат необходимите мерки. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някакви нежелани лекарствени реакции, които не са описани в листовката. В случай на нежелана лекарствена реакция, преустановете приемането на лекарството и се посъветвайте с Вашия лекар.

5. Как трябва да се съхранява Бронхикум Таблеки

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да се съхранява при температура до 25°C.

Бронхикум Таблетки не трябва да се използва след изтичане срока на годност, означен върху картонената опаковка или върху блистера.

Забележка

Поради наличието на съставки от растителен произход видът на повърхността на таблетката може да се промени. Това не оказва влияние върху качеството или безопасността на продукта.

Указание за диабетици

1 таблетка отговаря на 0,07 ХЕ (хлебни единици).

Дата на актуализация на текста: Февруари 2009

