



RGD: 59013/E/2
27.03.2003

МИКОСИСТ (MYCOSYST)

капсули 50 mg, 100 mg, 150 mg
разтвор за инфузия 200 mg/100 ml

Моля, прочетете внимателно листовката, преди да започнете да използвате лекарството.

- Моля, пазете листовката. Възможно е да поискате да я прочетете отново.
- Ако искате да знаете повече за Вашето лекарство или се съмнявате в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Лекарят е предписал това лекарство на Вас. Никога не го давайте на някой друг. Възможно е да му причини вреда, дори да има същите симптоми като Вас.

Какво представляват Микосист капсулите и инфузията и за какво се използват?

Всяка капсула от лекарството съдържа 50 mg, или 100 mg, или 150 mg от лекарственото вещество fluconazole, а в 100 ml инфузия се съдържат 200 mg fluconazole.

Помощни вещества в капсулите: колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, талк, повидон, царевично нишесте, безводна лактоза, титаниев диоксид, желатина, индиго кармин.

Помощни вещества в разтвора за инфузия: натриев хлорид, вода за инжекции.

Микосист капсулите и инфузията са противогъбично средство, което спира размножаването на гъбичките или ги унищожава. Използва се за лечение на гъбични заболявания на вътрешните органи, кожата, ноктите и лигавиците.

Кога не трябва да се прилагат Микосист капсули и инфузия?

При известна свръхчувствителност към лекарственото вещество флуконазол или някоя от другите съставки на лекарството.

Какво трябва да информирате лекаря преди приемането на капсули Микосист или преди прилагането на инфузионно лечение с Микосист?

- Трябва да уведомите Вашия лекар, ако вземате някои други лекарства (напр. лекарства за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци, лекарства за стимулиране на stomашната функция, диуретици, орални противозачатъчни средства, лекарства за намаляване нивото на кръвната захар, някои противоалергични или противоастматични средства, някои антибиотици или противовирусни средства, или лекарства без рецепт), тъй като могат да окажат влияние върху действието на капсулите и инфузията Микосист.

- Трябва да кажете на Вашия лекар, ако сте имали заболявания на черния дроб или бъбреците.
- Трябва да информирате лекаря, ако сте бременна или кърмите, тъй като по време на бременност и кърмене Микосист капсули и инфузия могат да се прилагат само по изрични указания на Вашия лекар, в дозировка и за период от време по негово предписание.
- Микосист капсули не се препоръчват за лечение на деца поради това, че не могат да бъдат дозирани точно.

Как трябва да се приемат капсулите Микосист?

Лекарят определя дозата на Микосист капсули и продължителността на лечението. Капсулите трябва да се приемат с малко вода, без да се сдъвкат. Вие можете да приемате лекарството по всяко време на деня, но се препоръчва дозите да се вземат в един и същи час (сутрин или вечер).

Храненията нямат ефект върху абсорбцията (усвояването) на лекарството. Продължителността на лечението и приеманата доза са различни според вида и типа на заболяването, ето защо трябва стриктно да спазвате указанията на Вашия лекар.

Важно е да спазвате другите хигиенни препоръки, дадени от Вашия лекар (напр. дезинфекция на ножицата за рязане на ноктите, на бельото, чорапите и обувките).

Как трябва да се прилага инфузията Микосист?

Микосист инфузията се прилага във вената като венозна капкова инфузия. Вашият лекар или медицинската сестра определят скоростта на инфузията. Дозата и честотата на приложението зависи от типа и тежестта на инфекцията.

Микосист инфузията може също така да се прилага на деца в доза, изчислена въз основа на телесното тегло.

Какви са възможните нежелани реакции на Микосист капсули и инфузия и какво трябва да се направи, ако се появят?

По време на лечението най-често могат да се появят гадене, повръщане, диария и нарушен храносмилане. Освен това, е възможна и появата на кожни обриви, сърбеж и главоболие. Консултирайте се с Вашия лекар, ако се появят тези симптоми. Много рядко има съобщения за вредни ефекти върху кръвотворната система, бъбреците и черния дроб.

Както всяко лекарство, Микосист капсули също може да предизвика появата на реакции на свръхчувствителност. Поради това, ако изпитате някои от следните симптоми, като кожни обриви, копривна треска, отоци на крайниците, устните или клепачите, чувство за прилощаване, **незабавно** трябва да се свържете с Вашия лекар.

Ако се появят някои други неочаквани симптоми и оплаквания, освен изброените по-горе нежелани реакции, консултирайте се с Вашия лекар.

Ефекти на Микосист капсули и инфузия върху способността за шофиране и работа с машини

Опитът показва, че няма вероятност лечението с Микосист да увреди способността за шофиране или работа с машини.

Какво трябва да направите, ако сте пропуснали приема на капсулата Микосист?

Вземете я в рамките на 12 часа, но никога не приемайте две дози в обичайното време.

Какви мерки да се вземат в случай на предозиране?

Ако сте приели твърде много капсули по погрешка, обадете се незабавно на лекаря, тъй като може да е необходимо извършването на стомашна промивка или предприемане на друга медицинска мярка.

Ако Ви е приложена твърде висока доза от разтвора за инфузия, е възможно да се засилят нежеланите реакции, напр. стомашно-чревни симптоми. В такъв случай може да се приложи симптоматично лечение според указанията на Вашия лекар.

Как трябва да се съхраняват Микосист капсули и инфузия?

Съхранявайте при температура 15-30°C.

Не използвайте лекарството след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката.

Съхранявайте лекарството на място, недостъпно за деца.

Производител

Гедеон Рихтер АД
Будапеща - Унгария

Дата на последна редакция: 04.03