

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1	
Към РУ	4191, 09.02.09
29/13.01.09	

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Klacid 500mg /vial powder for i.v. infusion

Клацид 500mg /флакон с прах за инфузионен разтвор за интравенозно приложение

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един флакон съдържа 500 mg кларитромицин (*clarithromycin*).

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за приготвяне на инфузионен разтвор за интравенозно приложение.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Klacid 500 mg прах за приготвяне на инфузионен разтвор за интравенозно приложение е показан за лечение на инфекции, причинени от чувствителни микроорганизми, в случай че се налага парентерална терапия. Показанията включват:

- Инфекции на долните дихателни пътища, например остър и хроничен бронхит и пневмония
- Инфекции на горните дихателни пътища, например синусит и фарингит
- Инфекции на кожата и меките тъкани.

Както при останалите антибиотици, преди предписването на Klacid е необходимо да се има предвид честотата на локална резистентност и свързаните с нея препоръки за предписване на антибиотиците.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Да се прилага само интравенозно.

Интравенозното лечение обикновено продължава от 2 до 5 дни, като при възможност се преминава на перорално лечение с кларитромицин.

Възрастни: Обичайната препоръчвана доза е 1,0 g кларитромицин дневно, разделена на два приема по 500 mg, приготвена и приложена по начина, описан по-долу.

Деца: Липсва опит при деца.

Пациенти с бъбречно увреждане: при пациенти с бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс < 30 ml/min), дозата трябва да бъде намалена на половина.



