

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

SERMION®

Сермион®

10 mg обвити таблетки
ницерголин (*nicergoline*)

ИЗПЪЛНИТЕЛКА

Година - Приложение 2

Към РУ №: 11-4084, 29.01.09

Одобрено: 27/25.11.08

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате никакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Сермион 10 mg обвити таблетки и за какво се използва
2. Преди да приемете Сермион 10 mg обвити таблетки
3. Как да приемате Сермион 10 mg обвити таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Сермион 10 mg обвити таблетки
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЕРМИОН 10 mg обвити таблетки И ЗА КАВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Сермион е принадлежи към група лекарства, наречени ерго-алкалоиди, който се използва за лечение на остри и хронични мозъчни метаболитно-съдови нарушения, в резултат на артериосклероза, тромбоза и емболизъм на мозъчните съдове, преходни нарушения на мозъчното кръвообращение (транзиторни исхемични атаки); остри и хронични периферни метаболитно-съдови нарушения (органични и функционални артериопатии на крайниците, болест на Рейно, други синдроми, свързани с нарушен кръвоток); главоболие; добавъчна терапия при артериална хипертония.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ СЕРМИОН 10 mg обвити таблетки

Не приемайте лекарството ако

- сте алергични (свръхчувствителни) към ницерголин или към някоя от останалите съставки на лекарството или други ерго-алкалоиди;
- сте прекарали насърко миокарден инфаркт;
- имате острър кръвоизлив;
- имате ортостатизъм (замайване или загуба на съзнание при изправяне от легнало положение);
- имате тежка брадикардия (забавена сърдечна дейност).

Обърнете специално внимание при употребата на Сермион 10 mg обвити таблетки

- ако имате повишени стойности на пикочната киселина или страдате от подагра
- ако имате хипертония лекарството може да причини постепенно понижение на кръвното налягане

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарства, които се използват за понижаване на кръвното налягане, ацетилсалицилова киселина и лекарства за лечение на подагра или за понижаване на нивата на пикочната киселина.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите се посъветвайте с Вашия лекар, за да Ви каже как да приемате Вашето лекарство. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Тъй като ефекта върху способността за шофиране и работа с машини не е специално проучен, винаги подхождайте с внимание в тези ситуации.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СЕРМИОН 10 mg обвити таблетки

Винаги приемайте Сермион 10 mg обвити таблетки точно както Ви е казал Вашия лекар.

Препоръчваната дневна доза е 5-10 mg три пъти дневно на равни интервали от време за предпочтане между храненията, за продължително лечение.

Ако сте приели повече от необходимата доза Сермион 10 mg обвити таблетки

Предозиране: може да настъпи преходно понижение на кръвното налягане.

Консултирате с лекар ако приемете повече таблетки от предписаното!

Ако сте пропуснали да приемете Сермион 10 mg обвити таблетки

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Продължете приема на таблетките по обичайния начин. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели приема на Сермион 10 mg обвити таблетки

Не спирайте да вземате Сермион 10 mg обвити таблетки, освен ако Вашият лекар не Ви е казал да направите това.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Сермион 10 mg обвити таблетки може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Рядко се съобщават нежелани лекарствени реакции, които обикновено не са клинично тежки: хипотония и замаяност, стомашни смущения, главоболие, объркване, диария, запек, гадене, чувство на затопляне, топли вълни, сънливост, безсъние, увеличения на нивото на пикочна киселина в кръвта.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА СЕРМИОН 10 mg обвити таблетки

Да се съхранява при температура под 25°C.

Съхранявайте на място недостъпно за деца.

Не използвайте Сермион 10 mg обвити таблетки след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срока на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Сермион 10 mg обвити таблетки

- Всяка обвита таблетка съдържа 10 mg от активната съставка ницерголин
- Другите съставки са
 - Сърцевина на таблетката: кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, калциев хидроген фосфат дихидрат
 - Покритие на таблетката: захароза, талк, арабска гума, гума сандарах, магнезиев карбонат, титанов диоксид (E171), колофон, карнаубски восък

Как изглежда лекарството и какво съдържа опаковката

Кръгли, изпъкнали, бели обвити таблетки.

Опаковка: 10 mg обвити таблетки в прозрачни PVC/PVDC//Al/PVdC блистери поставени в картонена кутия. Опаковка от 50 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

Pfizer Enterprises SARL

Rond-point du Kirchberg
51, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Люксембург, В. Х. Люксембург

Производител

Pfizer Italia S.r.l.

Via del Commercio
63046 Marino del Tronto
Ascoli Piceno, Италия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Дата на последно одобрение на листовката {мм /гггг}.

