

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ...dd.02.05...

Methotrexate_Teva Renew Package Insert Corrected 07 04_12 12 04

Листовка с информация за пациентта

МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА

Прочетете тази листовка внимателно преди да започнете да използвате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я четете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или към Вашия фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично за Вас и не трябва да го давате на други хора. То може да ги увреди, дори ако техните симптоми са еднакви с Вашите.

В тази листовка:

1. Какво представлява МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА и за какво се използва
2. Преди да използвате МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА
3. Как да използвате МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Съхранение на МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА

Име на лекарствения продукт

МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА

Състав

МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА

МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА съдържа във всеки 1 ml от разтвора:

Лекарствено вещество:	Methotrexate	26 mg
Помощни вещества:	Sodium chloride	4.9 mg
	Sodium hydroxide	прибл. 4.8 mg
	Вода за инжекции	1.0 ml

Притежателят на разрешението за употреба на това лекарство е

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

5 Basel Street, P.O. Box 3190

Petach Tikva 49131, ISRAEL

Производителят на това лекарство е

Pharmachemie B.V. - Teva Group

Swensweg 5, Haarlem, P.O. Box 552

2003 RN Haarlem,

The Netherlands

Регистрационен номер (в Регистъра по чл. 28 от ЗЛАХМ): 9800330



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕTHOTREXATE-TEVA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Фармацевтична форма, съдържание и опаковка

Разтвор за инжекции, 25 mg/ml;

Ампули по 2 ml - по 5 броя в опаковка;

Флакони по 2, 4, 8, 20 и 40 ml; Флакони по 40 ml - по 10 броя в опаковка.

Медицинска категория

МЕTHOTREXATE-TEVA принадлежи към групата на цитотоксичните лекарства (лекарства за лечение на рака). МЕTHOTREXATE-TEVA пречи на раковите клетки да растат, което води до тяхната смърт. Той се използва също така при тежък псориазис и при тежък ревматоиден артрит.

Използва се в случаи на

- доброкачествени и злокачествени тумори на матката
- злокачествени заболявания на лимфните възли
- злокачествени заболявания на белите кръвни клетки (левкемия)
- лечение и предпазване от злокачествени заболявания на кръвта в централната нервна система (левкемичен менингит)
- рак на костите
- напреднал рак на главата и шията
- рак на пикочния мехур
- напреднал стадий на микозис фунгоидес, форма на кожен рак
- тежък псориазис (кожно заболяване) след други лечения, които са се оказали неефикасни
- тежък активен ревматоиден артрит (заболяване на ставите) след лечение с други лекарства, които са се оказали неефикасни


2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЗВАТЕ МЕTHOTREXATE-TEVA

Не употребявайте МЕTHOTREXATE-TEVA:

- когато функцията на Вашите бъбреци е силно намалена. Това се проявява чрез намаляване честотата на уринирането
- когато функцията на черния Ви дроб е силно намалена
- когато кръвната Ви картина не е нормална. Това се манифестира чрез появата на анемия, неочеквано кървене и/или появата на синини, както при натъртване, температура, възпаление на гърлото и/или везикули (мехурчета) в устата или около ануса
- когато белите Ви дробове саувредени от предишно лечение с метотрексат
- когато употребявате големи количества алкохол
- когато сте силно отслабнали и изнемощяли и не се чувствате добре
- когато сте свръхчувствителни на метотрексат или към някоя от другите съставки на инжекционния разтвор
- когато сте бременна или кърмите дете

Проявете специално внимание при употребата на МЕTHOTREXATE-TEVA:

- когато бъбреците Ви не работят добре
- когато имате някакво възпаление
- когато имате язва на stomахa
- когато имате тежко възпаление на червата (улцерозен колит)



- когато сте отслабнали и изнемощяли
- когато сте много млади или много стари
- когато сте подложени едновременно на радиотерапия

Моля, уведомете Вашия лекар, ако едно от тези предупреждения се отнася до Вас или се е отнасяло в миналото до Вас.

Употреба на МЕTHOTREХATE-TEVA с храна и напитки

МЕTHOTREХATE-TEVA не трябва да се употребява с алкохол или с други лекарства, които могат да увредят функцията на черния дроб.

Употреба при бременност и кърмене

Този лекарствен продукт не трябва да се употребява при бременност и кърмене.

Ефекти върху възможността за шофиране и използване на машини:

Това лекарство може да причини неясно виждане, съниливост и парализа на част от тялото. Съветваме Ви, по време на използване на този продукт да не извършвате дейности, които изискват концентрация, такива като участие в транспортния трафик, боравене с машини и работа на високо.

Винаги наблюдавайте децата, използващи това лекарство, специално когато те играят на улицата.

Употреба на метотрексат в комбинация с други лекарства:

Понякога лекарствата могат взаимно да повлияват своята активност и/или своите нежелани лекарствени реакции, ако се употребяват едновременно.

Моля, отбележете: следващите забележки могат да бъдат приложими към лекарства, които сте използвали преди известно време или ще използвате в близко бъдеще. Взаимодействие може да възникне, когато този разтвор се употребява заедно с:

- обезболяващи лекарства, като ацетил салицилова киселина, карбасалат калциум, диклофенак, ибупрофен и напроксен. Това взаимодействие е приложимо при високи дозировки на МЕTHOTREХATE-TEVA. При ставни нарушения, гореспоменатите обезболяващи понякога се комбинират с МЕTHOTREХATE-TEVA, но само при ниски дозировки на последния
- пробенецид и алопуринол; лекарства против подагра
- сульфонамиди (сульфадиазин, сульфафуразол, сульфаметизол, триметоприм, сульфаметоксазол/триметоприм, сульфаметрол/триметоприм); противовъзпалителни лекарства
- фенитоин, лекарства против епилепсия и сърцевиене
- тетрациклини (доксициклин, миноциклин, тетрациклин); противовъзпалителни лекарства
- хлорамфеникол; противовъзпалителни лекарства
- пара-аминобензоена киселина; лекарства против кожни нарушения
- други противоракови лекарства (доксорубицин, блеомицин, циклофосфамид, винкристин, цисплатин, цитозин арабинозид, аспарагиназа)
- аминогликозиди (амикацин, гентамицин, неомицин, нетилмицин, тобрамицин); противовъзпалителни лекарства
- преднизон и хидрокортизон; кортикоステроиди
- радиация при радиотерапия
- ваксинация с живи вируси
- витаминни препарати, съдържащи фолиева киселина или деривати на фолиевата киселина (като фолинова киселина)



Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако употребявате или сте употребявали неотдавна този или всякакви други лекарства, даже такива, които се отпускат без лекарско предписание.

Моля забележете, че може да знаете горните лекарства под друго име, обикновено името на запазената фабрична марка. В този раздел е споменато само лекарственото вещество или група от лекарствени вещества на лекарствения продукт и не е споменато името на запазената фабрична марка. Винаги разглеждайте опаковката на лекарствения продукт, който употребявате в момента, и вложената в нея листовка, за да видите кое е неговото лекарствено (активно) вещество.

Специални предупреждения

Във всички случаи кръвта и урината Ви ще бъдат изследвани по време на лечението с Метотрексат-Тева. Тези изследвания се използват, за да се установи съответната функция на Вашия чер дроб и бъбреци. Ако това не е достатъчно, Вашият лекар може да поиска да проведе допълнителни чернодробни и бъбречни изследвания. По време на лечение с МЕTHOTREXATE-TEVA обикновено се прави рентгеново изследване на гръденния кош.

Ако развиете възпаление (инфекција) по време на лечението, терапията с МЕTHOTREXATE-TEVA ще бъде спряна и ще бъдете подложени на лечение за противодействие на възпалението.

Ако по време на терапията с МЕTHOTREXATE-TEVA развиете суха кашлица без продукция на мукус, моля докладвайте това на Вашия лекар колкото е възможно по-скоро. Той може да реши да спре лечението с МЕTHOTREXATE-TEVA. Може да бъдат направени изследвания за оценка на Вашата белодробна функция.

Ако по време на лечението с МЕTHOTREXATE-TEVA развиете диария или възпаление на мукозните мембрани на Вашата уста, моля докладвайте това на Вашия лекар колкото е възможно по-скоро. Той може да реши да спре лечението с МЕTHOTREXATE-TEVA.

Ако Вашата кръв е с параметри извън нормалните, тъй като Вашият костен мозък произвежда твърде малко кръвни клетки, прилагането на допълнителна кръв може да бъде необходимо.

Както мъжете, така и жените, трябва да вземат контрацептивни мерки по време на и поне три месеца след лечението с МЕTHOTREXATE-TEVA, за да се предотврати бременност.

Когато се провежда едновременно радиотерапия, тя може да повиши риска от умиране на тъканите, като например мускулна тъкан, сухожилие, хрущял (меки тъкани).

Децата могат да бъдат периодично изследвани, за да се открият ранни белези на изоставане в ученето.



3. КАК ДА УПОТРЕБЯВАТЕ МЕTHOTREXATE-TEVA

Дозировка и начин на употреба

Колко (какво количество) и колко често да получавате МЕTHOTREXATE-TEVA и дали той да бъде комбиниран с други лекарства, зависи от показанията. Това също така зависи от нучните познания, които са налице в момента. Поради тази причина е важно, само лекари с опит в лечението на рака, ставните заболявания или псoriазис, да предписват МЕTHOTREXATE-TEVA.

Ако приемете повече МЕTHOTREXATE-TEVA, отколкото трябва

Ако мислите, че сте приели повече от предписаната доза, моля, уведомете Вашия (ако отсъства-друг) лекар незабавно.

В случай на предозиране, рисъкът от, и тежестта на нежеланите лекарствени реакции, изброени по-долу, ще нараства.

Ако забравите да приемете МЕTHOTREXATE-TEVA

Ако пропуснете една инжекция, моля поставете я колкото е възможно по-скоро. Ако времето за приемане на следващата доза, обаче, е почти дошло, прескочете пропуснатата доза и продължете с Вашата нормална дозова схема. Не вземайте двойна доза. В случай на съмнение, трябва да се консултирате с Вашия лекар.

Ефекти, които могат да бъдат очаквани, когато лечението с МЕTHOTREXATE-TEVA бъде спряно

Ако, без предписание на лекаря, Вие внезапно спрете употребата на МЕTHOTREXATE-TEVA, симптомите, които сте имали преди лечението, могат да се явят отново. В случай на съмнение, трябва да се консултирате с Вашия лекар.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛANI ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Като всички лекарства, МЕTHOTREXATE-TEVA може да причини нежелани лекарствени реакции (НЛР).

Следните нежелани лекарствени реакции са сериозни. Ако една или повече от тези нежелани лекарствени реакции се явят, моля консултирайте се с Вашия лекар незабавно. Той може да реши да спре лечението.

- треска
- сериозни възпаления, като тези на на мукозните покривки на устата Ви. Те са причинени от липса на достатъчно бели кръвни клетки във Вашата кръв
- неочеквано кървене и/или кръвонасядания. Те са причинени от липса на достатъчно кръвни площици (тромбоцити) във Вашата кръв
- възпаление или друго нарушение в белите дробове. Това се проявява чрез кашлица (особено суха, дразнеща кашлица, при която не се отделя никакъв слузест секрет), или чрез задух, или чрез повишаване на телесната температура
- повръщане, диария и дехидратация
- реакции на свръхчувствителност. Те се проявяват чрез внезапно усещане, че не сте добре, изпитвате чувство за страх, ставате блед или зачервен, или изпадате в шок. Вие можете да изпитате също сърбеж, треперене, стягане в гръденния кош, изпотяване или сърцебиене
- възпаление на кожата и мукозата (Steven-Johnson syndrome).



Следните нежелани лекарствени реакции са по-малко сериозни нежелани лекарствени реакции на МЕТНОТРЕХАТЕ-ТЕВА:

Кръв
Анемия.

Стомашно чревен път

Гадене, намален апетит, кървави храчки, възпаление на гърлото, възпаление на лигавиците на червата, кървене, стомашна язва и черни изпражнения, могат да се явят.

Нервна система

Главоболие, замъглено виждане, сънливост, скованост във врата, болки в гърба, възпаление на мозъчната тъкан (манифестиращо се с треска, главоболие, възбуда, сънливост и замъглено съзнание), обърканост, възбудимост, лесно забравяне, разстройство на координацията, парализа на част от тялото, атака от крампи, конвулсии и проблеми с говоренето и писането, могат да се явят. Може да се развие също така неврологичен синдром. Това се манифестира чрез едно различно поведение или различни автоматични отговори на някои стимули (рефлекси). Координацията между това, което виждате и вашите движения, може да бъде намалена също така.

Чер дроб или жълчка

Намалена чернодробна функция, дължаща се на сериозна чернодробна болест.

Кожа

Сърбеж, зачервяване на кожата, кожен обрив със силен сърбеж, свръхчувствителност на светлина или слънчева светлина, пигментация, загуба на коса, кръвонасядания, акне и циреи, могат да се явят. Кръвоносните Ви съдове могат да се разширят, причинявайки червени или сини петна. Червена или свръхчувствителна кожа, поради въздействие на обльчване или слънчево изгаряне, може да влоши състоянието си.

Мускули и кости

Когато се извършва едновременно радиотерапия, може да се повиши риска, при което изложената на въздействие мускулна тъкан, сухожилие, хрущял (мека тъкан), отмира.

Бъбреци и уринарни пътища

Намалена функция на бъбреците, симптоми на дехидратация, възпаление на пикочния мехур и появя на кръв в урината.

Размножителни органи

Намалено производство на яйцеклетки или сперматозоиди, нередовен менструален цикъл, вагинална секреция, бесплодие, помятане, дефекти на плода, намалено сексуално желание и импотенция, могат да се появят.

Други

Мускулни болки, болка в ставите, чувство за физическо неразположение, необяснима умора, студени тръпки, замаяност и намалена резистентност към болестите, диабет, остеопороза, инфекции, възпаление на кръвоносните съдове (васкулити) и една увеличена лимфна жлеза (лимфома) може да се появят.

Ако се появи нежелана лекарствена реакция, която не е спомената в настоящата листовка, или за която имате чувството, че е сериозна, моля, информирайте своя лекар или фармацевт.



5. СЪХРАНЕНИЕ НА МЕTHOTREXATE-TEVA

Да се съхранява на сухо място, в пътно затворена опаковка, с оглед да се пази от действието на светлината. Да се съхранява при температура под 25°C. Ако се съхранява по такъв начин, току лекарство може да бъде използвано до датата, обявена на опаковката.

Срок на годност

Да не се използва след изтичане на срока на годност, означен върху опаковката - да не се използва Methotrexate-Teva след датата, обявена на опаковката след "exp". Първите две цифри отбелязват месеца, последните цифри отбелязват годината.

Да не се използват инжекциите МЕTHOTREXATE-TEVA разтвор, ако разтворът е непрозрачен.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Дата на последна редакция на листовката: 12.12.2004 г.

