

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА R-10422/23.12.08

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

SOLCOGYN vaginal solution СОЛКОГИН вагинален разтвор

Състав:

Активни съставки в 1 ml:

Nitric acid 70%	578.5 mg
Acetic acid 99%	20.4 mg
Oxalic acid dehydrate	58.6 mg
Zinc nitrate hexahydrate	6.0 mg
Вода до 1 ml.	

Лекарствена форма, количество в една опаковка:

Вагинален разтвор, 2 флакона x 0,5 ml в една опаковка.

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба:

Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH

Düsseldorfer Straße 40 A

65760 Eschborn

Германия

Тел: +49 (0)6196 99889 0

Факс: +49 (0)6196 99889 900

Производител на лекарствения продукт:

ICN Switzerland AG

CH – 4127 Birsfelden

Ruhrbergstrasse 21

Switzerland

Тел. +41 61 316 16 16

Факс: +41 61 313 00 73

Фармакотерапевтична група/Начин на действие:

Действието на Solcogyn върху двата вида епител на маточната шийка – нормален и изменен е различно и се дължи на специфичния състав на лекарствения продукт. След приложението му върху зоните, подлежащи на лечение се наблюдава незабавна фиксация на лигавичния епител. Нормалната покривна тъкан на вегиналната част на маточната шийка, която е по-устойчива, практически не се засяга. Фиксацията настъпва бързо, за няколко минути и може да бъде разпозната по бледожултото или сиво оцветяване на тъканите.

По-късно под образувалата се коричка се формира нов епител. Коричката отпада след няколко дни.

Терапевтични показания:

Solcogyn е лекарствена форма за локално /местно/ приложение, специално предназначена за лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка.

Противопоказания: Злокачествени изменения на маточната шийка.

Лекарствени и други взаимодействия: Не са известни.

Дозировка и начин на приложение:

Solcogyn се прилага локално /местно/ в областта на изменената лигавична повърхност от лекар-специалист /акушер-гинеколог/, следвайки следната схема:



1. Секретът на маточната шийка се отстранява с памучен тампон. Цялата повърхност се обработва с разтвор на оцетна киселина, за да може да се ограничи зоната с измененията.
2. Мастото се третира с памучен тампон, напоен със Solcogyn.
3. След 1-2 минути Solcogyn се нанася повторно по същия начин.
4. След лечебната процедура не се налага пациентът да спазва специален режим – няма ограничения относно къпане, плуване, полов контакт.
5. В случаите на област с голяма площ, дълбочина и фисури, в която разтворът не би проникнал достатъчно дълбоко при първото нанасяне, се препоръчва повторна процедура след 4-5 дни.
6. Необходимо е пациентът да се яви за преглед при лекаря обикновено 4 седмици след началното лечение. Ако не е постигнат добър резултат, лечението продължава, последвано от контролен преглед също след 4 седмици.

Продължителността на лечението се определя от лекаря.

Препоръки при употреба:

Внимание! Solcogyn е силно разлягащ разтвор. Да се избягва контактът с дрехите, кожата и особено очите. В случай на попадане на Solcogyn върху нежелана област, измийте я незабавно с вода или по-добре с 1% разтвор на натриев бикарбонат.

Нежелани лекарствени реакции:

Досега няма данни за нежелани лекарствени реакции. Не са наблюдавани усложнения като образуване на ръбци и доформация на канала на маточната шийка. Лечението е безболезнено.

Начин на съхранение:

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на места недостъпни за деца.

Срок на годност: 3 години.

Дата на последна редакция на листовката: 12/2008 г.

