

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА РЕГИСТРАЦИЯ

Листовка - Приложение 2

ПАРОКСАТ™ 20 mg филмирани таблетки

PAROXAT™ 20 mg film-coated tablets

пароксетин (paroxetine)

към РУ № 11-ЧЧ2Ч, МД.03.09

Одобрено: 30/27.01.09

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Пароксат и за какво се използва
2. Преди да приемете Пароксат
3. Как да приемате Пароксат
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Пароксат
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРОКСАТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Пароксат е лекарство за лечение на възрастни пациенти с депресия и/или тревожни разстройства. Тревожните разстройства, който могат да се лекуват с Пароксат са: обсесивно-компулсивно разстройство (повтаряеми натрапливи мисли с неконтролирано поведение), паническо разстройство (пристипи на паника, включително такива, предизвикани от агрофобия, което е страх от открити пространства), социално-тревожно разстройство (страх от или избягване на социални ситуации), посттравматично стресово разстройство (тревожност след травматично преживяване) и генерализирано тревожно разстройство (постоянно чувство за тревожност и нервност).

Пароксат принадлежи към група лекарства, наречени селективни инхибитори на обратното поемане на серотонина. В мозъка на всеки човек има вещества, наречено серотонин. Хората, които са депресирани или тревожни, имат по-ниски нива на серотонина от останалите хора. Не е напълно изяснено как действат Пароксат и останалите инхибитори на обратното поемане на серотонина, но те може да спомагат за повишаване на нивата на серотонин в мозъка. Правилното лечение на депресията или тревожните разстройства е важно, за да Ви помогне да сте по-добре.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ПАРОКСАТ

Не приемайте Пароксат...

- Ако приемате лекарства, наречени моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ, включително моклобемид), или ако сте ги приемали през последните две седмици. Вашият лекар ще ви посъветва как трябва да започнете приема на Пароксат, след като спрете да приемате МАОИ.
- Ако приемате антидепресантите лекарства трицикли или пимозид.
- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към пароксетин или към някоя от останалите съставки на Пароксат (посочени по-долу).

Ако някое от посочените по-горе твърдения се отнася до Вас, уведомете Вашия лекар без да приемате Пароксат.

Обърнете специално внимание при употребата на Пароксат

Коментирайте с Вашия лекар...

- Приемате ли някакви други лекарства (вж. *Прием на други лекарства и Пароксат* в тази листовка)?
- Имате ли проблеми с бъбреците, черния дроб или сърцето?



- Имате ли епилепсия и имали ли сте гърчове в миналото?
- Имали ли сте маниакални епизоди (свръхреактивно поведение или мисли)?
- Прилагат ли Ви електроконвулсивна терапия (ЕКТ)?
- Имали ли сте проблеми, свързани с кървене, или приемате ли лекарства, които могат да повишат риска от кървене (това включва лекарства за разреждане на кръвта като варфарин, антипсихотични лекарства като перфеназин или клозапин, трициклични антидепресанти, лекарства, използвани за лечение на болка и възпаление, наречени нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като аспирин, ибупрофен, целекоксиб, етодолак, диклофенак, мелоксикам)?
- Имате ли диабет?
- На ниско-натриева диета ли сте ?
- Имате ли глаукома (повищено вътрешно налягане)?
- Бременна ли сте или планирате да забременеете (вж. *Бременност, кърмене и Пароксат*, в тази листовка)?
- На възраст под 18 години ли сте (вж. *Деца и подрастващи на възраст под 18 години*, в тази листовка)?

Ако отговорите с ДА на който и да било от тези въпроси и все още не сте го обсъдили с Вашия лекар, обърнете се към него за съвет какво да правите по отношение на приема на Пароксат.

Деца и подрастващи на възраст под 18 години

Пароксат не трябва да се прилага при деца и подрастващи на възраст под 18 години. Също така, при пациентите на възраст под 18 години е повишен рисък от нежелани лекарствени реакции като опити и мисли за самоубийство и враждебност (главно агресия, опозиционно поведение и ярост), когато приемат Пароксат. Ако Вашият лекар е предписал Пароксат на Вас (или на Вашето дете) и Вие искате да обсъдите този въпрос, моля върнете се при него. Трябва да уведомите Вашия лекар, ако някой от посочените по-горе симптоми се появи или се влоши, докато Вие (или Вашето дете) приемате Пароксат. Освен това, дългосрочните ефекти на Пароксат за безопасността по отношение на растежа, съзряването и познавателното и поведенческо развитие все още не са доказани при тази възрастова група.

При изпитвания на пароксетин при деца и подрастващи на възраст под 18 години честите нежелани лекарствени реакции, засягащи по-малко от 1 на 10 пациенти, са били: засилване на мислите и опитите за самоубийство, целенасочено самонараняване, враждебност, агресивност и недружелюбност, липса на апетит, треперене, патологично потене, хиперактивност (имат прекалено много енергия), възбуда, промяна на настроението (включително плач). Изпитванията показват, че същите симптоми са засягали децата и подрастващите, приемащи таблетки захар (плацебо) вместо пароксетин, въпреки че в този случай са наблюдавани по-рядко.

При някои пациенти на възраст под 18 години в тези проучвания са наблюдавани симптоми на отнемане при спиране приема на пароксетин. Тези ефекти са били сходни с наблюдаваните при възрастни след спиране на приема на пароксетин (вж. Точка 3, *Как да приемате Пароксат*, в тази листовка). В допълнение на това, при пациентите на възраст под 18 години също често (при по-малко от 1 на 10 пациенти) се наблюдават стомашни болки, изнервеност и промяна в настроението (включително плач, мисли и опити за самоубийство).

Мисли за самоубийство и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство

Понякога, ако сте в депресия и/или имате тревожни разстройства, може да Ви минават мисли да се самонараните или самоубиете. Те може да се засилят, когато започнете да приемате антидепресанти, тъй като на всички тези лекарства е необходимо време, за да действат, обикновено две седмици, но понякога и повече.

По-вероятно е да имате такива мисли:

- ако преди сте имали мисли за самоубийство или за самонараняване.
- ако сте млад възрастен. Информацията от клинични изпитвания е показвала повишен риск за суицидно поведение при млади възрастни (на възраст под 25 години) с психиатрични проблеми, които са лекувани с антидепресант.



Незабавно се свържете с Вашия лекар или направо отидете в болница, ако имате мисли за самоизраняване или самоубийство.

Може да е полезно да кажете на роднина или близък приятел, че сте депресирани или имате тревожно разстройство и да ги помолите да прочетат тази листовка. Може да ги помолите да Ви кажат, ако смятат, че депресията или тревожността Ви се влошават, или ако са притеснени от промени в поведението Ви.

Важни нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при прием на Пароксат

Някои пациенти, които приемат Пароксат, развиват състояние, наречено акатизия, при което усещат, че не могат да си намерят място и не могат да седят или стоят прави спокойно. Други пациенти развиват състояние, наречено серотонинов синдром, при което имат някои или всички от следните симптоми: обърканост, беспокойство, потене, втиснате, треперене, халюцинации (страни образи и звуци), внезапни спазми на мускулите или забързан сърден ритъм. Свържете се с Вашия лекар, ако забележите някои от тези симптоми. За повече информация по отношение на тези или други нежелани лекарствени реакции на Пароксат (вж. Точка 4, *Нежелани лекарствени реакции*, в тази листовка).

Прием на други лекарства с Пароксат

Някои лекарства могат да повлият начина на действие на Пароксат, или да повишат риска от развитие на нежелани лекарствени реакции. Също така, Пароксат може да повлияе начина на действие на някои други лекарства. Такива са:

- Лекарства, наречени **моноаминооксидазни инхибитори** (МАОИ, включително моклобемид) – вж. *Не приемайте Пароксат*, в тази листовка.
- Тиоридазин или пимозид, които са **антисихотични лекарства** – вж. *Не приемайте Пароксат*, в тази листовка.
- Аспирин, ибупрофен или други лекарства, наречени НСПВС като целекоксиб, етодолак, диклофенак и мелоксикам, които се прилага при **болка и възпаление**.
- Трамадол, **болкоуспокоително**.
- Лекарства, наречени триптани, като суматриптан, които се използват за лечение на **мигрена**.
- Други **антидепресанти**, включително други инхибитори на обратното поемане на серотонина и трициклични антидепресанти като кломипрамин, нортриптилин и дезипрамин.
- **Хранителна добавка**, наречена триптофан.
- Лекарства като литий, рисперидон, перфеназин, клозапин (наречени **антисихотични лекарства**), които се използват за лечение на **някои психиатрични състояния**.
- Комбинация от фозампренавир и ритонавир, която се използва за лечение на **инфекция с вируса на СПИН (HIV)**.
- Жъlt кантарион, билка, която се прилага при **депресия**.
- Фенобарбитал, фенитоин, натриев валпроат или карбамазепин, използвани за лечение на **гърчове или епилепсия**.
- Атомоксетин, който се използва за лечение на **хиперактивно разстройство с липса на внимание**.
- Проциклидин, който се използва за облекчаване на трепор, главно при **болестта на Паркинсон**.
- Варфарин или други лекарства (наречени антикоагуланти), които се използват за **разреждане на кръвта**.
- Пропафенон, флецианид и лекарства, които се използват за лечение на **неравномерен сърден ритъм**.
- Метопролол, бета-блокер за лечение на **повищено кръвно налягане и сърдечни проблеми**.
- Рифампицин, използван за лечение на **туберкулоза и лепра**
- **Линезолид, антибиотик**.

Ако приемате или насконо сте приемали някое от лекарствата в този списък, и все още не сте ~~се съгласили~~ с Вашия лекар, върнете се при него и го попитайте какво да правите. Може да бъде наложена промяна на дозата или да Ви бъде предписано друго лекарство.

Моля, кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насконо сте приемали ~~некакви~~ други лекарства, включително и такива, които се купуват без рецепт.



Прием на Пароксат с храни и напитки

Не консумирайте алкохол, докато приемате Пароксат. Алкохолът може да влоши симптомите Ви или нежеланите лекарствени реакции. Приемът на Пароксат сутрин с храна ще намали вероятността от гадене.

Бременност и кърмене и прием на Пароксат

Ако вече приемате Пароксат и сте установили, че сте бременна, незабавно трябва да се свържете с Вашия лекар. Говорете с Вашия лекар и **ако планирате да забременеете.** Това се налага, тъй като някои проучвания са показвали повишаване на риска от сърдечни дефекти при бебета, чийто майки са приемали пароксетин през първите няколко месеца от бременността. При тези проучвания е установено, че по-малко от 2 на 100 бебета (2%), чийто майки са приемали пароксетин през ранните етапи на бременността, са имали сърдечен дефект, в сравнение с нормалното ниво от 1 на 100 бебета (1%), което се наблюдава в общата популация. Когато се вземат предвид всички типове вродени дефекти, не се наблюдава разлика в броя на бебетата, родени с вродени дефекти, след като майките им са приемали пароксетин по време на бременността, в сравнение с общия брой вродени дефекти, които се наблюдават в общата популация. Вие и Вашият лекар може да решите, че е по-добре да минете на друго лечение или постепенно да спрете да приемате Пароксат, докато сте бременна. Въпреки това, в зависимост от обстоятелствата, Вашият лекар може да реши, че за Вас е по-добре да продължите да приемате Пароксат.

Ако приемате Пароксат през последните 3 месеца от бременността, трябва да уведомите акушерката, защото бебето може да има някои симптоми, когато се роди. Тези симптоми обикновено започват в рамките на първите 24 часа след раждането на бебето. Те са невъзможност за спане или нормално хранене, проблеми с дишането, синкав оттенък на кожата или кожата е твърде топла или студена, гадене, продължителен плач, стегнати или отпуснати мускули, летаргия, трепвания или гърчове. Ако Вашето бебе има някои от тези симптоми, когато се роди, и това Ви притеснява, свържете се с Вашия лекар или акушерка, които ще Ви посъветват какво да правите.

Възможно е Пароксат да се отделя в много малки количества в кърмата. Ако приемате Пароксат, преди да започнете да кърмите, трябва да се върнете при Вашия лекар и да поговорите с него. Вие и Вашият лекар може да решите, че може да кърмите, докато приемате Пароксат.

Шофиране и работа с машини

Възможните нежелани лекарствени реакции на Пароксат включват замаяност, обърканост, сънливост и замъглено зрение. Не шофирайте и не работете с машини, ако получите тези нежелани реакции.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПАРОКСАТ

Винаги приемайте Пароксат, точно както Ви е казал лекарят. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Понякога може да се налага да приемате по повече от една таблетка или по половин таблетка. Дадената по-долу таблица показва колко таблетки трябва да приемате.



Подходящите дози за различни състояния са посочени в таблицата по-долу:

	Начална доза	Препоръчителна дневна доза	Максимална дневна доза
Депресия	20 mg (1 таблетка)	20 mg (1 таблетка)	50 mg (2 таблетки и половина)
Обсесивно-компултивно разстройство	20 mg (1 таблетка)	40 mg (2 таблетки)	60 mg (3 таблетки)
Паническо разстройство	10 mg (половин таблетка)	40 mg (2 таблетки)	60 mg (2 таблетки)
Социално тревожно разстройство	20 mg (1 таблетка)	20 mg (1 таблетка)	50 mg (2 таблетки и половина)
Посттравматично стресово разстройство	20 mg (1 таблетка)	20 mg (1 таблетка)	50 mg (2 таблетки и половина)
Генерализирано тревожно разстройство	20 mg (1 таблетка)	20 mg (1 таблетка)	50 mg (2 таблетки и половина)

Вашият лекар ще Ви посъветва каква доза Ви е необходима, когато започвате да приемате Пароксат за първи път. Повечето хора започват да се чувстват по-добре след няколко седмици. Ако след този период не започнете да се чувствате по-добре, поговорете с Вашия лекар и той ще Ви посъветва какво да правите. Лекарят може да реши постепенно да увеличава дозата Ви с по 10 mg, до достигане на максималната дневна доза.

Приемайте таблетките сутрин с храна.

Погльщайте ги с вода.

Не ги дъвчете.

Вашият лекар ще Ви каже колко дълго ще е необходимо да приемате таблетките. Този период може да е много месеци или дори повече.

Хора в напреднала възраст

Максималната доза за хора над 65 години е 40 mg дневно.

Пациенти с чернодробно или бъбречно заболяване

Ако имате проблеми с черния дроб или имате тежко бъбречно заболяване, Вашият лекар може да реши, че трябва да приемате по-ниска доза Пароксат от обичайната.

Ако сте приели повече от необходимата доза Пароксат

Никога не приемайте повече таблетки от това, което Ви е препоръчал Вашия лекар. Ако приемете твърде много таблетки от Пароксат (или някой друг приеме повече таблетки), независимо каквото ще се случи, трябва да се обадите на Вашия лекар или се обадете в болницата.

Ако някои приеме свръхдоза от Пароксат, може да получи някои от симптомите, изброени в точка 4, **Възможни неожелани лекарствени реакции**, или следните симптоми: гадене, повишена температура, неконтролирано стягане на мускулите.

Ако сте пропуснали да приемете Пароксат

Приемайте Вашето лекарство по едно и също време всеки ден.

Ако пропуснете да приемете дозата от лекарството и се сетите преди да си легнете, приемете я направо. Следващия ден продължете както обикновено.

Ако се сетите през нощта или на другия ден, оставете пропуснатата доза. Възможно е да получите симптоми на отнемане, но те трябва да отминат, когато приемете следваща си доза по обичайното време.

Какво да направите, ако не се чувствате по-добре



Пароксат няма да облекчи симптомите Ви веднага – на всички антидепресанти е необходимо време, за да действат. Някои хора започват да се чувстват по-добре след няколко седмици, но при други този период може да е по-дълъг. Някои хора, които приемат антидепресанти, първоначално се влошават и след това се подобряват. Ако не се почувствате по-добре след няколко седмици, върнете се при Вашия лекар и той ще Ви посъветва какво да правите. Вашият лекар трябва да Ви насочи повторно посещение след няколко седмици след първоначалното започване на лечението. Уведомете Вашия лекар, ако не сте започнали да се чувствате по-добре.

Ако сте спрели приема на Пароксат

Не спирайте приема на Пароксат, докато Вашият лекар не Ви каже да го направите.

Когато спирате приема на Пароксат, Вашият лекар ще Ви помогне да намалите дозата бавно за няколко седмици или месеца, което би трябвало да намали вероятността от развитие на ефекти на отнемане. Единият начин за това е постепенно намаляване на дозата, която приемате, с 10 mg на седмица. Според повечето хора симптомите при спиране приема на Пароксат са леки и отминават спонтанно в рамките на две седмици. При някои хора тези симптоми може да са по-тежки или да продължават по-дълго.

Ако получите симптоми на отнемане, когато намалявате приема на таблетките, Вашият лекар може да реши, че трябва да ги намалявате по-бавно. Моля, обърнете се към Вашия лекар, ако получите тежки ефекти на отнемане, когато спрете да приемате Пароксат. Вашият лекар може да Ви каже да започнете да приемате лекарството отново и да намалявате дозата по-бавно.

Ако получите симптоми на отнемане, все пак може да спрете да приемате Пароксат.

Възможни симптоми на отнемане, когато спирате лечението

Проучванията показват, че 3 от 10 пациенти забелязват появата на един или повече симптома при спиране на пароксетин. Някои симптоми на отнемане се наблюдават по-често от други.

Чести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 10 пациенти:

- Усещане за замаяност, нестабилност или липса на баланс.
- Мравучкане, парещо усещане и (по-рядко) усещане за електричен шок, включително в главата, както и бръмчене, свистене, свирене, звънене или други натрапчиви шумове в ушите (тинитус).
- Нарушения на съня (живи сънища, кошмари, невъзможност за заспиване).
- Безпокойство.
- Главоболие.

Нечести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 100 пациенти:

- Гадене.
- Потене (включително през нощта).
- Безпокойство или тревожност.
- Тремор (треперене).
- Обърканост или дезориентираност.
- Диария (разстройство).
- Повишена чувствителност или раздразнителност.
- Зрителни нарушения.
- Неравномерен или бърз пулс (палпитации).

Моля, обърнете се към Вашия лекар, ако сте притеснени от ефектите от спиране на лекарството, когато престанете да приемате Пароксат.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля посетите Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ



Както всички лекарства, Пароксат може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Нежеланите лекарствени реакции се появяват най-вече през първите няколко седмици от приема на Пароксат.

Посетете Вашия лекар, ако по време на лечението получите някоя от посочените по-долу нежелани лекарствени реакции.

Може да се наложи да се свържете с Вашия лекар или направо да отидете в болницата.

Нечести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 100 пациенти:

- Свържете се с Вашия лекар или направо отидете в болница, ако имате необичайно насиняване или кървене, включително повръщане на кръв или кръв в изпражненията.
- Свържете се с Вашия лекар или направо отидете в болница, ако установите, че не можете да прегълъщате вода.

Редки нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 1000 пациенти:

- Свържете се с Вашия лекар или направо отидете в болница, ако имате гърчове.
- Ако имате чувство, че не можете да си намерите място, да седите или да стоите прав спокойно, може да имате състояние, наречено акинезия. Повишаването на дозата може да влоши тези усещания. Свържете се с Вашия лекар, ако се чувствате по описания начин.
- Ако се чувствате уморен, слаб или объркан и мускулите Ви болят, схванати са или не можете да ги координирате, причината може да е ниско ниво на натрий в кръвта Ви. Свържете се с Вашия лекар, ако имате тези симптоми.

Много редки нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 10 000 пациенти:

- Алергични реакции към Пароксат.
Свържете се с Вашия лекар или направо отидете в болница, ако получите червен и бучкоподобен кожен обрив, подуване на клепачите, лицето, устните, устата или езика, ако получите сърбеж или имате трудности при дишането и прегълъщането.
- Ако имате някои от описаните по-долу симптоми, може да страдате от състояние, наречено серотонинов синдром. Симптомите включват: усещане за обърканост, усещане за беспокойство, потене, втрисане, треперене, халюцинации (страни образи и звуци), внезапни мускулни спазми или сърцебиене. Свържете се с Вашия лекар, ако се чувствате по описания по-горе начин.
- Остра глаукома.
Свържете се с Вашия лекар, ако усетите болка в очите и усетите замъглено виждане.

Други възможни нежелани лекарствени реакции по време на лечението

Много чести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат повече от 1 на 10 пациенти:

- Гадене. Приемането на лекарството сутрин с храна ще намали възможността това да се случи.
- Нарушение в нормалната сексуална функция, например невъзможност за постигане на оргазъм и при мъже, патологична ерекция и еякулация.

Чести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 10 пациенти:

- Повишаване на нивата на холестерол в кръвта
- Липса на апетит
- Нарушен сън (безсъние) или сънливост
- Усещане за замаяност или втрисане (тремор)
- Главоболие
- Напрегнатост
- Необичайно усещане за слабост
- Замъглено зрение



- Прозяване, сухота в устата
- Диария или запек
- Повишаване на теглото
- Потене.

Нечести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 100 пациенти:

- Бързо повишаване на кръвното налягане или бързо понижаване, което може да Ви накара да се почувствате замаяни, когато ставате рязко
- По-бързо биене на сърцето от нормалното
- Липса на движение, схванатост, треперене или патологични движения в устата и езика
- Разширени зеници
- Кожни обриви
- Обърканост
- Халюцинации (страни образи и звуци)
- Невъзможност за уриниране (задръжка на урината) или неконтролирано, неволно изпускане на урина (инконтиренция на урината).

Редки нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 1000 пациенти:

- Патологична секреция на мляко от гърдите при мъже и жени
- Бавен сърдечен ритъм
- Ефекти върху черния дроб, които се изразяват с промени в кръвните тестове на чернодробната Ви функция
- Пристипи на паника
- Свръхреактивно поведение или мисли (мания)
- Усещане за отделяне от себе си (деперсонализация)
- Тревожност
- Болка в ставите или мускулите.

Много редки нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 10, 000 пациенти:

- Чернодробни проблеми, от които кожата или бялото на очите стават жълти
- Задръжка на течности или вода, което води до подуване на ръцете и краката
- Чувствителност на светлина
- Болезнена ерекция на пениса, която не преминава
- Нисък брой на белите кръвни клетки.

Някои пациенти развиват тинитус (бръмчене, свистене, свирене, звънене или други натрапчиви шумове в ушите), когато приемат Пароксат.

Ако имате някакви притеснения, докато приемате Пароксат, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, които ще могат да Ви посъветват. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ПАРОКСАТ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Пароксат след срока на годност, отбелаязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 30°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Ако използвате по половин таблетка, внимателно я съхранявайте на сигурно място в опаковката.



Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Пароксат **филмирани таблетки**

Активното вещество е пароксетинов хидрохлорид хемихидрат, екв на 20 mg пароксетин.
Другите съставки са

- в ядрото на таблетката: двуосновен калциев фосфат дихидрат (E341), магнезиев стеарат (E470b) и натриев нишестен гликолат (тип A)
- във филмовото покритие: хипромелоза (E464), титанов диоксид (E171), макрогол 400 и полисорбат 80 (E433).

Как изглежда Пароксат и какво съдържа опаковката

Пароксат 20 mg филмирани таблетки са бели, овални, с делителна черта от едната страна. Таблетките са опаковани в блистери. Всяка опаковка съдържа 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

Софарма АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Производители

Софарма АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Glaxo Wellcome Production,
Terras 1, Zone Industrielle du Terras,
53100 Mayenne, Франция

Дата на последно одобрение на листовката: 10.03.2008 г.

