



Листовка за информация на пациента

Какво трябва да знаете за

MOEX@PLUS

МОЕКС ПЛЮС

Моля, прочетете тази листовка внимателно преди да започнете да приемате Вашето лекарство. Тази листовка не Ви казва всичко за Вашето лекарство. Ако имате някакви въпроси или ако сте несигурни за нещо, запитайте Вашия лекар или фармацевт.

1. За Вашето лекарство

Наименованието на Вашето лекарство е MOEX@PLUS. Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg моексиприл хидрохлорид и 25 mg хидрохлоротиазид като лекарствени вещества.

Таблетките съдържат също лактоза монохидрат, кросповидон, магнезиев оксид, желтин, магнезиев стеарат, метилхидроксипропилцелулоза, хидроксипропилцелулоза, титаниев диоксид (E 171), макрогол 6000 и железен оксид (E 172).

MOEX@PLUS филмираните таблетки са леко жълти, овални таблетки и са доставени в картонена кутия, която съдържа 30 таблетки; по 10 таблетки във всеки блистер, включен в опаковката.

Притежател на разрешението за употреба:

Schwarz Pharma AG

Alfred-Nobel-Str. 10

40789- Monheim, Germany

МОЕХ®PLUS е комбинация от един АСЕ-инхибитор (моехіргіл) и тиазиден диуретик (hydrochlorothiazide). Използва се за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) при пациенти, които изискват комбинация от лекарствени вещества, а не само едно лекарство за лечение на тяхното състояние. Обикновено няма да Ви се предприше това лекарство като първо средство за лечение на високо кръвно налягане. Вашият лекуващ лекар вероятно е опитал да лекува състоянието Ви с други самостоятелни лекарства, но е решил, че комбинацията от две лекарствени вещества ще бъде по-добра за Вас.

2. Преди да приемате Вашето лекарство

Ако можете да отговорите с да на който и да е от тези въпроси, не приемайте това лекарство и потърсете съвет от Вашия лекуващ лекар или фармацевт.

- Имате ли свръхчувствителност, или имали ли сте алергична реакция спрямо моехіргіл, тиазиди или някоя от другите съставки на таблетката?
- Имате ли лактозна непоносимост?
- Имали ли сте реакция спрямо други АСЕ-инхибиторни лекарства? Тя може да бъде във формата на кожен обрив, оток на тъканите на носа и устата или на вътрешните органи. Ако не сте сигурни за това дали сте имали реакция, уверете се дали сте съобщили на Вашия лекар за всички лекарства, които сте приемали, които са Ви накарали да се чувствувате не добре. Ако някои Ваш близък роднина е имал реакция спрямо АСЕ-инхибиторни лекарства, Вие трябва да усведомите за това Вашия лекар.
- Дали сте бременна, кърмите ли бебе или планувате да забременеете ? АСЕ-инхибиторите могат да засегнат нероденото дете след първите три месеца на бременността. Ако сте забременели докато взимате лекарството, много важно е да съобщите веднага на Вашия лекуващ лекар.

- Дали сте на диализа поради бъбречна недостатъчност?
- Имате ли чернодробно заболяване или някакво състояние, при което черният дроб не функционира добре?
- Имате ли сърдечно заболяване?

Ако постъпвате в болница за операция, много важно е да съобщите на Вашия лекар, че приемате MOEX@PLUS.

Ако тези таблетки Ви карат да се чувствувате замаян когато ги приемате, не шофирайте или не работете с машини докато не изчезне този ефект.

Не консумирайте алкохол докато приемате това лекарство, тъй като в този случай се повишава ефекта му.

Преди приемане на лекарството, винаги съобщавайте на Вашия лекар или фармацевт ако вземате други лекарствени продукти. По-специално, Вие трябва със сигурност да съобщите ако приемате:

- Лекарства, съдържащи калий, например спиронолактон, амилорид, триамтерен
- Лекарства, съдържащи литий.
- Приспивателни или наркотични продукти.
- Други лекарства за контрол на кръвното налягане.
- Лекарства, които подтискат защитните реакции на организма, например, имуносупресори.
- Лекарствени продукти за лечение на болка и възпаление, включително такива, които купувате без рецепта, например аспирин или ибупрофен
- Лекарства за проблеми с храносмилането (например антиацидни таблетки).
- Лекарства, наречени симпатикомиметици, които могат да се прилагат при алергии и сърдечно заболяване.
- Лекарства за лечение на диабет.
- Лекарства за лечение на простуда, съдържащи салицилати (например аспирин)
- Лекарства, които Ви карат да отделяте повече урина от нормалното, като фуросемид

- Лекарства, наречени глюкокортикоиди, които обикновено се използват за контрол на алергични реакции и възпаление.
- Лекарства, наречени катехоламини, които се съдържат в някои лекарствени продукти, използвани за лечение на астма, сенна хрема и простудни състояния. Например епинефрин и салбутамол.
- Лекарства, използвани за лечение на ракови заболявания.
- Лекарствени продукти за лечение на заболяване на жлъчния мехур или за понижаване количеството на холестерол в организма.

3. Приемане на Вашето лекарство

- Важно е лекарствата да се употребяват както са предписани. Необходимо е внимателно да се прочетат инструкциите в листовката. Ако не сте сигурни за нещо, запитайте Вашия лекуващ лекар или фармацевт.
- Обикновено Вашият лекар ще Ви назначи да приемате една или две филмирани таблетки дневно сутрин с чаша вода. Ако сте забравили да приемете дозата, вземете една таблетка възможно най-бързо щом се сетите и след това продължете по нормалния начин. Не приемайте двойна доза – не приемайте повече от предписания брой таблетки в който и да е ден.
- Този лекарствен продукт не се препоръчва за употреба при деца.
- Ако случайно сте приели твърде много таблетки, свържете се с Вашия лекар или с най-близкото отделение за спешна помощ. Моля, кажете им, че сте приели MOEX®PLUS.

4. След приемане на Вашето лекарство

Понякога това лекарство може да предизвика нежелани реакции. Най-честите от тях при лечение с MOEX®PLUS са:

- кашлица
- замаяване
- главоболие
- умора
- повишено количество пикочна киселина в кръвта, което може в някои случаи да доведе до подагра или образуване на камъни в жлъчката или бъбреците, в резултат на което може да се появи болка в ставите или болка в слабините.

Ако тези симптоми продължат за повече от няколко дни, или станат смущаващи, потърсете лекарски съвет.

Съобщава се и за други не толкова чести нежелани реакции:

- свързани със сърдечната дейност:
ускорена сърдечна честота, сърцебиене (чувство на вибриране в гърдите), болка в гърдите, гръдна жаба, миокарден инфаркт (сърдечен удар), припадък и мозъчен удар.
- свързани със стомашно-чревния тракт:
повръщане и диария, коремна болка, често дължаща се на образуване на газ, запек, лошо храносмилане, загуба на телло, загуба на апетит, промени във вкусовите усещания.
- свързани с дихателната система:
проблеми с дишането, болезнено възпаление на устата и езика, синусит (възпаление на синусите), сухота в устата, жажда.
- засягащи кожата:
кожен обрив и сърбеж или оток, фоточувствителност.
Много рядко могат да се появят по-тежки кожни реакции, предизвикващи зачервяване и образуване на мехури по кожата.
- неврологични симптоми:
тревожност, депресия, нервност.
- други възможни нежелани реакции:
слабост, изпотяване, смущения във виждането, мускулна и ставна болка, косопад, импотентност, скованост и изтръпване на крайниците, нарушение в равновесието, объркване, шум в ушите, мускулни спазми, често дължащи се на ниски калиеви и/или хлорни нива в кръвта, високи калциеви нива в кръвта, намален брой на червените кръвни клетки, намален брой на белите кръвни клетки и намален брой на тромбоцитите.