

Информация за пациента за
Бетаджен

ОДОБРЕН
ДАТА R-1498/24.02.09

Съхранявайте този лекарствен продукт на място, недостъпно за деца. Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да вземете този лекарствен продукт. Тази листовка съдържа резюме на информацията за Вашия лекарствен продукт Бетаджен таблетки

ВАШИЯТ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Вашият лекарствен продукт е под формата на таблетка. Таблетките съдържат две различни количества на лекарственото вещество. Всяка от тях съдържа съответно 8 mg от лекарственото вещество Betahistine Dihydrochloride (отпечатано ВН 8) и 16 mg от лекарственото вещество Betahistine Dihydrochloride (отпечатано ВН 16). Всяка таблетка съдържа също така помощни вещества микрокристална целулоза, манитол, лимонена киселина, силициев диоксид и талк. Бетаджен таблетки се продава в опаковки по 30 и по 100 бр. Вашият фармацевт ще Ви отпусне броя таблетки, предписан от Вашия лекар.

Притежател на разрешението за употреба: Generics (UK) Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Производители: McDermott laboratories Ltd T/A Gerard Laboratories, 35-36 Baldoyle Industrial Estate, Grande Road, Dublin 13, Eire.

MERCK PHARMA Y QUIMICA, S.A., Ctra. N-152.Km.19.08100-Mollet del Valles (Barcelona), Spain

ЗАЩО ИМАТЕ НУЖДА ДА ВЗЕМЕТЕ ВАШИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ?

Вашият лекар ще Ви предпише Бетаджен таблетки, за да Ви помогне да се лекуват симптомите на Мениеров синдром като гадене, световъртеж (замайване), звън или шум в ушите и загуба на слуха. Точният начин, по който Бетаджен действа, не е ясен, но се счита, че подобрява кръвоснабдяването и намалява налягането в средното ухо, като така намалява симптомите на Мениеровия синдром.


КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ ВАШИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ?

Вие не трябва да вземате това лекарство и трябва да информирате Вашия лекар, ако:

- сте бременна
- кърмите
- сте приемали Бетаджен таблетки преди и сте развили необичайна или алергична реакция към него
- приемате антихистаминови лекарствени продукти
- имате тумор на надбъбречната жлеза, наречен феохромоцитом

Вие трябва да информирате Вашия лекар преди да вземете това лекарство, ако:

- страдате от бронхиална астма, особено ако се лекувате със салбутамол
- имате пептична язва или сте имали пептична язва в миналото
- понякога имате алергични реакции като кожни обриви, сърбеж или ринит
- се лекувате от малария или приемате профилактични лекарства против малария, особено ако приемате пириметамин или дапсон
- приемате всякакви други лекарствени продукти, дори и такива, които сами сте закупили от аптеката.



НЕ ПРИЕМАЙТЕ Бетаджен таблетки, ако смятате, че сте алергични към него или към някое от помощните вещества, особено микрокристална целулоза.

ДОКАТО ПРИЕМАТЕ БЕТАДЖЕН ТАБЛЕТКИ

НЕ СПИРАЙТЕ приема на Вашите таблетки, без да се консултирате с Вашия лекар, дори ако мислите, че се чувствате по-добре или ако Ви се струва, че минава доста време, без да се почувствате добре.

ТРЯБВА ДА СТЕ ОСВЕДОМЕНИ, че Бетаджен не трябва да причинява сънливост, но може да има редки изключения. Препоръчва се, ако се почувствате сънливи, да избягвате задачи, изискващи концентрация, като шофиране и/или работа с машини.

ВЗЕМАЙТЕ РЕДОВНО Вашето лекарство и се опитвайте да не пропускате прием (това е особено важно, когато приемате само една доза дневно)

КАК ТРЯБВА ДА ПРИЕМАТЕ ВАШИТЕ ТАБЛЕТКИ ?

Бетаджен таблетки трябва да се приемат с храна.

Възрастни над 18 години (включително и пациенти в напреднала възраст):
Обичайната начална доза е 8 mg или 16 mg Бетаджен (като една таблетка от 16 mg или две таблетки от 8 mg) три пъти дневно. Вашият лекар ще определи подходящата доза за Вас. Обичайната дневна доза Бетаджен е между 24 mg и 48 mg.

Деца:

Бетаджен не трябва да се приема от деца и юноши на възраст под 18 години.

Ако сте забравили да приемете една доза от това лекарство, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако обаче, времето до следващия прием е по-малко от 8 часа, не вземайте таблетки, а изчакайте до времето за следващата доза и след това продължете да приемате Вашите таблетки както преди.

АКО СТЕ ПРИЕЛИ ТВЪРДЕ МНОГО ОТ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО, ПОТЪРСЕТЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛЕКАР.

МОЖЕ ЛИ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО ДА ПРИЧИНЯВА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ ?

Лекарствените продукти имат някои нежелани лекарствени реакции, които варират при различните пациенти. Най-честите за Бетаджен са: стомашни неразположения, разстройство или гадене, главоболие, кожни обриви или сърбеж, и понякога сънливост. **Ако страдате от някоя от тези нежелани лекарствени реакции или някакъв друг нежелан ефект, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.**

НЕ ПРИЕМАЙТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ, ОТПЕЧАТАН НА ОПАКОВКАТА.

ЗАПОМНЕТЕ, че това лекарство е предписано на Вас от Вашия лекар. **НЕ ГО ДАВАЙТЕ** на други. Може да им навредите. Съхранявайте на сухо място при температура до 25 °C.

Дата на последна редакция на текста: Ноември 2008 г.

