

**ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА**

ТАДЕНАН 50 mg

капсули, меки

Екстракт от Пигеум африканум

TADENAN® 50 mg

soft capsules

Pygeum africanum (extract)

П  
ОДОБРено!

ДАТА: K-1327/25.02.09

**Преди да започнете приема на това лекарство, прочетете внимателно цялата листовка.** Тя съдържа важна информация за вашето заболяване и лечението му.

Ако имате въпроси или не сте сигурни за нещо, обърнете се към своя лекар или фармацевт за допълнителна информация.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го предлагайте на други хора, дори ако симптомите има същите като вашите, тъй като лекарството може да се окаже вредно за тях.

Пазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.

**ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

ТАДЕНАН 50 mg, капсули, меки.

**TADENAN® 50 mg soft capsules**

**КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ**

Една капсула съдържа:

**Активно вещество:** Екстракт от Пигеум африканум (Pygeum africanum) - 50 mg

**Помощни вещества:** арахисово масло (фъстъчено масло) (150 mg), желатин (89 mg), глицерол (38 mg), титанов диоксид (3,6 mg), водно-разтворим меден хлорофилин (0,005 mg).

**ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА**

Капсули, меки.

**ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧЕН КЛАС**

**ДРУГИ ЛЕКАРСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНА**

**ХИПЕРТРОФИЯ НА ПРОСТАТАТА**

(G 04 CX01: пикочно-полова система и полови хормони)

**ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

Това лекарство се препоръчва за лечение на определени форми на нарушена мицция (отделяне на урината), свързани с доброкачествена хиперплазия на простатата (увеличение на обема на простатната жлеза).

**НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

**АКО ИМАТЕ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.**



## **СПЕЦИАЛНИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Необходимо е лекар – уролог да препоръча лечението след поставяне на диагнозата: доброкачествена хиперплазия на простатата. Ако симптомите продължават или състоянието се влоши се обрнете за консултация към лекар – уролог.

Употребата на това лекарство не освобождава пациентите от обичайните медицински прегледи на простатата. Лекарственият продукт не може да замести хирургичното лечение, когато то е показано.

Този лекарствен продукт съдържа фъстъчено масло, съществува рисък от алергични реакции, уртикария, генерализирани алергични реакции).

Бременност и кърмене: Терапевтичните показания не се отнасят за жени.

**АКО ИМАТЕ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ  
ФАРМАЦЕВТ.**

## **ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАЙМОДЕЙСТВИЯ**

Не са известни.

**ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ВЪЗМОЖНИ РЕАКЦИИ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА, МОЛЯ  
ИНФОРМИРАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА  
ВСИЧКИ ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КОИТО ПРИЕМАТЕ В  
НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, КАКТО И ЗА ВСЕКИ НЕОБИЧАЕН СИМПТОМ,  
ВЪЗНИКНАЛ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО.**

## **ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ**

..... Не са познати такива ефекти.

## **СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА С ОБЩОИЗВЕСТЕН ЕФЕКТ**

Арахисово масло.

## **ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА**

### **ДОЗИРОВКА**

Дозировката се определя индивидуално за всеки пациент.

Обикновено се приемат по една капсула сутрин и една вечер, за предпочтение преди хранене.

Във всички случаи спазвайте стриктно указанията на своя лекар.

## **НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Перорално приложение.

## **ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО**

Обикновено лечението продължава 6 седмици, но може да бъде удължено и до 8 седмици.

Лечението може да се възстанови при необходимост.

## **ПРЕДОЗИРАНЕ**

Не е наблюдавано.

## **МЕРКИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРОПУСНЕТЕ ЕДНА ДОЗА**

Не се предприемат.

## **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ И ПРОЯВИ НА ДИСКОМФОРТ**



КАКТО ВСИЧКИ АКТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ТАКА И ТОЗИ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА У НЯКОИ ХОРА ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО ТРЕВОЖНИ И НЕПРИЯТНИ ЕФЕКТИ

Понякога нарушения на храносмилателната система (гадене, запек, диария и алергични реакции).

Уведомете вашия лекар или фармацевт за всяка нежелана реакция или дискомфорт, неспоменати в тази листовка.

### **СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Лекарството трябва да се съхранява при температура под 25°C и на недостъпно за деца място .

**ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ,  
ОТБЕЛЯЗАН ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА ОПАКОВКАТА**

Срок на годност:

3 години.

### **ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Laboratoires Fournier SA  
28 Boulevard Clemenceau  
21000 Dijon  
Франция

### **ПРОИЗВОДИТЕЛ**

Recipharm Fontaine  
Rue des Prés Potets  
21 121 Fontaine Les Dijon  
Франция

### **ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА**

27/08/2004

*Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар или фармацевт или към*

Солвей Фарма ЕООД  
София Тауър, ет. 5, офис 52  
Бул. Ал. Стамболовски 103  
1303, София  
Тел: ++ 3592 9234 700  
Факс: ++ 3592 9234 701

