

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Клариназе 5 mg/120 mg таблетки с удължено освобождаване
лоратадин/псевдофедринов сулфат
Clarinase 5 mg/120 mg prolonged-release tablets
loratadine/pseudoephedrine sulphate

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Допълнителна листовка за лекарство | |
| Регистрационен номер: | 4452, 24.04.09 |
| Към РУ №: | 37/ 24.03.09 |
| Одобрено: | |

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съдържание на листовката:

1. Какво представлява Клариназе и за какво се използва
2. Преди да приемете Клариназе
3. Как да приемате Клариназе
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клариназе
6. Допълнителна информация

1. КАВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛАРИНАЗЕ И ЗА КАВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Клариназе таблетки съдържат комбинация от две активни съставки: антихистамин (лоратадин) и деконгестант (псевдофедрин). Антихистаминът облекчава симптомите при алергия и простуда, като блокира действието на субстанция, наречена хистамин, която се образува в човешкото тяло. Деконгестантът спомага за отпушването на носа.

Клариназе таблетки облекчават симптомите, свързани със сезонен алергичен ринит (сенна хрема), като кихане, сърбеж или секреция от носа, сърбеж и сълзене на очите, придружени от запушване на носа.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КЛАРИНАЗЕ

Не приемайте Клариназе таблетки

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към лоратадин, псевдофедрин или към някоя от останалите съставки на Клариназе таблетки.

Поради наличието на псевдофедрин, не приемайте Клариназе таблетки

- ако приемате лекарствени продукти за сърдечни заболявания или високо кръвно налягане.
- ако страдате от глаукома, смущения в уринирането, блокада на пикочните пътища, високо кръвно налягане, заболявания на сърдечно-съдовата система, сте прекарали инсулт или имате хиперфункция на щитовидната жлеза.
- ако приемате моноамино-оксидазен инхибитор (МАО) или сте прекъснали лечението с такъв през последните 14 дни.

Обърнете специално внимание при употребата на Клариназе

Някои състояния могат да Ви направят особено чувствителни към деконгестанта псевдофедрин, който се съдържа в това лекарство.



Преди да започнете да приемате Клариназе таблетки, уведомете Вашия лекар или фармацевт:

- ако сте на 60 и повече години. По възрастните пациенти могат да проявят повишена чувствителност към този лекарствен продукт.
- ако имате диабетес мелитус (захарен диабет), стенозираща пептична язва (язва, която причинява стеснение на stomахa, тънките черва или хранопровода), пилородуоденално запушване (запушване на червата), запушване на шийката на пикочния мехур, анамнеза за бронхоспазъм (затруднено дишане, причинено от свиване на мускулите на белите дробове), или проблеми с черния дроб, бъбреците или пикочния мехур.
- ако Ви предстои хирургична интервенция, тъй като може да Ви се наложи да преустановите употребата на Клариназе в продължение на няколко дни.
- ако приемате дигиталис, (лекарство, използвано за лечение на определени сърдечни нарушения), тъй като може да се наложи промяна в дозовия режим.
- ако приемате α-метилдопа, мекамиламин, резерпин, алкалоиди на чемерица или гванетидин, предназначени за лечение на високо кръвно налягане, тъй като може да се наложи промяна в дозовия режим.
- ако приемате деконгестанти (орални или назални), апетитоподтиксащи продукти или амфетамини, тъй като в комбинация с Клариназе тези лекарства могат да причинят повишаване на кръвното налягане.
- ако приемате ергоалкалоиди (нато например дихидроерготамин, ерготамин или метилергометрин) за лечение на мигрена, тъй като в комбинация с Клариназе тези лекарства могат да причинят повишаване на кръвното налягане.
- ако приемате линезолид (антибиотик), бромокриптин (срещу безплодие или болест на Паркинсон), каберголин, лизурид или перголид (за болест на Паркинсон). В комбинация с Клариназе тези лекарствени продукти могат да причинят повишаване на кръвното налягане.
- ако приемате антиациди, тъй като те могат да засилват ефекта на Клариназе.
- ако приемате каолин, тъй като той може да намали ефекта на Клариназе.

Уведомете Вашия лекуваш лекар, ако имате или Ви е поставена диагноза за някое от следните състояния:

- високо кръвно налягане,
- ускорено или неравномерно сърцевиене,
- нарушен сърдечен ритъм,
- ако не се чувствате добре и имате главоболие или главоболието Ви се засилва при прием на Клариназе. Лекарят Ви може да Ви посъветва да прекратите лечението.

Едно от лекарствата в Клариназе, псевдофедринов сулфат, носи риск от злоупотреба, а в големи дози псевдофедринов сулфат може да се окаже токсичен.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насъкоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Прием на Клариназе с храни и напитки

Клариназе таблетки могат да се приемат със или без храна.

Няма данни Клариназе таблетки да засилват действието на алкохола.

Бременност

Ако сте бременна, не трябва да употребявате Клариназе.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство в време на бременност.

Кърмене

Ако кърмите, употребата на Клариназе не се препоръчва.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство в случай, че кърмите.



Лоратадин и псевдофедрин се излъчват с кърмата. При употреба на псевдофедрин, една от съставките на Клариназе, има съобщения за случаи на намалена продукция на мляко при кърмачки.

Шофиране и работа с машини

В препоръчаната доза не се очаква Клариназе да предизвика съниливост или нарушения на вниманието. Въпреки това, много рядко, някои пациенти съобщават за съниливост, която може да повлияе способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Клариназе

Клариназе таблетки съдържат лактоза и захароза; поради това, ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, го уведомете, преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

Лабораторни тестове:

Ако Ви предстоят кожно-алергични тестове, е необходимо да преустановите употребата на Клариназе два дни преди провеждането на тестовете, тъй като това лекарство може да повлияе резултатите от тях.

Спортсистите, приемащи Клариназе таблетки, могат да имат положителни резултати на допинг-тестовете.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КЛАРИНАЗЕ

Винаги приемайте Клариназе таблетки точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Не приемайте повече Клариназе таблетки от препоръчаното в листовката или по-често отколкото Ви е предписал Вашият лекар.

Възрастни и юноши над 12 години: по една таблетка Клариназе два пъти дневно с чаша вода, независимо от приема на храна. Прегълтнете таблетката цяла; не стривайте, не чупете и не дъвчете таблетката, преди да я прегълтнете.

Не приемайте това лекарство за период по-дълъг от 10 дни без прекъсване, освен по предписание на Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Клариназе

В случай на предозиране, съобщете незабавно на Вашия лекар или фармацевт. Докладвани са случаи на съниливост, ускорен сърден ритъм и главоболие при предозиране с лоратадин, съставка на Клариназе. Докладвани са случаи на гърчове, ускорен сърден ритъм, гадене и нервност при предозиране с псевдофедрин, съставка на Клариназе.

Ако сте пропуснали да приемете Клариназе

Ако сте пропуснали да вземете Клариназе навреме, направете това възможно най-скоро, след което следвайте препоръчаната схема на лечение. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Клариназе може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Уведомете веднага Вашия лекар или фармацевт, ако някоя от посочените по-долу нежелани реакции не изчезва, ако Ви притеснява или смятате, че има сериозен характер.



Често срещаните нежелани реакции, свързани с Клариназе 5 mg/ 120 mg таблетки включват: жажда, нервност, сънливост, депресия, възбуда, анорексия, проблеми със съня, замаяност, пресъхване на устата, сърцебиене, възпалено гърло, възпаление на областта около носа, запек, гадене, главоболие или умора.

Нежеланите реакции, които се срещат по-рядко включват: обърканост, трепор, засилено изпотяване, топли вълни, промяна във вкуса, сълзене на очите, зъвънене в ушите, неритмичен пулс, кървене от носа, често или променено уриниране, сърбези.

След пускането на пазара на Клариназе има съобщения за много редки случаи на тежка алергична реакция включително обрив, копривна треска и отоци на лицето, световъртеж, гърчове, нарушен сърдечен ритъм, високо кръвно налягане, кашлица, стесняване на въздухонасните пътища, чернодробни проблеми, затруднения в уринирането и косопад.

Други нежелани реакции само за лоратадин, за които е било съобщено в процеса на клинични проучвания и по време на пост-маркетинговия период, включват повишен апетит, обрив и раздразнен стомах.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КЛАРИНАЗЕ

Да се съхранява под 25°C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Съхранявайте блистера в картонената опаковка.

Да не се замразява.

Не използвайте Клариназе след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте Клариназе, ако забележите промяна във външния вид на таблетките.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Клариназе

- Активните вещества са: лоратадин 5 mg и псевдофедринов сулфат 120 mg;
- Другите съставки са: ядро - лактоза, царевично нишесте, повидон, магнезиев стеарат; обвивка - акация, калциев сулфат дихидрат, карнаубски восък, микрокристална целулоза, олеинова киселина, захароза, талк, титанов диоксид, бял восък, боров колофлон, прахообразен сапун на растителна основа, зеин.

Как изглежда Клариназе и какво съдържа опаковката

Клариназе са бели, двойно изпъкнали, обвити и гладки таблетки.

Клариназе таблетки са опаковани по 10 таблетки в блистер, поставен в картонена кутия.

Възможно е не всички видове опаковки да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател за разрешението на употреба:

Schering-Plough Europe, 73 rue de Stalle, B-1180 Brussels, Белгия



Производител:
Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Шеринг-Плау Сентрал Ийст, клон България
бул. „Н. Й. Вапцаров“ №53А
Ийст Парк Трейд Център,
1407 София
Тел.: (+) 359 2 806 30 30

Дата на последно одобрение на листовката

