

Листовка за пациента

Calpol 120mg/5ml oral suspension Калпол 120mg/5ml перорална суспензия

парацетамол (paracetamol)

Листовка - Пристежка 2	до лекарства
Брой № 11-4584 13.11.03.09	
Одобрено: 20/08.07.08	

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че симптомите се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Калпол и за какво се използва
2. Преди детето Ви да приеме Калпол
3. Как се приема Калпол
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Калпол
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Калпол и за какво се използва

Калпол се използва за облекчаване на леки до умерени болки, включително главоболие, невралгия, зъббол, болки при никнене на зъбите, възпалено гърло, грип. Калпол се прилага и за понижаване на телесната температура при треска. Консултирайте се с лекар при силни болки, много висока температура или ако Ви се струва, че лекарството не облекчава оплакванията.

2. Преди детето Ви да приеме Калпол

Консултирайте се с лекар преди детето Ви да започне приема на лекарството, в случай че отговорите с "да" на някой от следните въпроси:

- Детето Ви алергично ли е към Калпол, парацетамол или към някое от помощните вещества в лекарството?
- Детето Ви има ли вродена непоносимост към фруктоза?
- Детето Ви има ли заболяване на бъбреците или черния дроб?

Не давайте на детето си други лекарства, съдържащи парацетамол, докато то приема Калпол. Калпол може да се прилага едновременно с лекарства за лечение на епилепсия, но трябва да се има предвид, че в този случай Калпол може да не повлияе достатъчно болката или температурата. Едновременният прием на някои лекарства за лечение на депресия, успокоителни, лекарства за епилепсия, както и големи количества алкохол, увеличава вероятността от появя на нежелани лекарствени реакции, предизвикани от парацетамол. Ако не сте сигурни дали може да използвате Калпол заедно с друго лекарство, непременно потърсете съвета на лекар.

3. Как се приема Калпол

Преди прием използвайте мерителната лъжичка, поставена в опаковката, за да измерите необходимата доза. Мерителната лъжичка има две части. По-голямата, напълнена догоре, съдържа 5 ml суспензия, което отговаря на 120 mg от активното вещество парацетамол. По-малката, напълнена догоре, съдържа 2,5 ml суспензия, което отговаря на 60 mg парацетамол.



Листовка за пациентта

Обичайната дозировка на Калпол е:

Възраст	Дозировка
Бебета под 3 месеца	Ако след имунизацията с ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш на 2-месечна възраст бебето повиши температура, може да му дадете 1 малка лъжичка (2,5 ml - 60 mg парacetамол) Калпол. Ако температурата не се понижи след 4-6 часа, може да се приложи втора доза. Не давайте на детето повече от две дози без да се посъветвате с лекар. При други случаи не прилагайте Калпол перорална супензия при бебета под 3-месечна възраст, без да се консултирате с лекар.
Бебета от 3 месеца до 1 година	1 - 2 малки лъжички (2,5-5 ml) = 60-120 mg парacetамол, 4 пъти дневно.
Деца от 1 до 6 години	1 - 2 големи лъжички (5-10 ml) = 120-240 mg парacetамол, 4 пъти дневно.
Деца от 6 до 12 години	2 - 4 големи лъжички (10-20 ml) = 240-480 mg парacetамол, 4 пъти дневно.

- Преди употреба разклатете добре бутилката.
- За да отворите бутилката, натиснете капачката надолу и завъртете по посока, обратна на часовниковата стрелка.
- Ако болката или температурата продължат, може да се дава повторна доза на всеки 4-6 часа.
- Да не се приемат повече от 4 дози на ден.
- Ако болката и високата температура продължават, се консултирайте с лекар и не прилагайте Калпол повече от 3 дни. **При всеки случай на повишаване на температурата при кърмачета и деца под една година е препоръчителна консултация с лекар.**

Допълнителна информация за дозиране:

Дозировката в mg активно вещество (парacetамол) на kg телесно тегло при деца от 3 месеца до 12 години е 10-15 mg/kg на 4-6 часа, но не повече от 4 дози за 24 часа.

Ако детето е приело повече от необходимата доза Калпол

Ако детето е погълнало по-голяма еднократна доза или твърде много лекарство за един ден, дори да се чувства добре, уведомете лекар незабавно или се обадете на Бърза помощ. В случай на предозиране е много важно да потърсите незабавно съвет от лекар, тъй като дори детето да изглежда добре има рисък от късно чернодробно увреждане.

Ако детето е пропуснало да приеме Калпол

Ако детето Ви е пропуснало прием, не се беспокойте. Дайте му следващата доза, ако е необходимо. Не забравяйте, не трябва да му давате повече от четири дози на ден.

4. Възможни нежелани реакции

В повечето случаи Калпол не предизвиква нежелани лекарствени реакции. Както всички лекарства, при някои пациенти Калпол може да причини такива реакции.

Ако при Вашето дете се появи някой от следните симптоми скоро след приема на Калпол, СПРЕТЕ незабавно да давате лекарството на детето и уведомете лекар.

- Кожни обриви или други алергични реакции.
- Необичайна умора.
- Неочаквана поява на "синини" или кървене.
- Детето се разболява по-често (включително настинки) от обичайното.

Калпол съдържа глицерол. При високи дози тази съставка може да причини главоболие, стоманно дразнене и диария.

Информирайте лекар, ако забележите други нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка или ако има нещо, което Ви тревожи, смущава или не разбирате.



Листовка за пациента

При пациенти, които приемат лекарства, съдържащи парациетамол за повече от два месеца, могат да се проявят повече нежелани реакции. Тези реакции включват чернодробно и/или бъбречно увреждане. При пациентите, които приемат лекарството в препоръчаните дози и за кратки периоди от време, подобни реакции не се проявяват.

5. Как да съхранявате Калпол

- Съхранявайте Калпол при температура под 25°C, на място, защитено от нагряване и пряка слънчева светлина.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
- Калпол трябва да се съхранява в оригиналната опаковка.

Не използвайте Калпол след срока на годност, отбелзан върху опаковката.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Калпол

Активното вещество е парациетамол. Всеки 5 ml Калпол съдържат 120 mg парациетамол.

Другите съставки са: захарен сироп, разтвор на сорбитол, глицерол, ксантанова гума, ягодова есенция, метилхидроксибензоат, оцветител кармазин и пречистена вода.

Как изглежда Калпол и какво съдържа опаковката

Суспензията е с розов цвят и има аромат на ягода. Калпол се предлага в картонена кутия с една бутилка от тъмно стъкло. Всяка бутилка съдържа 100 ml перорална суспензия. В опаковката е поставена мерителна лъжичка с два края за измерване на необходимата доза. Големият край представлява 5 милилитрова, а малкият - 2,5 милилитрова лъжичка.

Производител: Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Германия или
The Wellcome Foundation Ltd., T/A Glaxo Wellcome Operations, Dartford, Kent DA1 5AH, Великобритания.

Притежател на разрешението за употреба: Glaxo Group Ltd., Greenford road, Greenford, Middlesex,
UB6 0NN, Великобритания.

Дата на последно одобрение на листовката:

Calpol (Калпол) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

