

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТЕРАКСАНС 10mg/2,5mg, филмирани таблетки

периндоприл аргинин/индапамид
(perindopril arginine/indapamide)

СГ - БРЛ
ПАТА Н - 49/9 / 19.05.09

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преодългвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ТЕРАКСАНС и за какво се използва
2. Преди да приемете ТЕРАКСАНС
3. Как да приемате ТЕРАКСАНС
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТЕРАКСАНС
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕРАКСАНС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Какво представлява ТЕРАКСАНС?

ТЕРАКСАНС представлява комбинация от две активни съставки периндоприл и индапамид. Той е антихипертензивно средство и се използва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония). ТЕРАКСАНС се предписва на пациенти, които вече приемат 10mg периндоприл и 2,5mg индапамид в отделни таблетки, тези пациенти могат вместо това да приемат една таблетка ТЕРАКСАНС, която съдържа и двете съставки.

За какво се използва ТЕРАКСАНС ?

Периндоприл принадлежи към клас от лекарства, наречени ACE инхибитори. Те действат чрез разширяване на кръвоносните съдове, което облекчава сърцето при изпомпването на кръв през тях. Индапамид е диуретик. Диуретиците увеличават количеството на урината произвеждана от бъбреците. Индапамид, обаче, е различен от другите диуретици, тъй като води до много леко повишаване на количеството образувана урина. Всяка от активните съставки понижава кръвното налягане, а приети заедно те водят до по-добро контролиране на кръвното Ви налягане.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТЕРАКСАНС

Не приемайте ТЕРАКСАНС

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към периндоприл или някой друг ACE инхибитор, или към индапамид или други сульфонамиди или към някое от останалите съставки на ТЕРАКСАНС,
- ако сте получавали симптоми, като например свирещо дишане, оток на лицето или езика, силен сърбеж или тежки кожни обриви, при предишно лечение с ACE инхибитор или ако Ваши кръвни роднини са имали при други обстоятелства такива симптоми (състояние наречено ангионевротичен оток),
- ако сте с тежко чернодробно заболяване или страдате от състояние, наречено чернодробна енцефалопатия (дегенеративно заболяване на мозъка),
- ако сте с бъбречно заболяване или сте на диализно лечение,
- ако сте с нисък или висок калий в кръвта,



- ако има съмнение, че сте с нелекувана сърдечна декомпенсация (тежка задръжка на вода, затруднено дишане),
- ако сте бременна след третия месец (по-добре е също така да избягвате ТЕРАКСАНС през ранната бременност - вижте точка "Бременност и кърмене"),
- ако кърмите.

Обърнете специално внимание при употребата на ТЕРАКСАНС

Ако някоя от следните особености се отнася за Вас, моля уведомете Вашия лекар, преди да приемете ТЕРАКСАНС:

- ако сте с аортна стеноза (стесняване на главния кръвоносен съд излизащ от сърцето) или хипертрофична кардиомиопатия (заболяване на сърдечния мускул) или стеноза на реналните артерии (стесняване на артерията снабдяваща бърека с кръв),
- ако имате други сърдечни проблеми,
- ако сте с чернодробни проблеми,
- ако страдате от колагеноза (кожна болест), като например системен лупус еритематозус или склеродермия,
- ако имате атеросклероза (втвърдяване на артериите),
- ако страдате от хиперпаратиреоидизъм (повищена активност на парашитовидната жлеза),
- ако страдате от подагра,
- ако сте с диабет,
- ако сте на диета с ограничение на солта или използвате заместители на готварската сол съдържащи калий,
- ако приемате литиеви препарати или калий-съхраняващи диуретици (спиронолактон, триамтерен), тъй като тяхната употреба с ТЕРАКСАНС трябва да се избяга (вижте точка "Прием на други лекарства").

Кажете на Вашия лекар ако мислите, че сте бременна, или че може да забременеете. ТЕРАКСАНС не се препоръчва през ранната бременност и не тлябва да се взема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може да навреди сериозно на Вашето бебе ако се използва през този период (вж. Бременност и кърмене).

Ако приемате ТЕРАКСАНС, Вие трябва да уведомите Вашия лекар или медицинския персонал:

- ако трябва да бъдете подложен(а) на анестезия и/или операция,
- ако насърко сте имали диария или повръщане, или сте обезводнен(а),
- ако трябва да бъдете подложен(а) на диализа или LDL афереза (която представлява отстраняване на холестерол от Вашата кръв с момощта на машина),
- ако трябва да бъдете подложен(а) на десенсибилизация за намаляване на ефектите от алергията към ужилване от пчела или оса,
- ако трябва да бъдете подложен(а) на медицинско изследване, което изисква инжектиране на йод-съдържащо контрастно вещество (вещество, което прави видими на рентген органи като бърек или стомах).

Спортистите трябва да знаят, че ТЕРАКСАНС съдържа активно вещество (индапамид), което може да предизвика позитивиране на резултатите при допингов контрол.

ТЕРАКСАНС не трябва да се дава на деца.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насърко сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецептa.

Трябва да се избяга употребата на ТЕРАКСАНС с:

- Литиеви препарати (използват се за лечение на депресия),
- Калий-съхраняващи диуретици (спиронолактон, триамтерен), калиеви соли,



Лечението с ТЕРАКСАНС може да бъде повлияно от други лекарства. Непременно съобщете на Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като може да е необходимо специално внимание:

- други лекарства за лечение на високо кръвно налягане,
- прокаинамид (за лечение на неритмична сърдечна дейност),
- алопуринол (за лечение на подагра),
- терфенадин или астемизол (антихистаминови препарати за сенна хрема или алергии),
- кортикоステроиди използвани за лечение на различни състояния, включително тежка астма и ревматоиден артрит,
- имуносупресори използвани за лечение на автоимунни нарушения или след транспланационна хирургия за предотвратяване на отхвърлянето на присадения орган (напр. циклоспорин),
- лекарства за лечение на рак,
- инжекционен еритромицин (антибиотик),
- халофантрин (използва се за лечение на някои видове малария),
- пентамидин (използва се за лечение на пневмония),
- винкамин (използва се за лечение на симптоматични нарушения на познавателната функция при напреднала възраст, включително при загуба на паметта),
- бепридил (използва се за лечение на ангина пекторис),
- султоприд (за лечение на психози),
- лекарства, които се използват при проблеми със сърдечния ритъм (напр. хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, амиодарон, сotalол),
- дигоксин или други сърдечни гликозиди (за лечение на кардиологични проблеми),
- баклофен (за лечение на мускулна скованост настъпваща при заболявания като множествена склероза),
- лекарства за лечение на диабет, като например инсулин или метформин,
- калциеви препарати включително калциеви добавки,
- слабителни средства стимулиращи перисталтиката (напр. сена),
- нестероидни противовъзпалителни средства (напр. ибuproфен) или високи дози салицилати (напр. аспирин),
- амфотерицин Б в инжекции (за лечение на остри гъбични заболявания),
- лекарства за лечение на психични разстройства, като например депресия, тревожност, шизофрения... (напр. трициклични антидепресанти, невролептици),
- тетракозактид (за лечение на болестта на Крон).

Прием на ТЕРАКСАНС с храни и напитки

Предпочита се приемане на ТЕРАКСАНС преди хранене.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Бременност

Кажете на Вашия лекар ако мислите, че сте бременна, или че може да забременеете. Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на ТЕРАКСАНС преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще ви посъветва да вземете друго лекарство вместо ТЕРАКСАНС. ТЕРАКСАНС не се препоръчва при ранна бременност и не трябва да се взема след третия месец от бременността, тъй като може сериозно да навреди на Вашето бебе ако се използа след третия месец от бременността.

Кърмене

Кажете на Вашия лекар ако кърмите или ако мислите да започвате да кърмите. ТЕРАКСАНС е противопоказан при майки, които кърмят, и Вашият лекар може да избере друго лечение за Вас ако искате да кърмите особено ако бебето Ви е новородено или преждевременно родено.
Говорете с Вашия лекар незабавно.

Шофиране и работа с машини



ТЕРАКСАНС обикновено не повлиява състоянието на бдителност, но при някои пациенти могат да настъпят индивидуални реакции като виене на свят и слабост, свързани с понижаване на кръвното налягане. В резултат на това може да се наруши способността за шофиране или работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на ТЕРАКСАНС

ТЕРАКСАНС съдържа лактоза (вид захар). Ако Вашият лекар Ви е съобщил, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТЕРАКСАНС

Винаги приемайте ТЕРАКСАНС точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е една таблетка дневно. За предпочтение е да приемате таблетката си сутрин и преди хранене. Приемайте таблетката с чаша вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза ТЕРАКСАНС

Ако сте приели повече таблетки, незабавно се свържете с Вашия лекар или най-близкото медицинско заведение за спешна помощ. Ако кръвното Ви налягане спадне значително (симптомите са виене на свят или премаляване), заемането на хоризонтално положение на тялото с повдигнати долни крайници може да Ви бъде от полза.

Ако сте пропуснали да приемете ТЕРАКСАНС

Важно е да приемате Вашето лекарство всеки ден, тъй като редовното лечение е по-ефективно. Ако, обаче, пропуснете да вземете една доза ТЕРАКСАНС, вземете следващата доза по обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на ТЕРАКСАНС

Тъй като лечението на кръвното налягане е обичайно за цял живот, Вие трябва да се посъветвате с Вашия лекар преди да спрете приемането на този лекарствен продукт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ТЕРАКСАНС може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако почувствате някоя от следните реакции, спрете приемането на лекарствения продукт веднага и съобщете незабавно на Вашия лекар :

- подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, затруднение в дишането,
- тежък световъртеж или премаляване,
- необично бърз или неравномерен сърден пулс.

В низходящ ред на честотата им нежеланите реакции могат да бъдат следните:

- Чести (срещат се при по-малко от 1 на 10 потребители, но при повече от 1 на 100 потребители): главоболие, виене на свят, световъртеж, изтръпване на крайниците, нарушения на зрението, шум в ушите (усещане за шум в ушите), замаяност поради ниско кръвно налягане, кашлица, недостиг на въздух, стомашно-чревни нарушения (гадене, повръщане, болки в корема, променен вкус, сухота в устата, диспепсия или затруднено храносмилане, диария, запек), алергични реакции (като напр. кожни обриви, сърбеж), мускулни крампи, чувство за умора,
- Нечести (срещат се при по-малко от 1 на 100 потребители, но при повече от 1 на 1000 потребители): промени в настоението, нарушения на съня, бронхоспазъм (стягане в гърдите, свиркащо дишане и недостиг на въздух), ангионевротичен оток (симптом като напр. свиркащо дишане, подуване на лицето или езика), уртикария (копризна треска), пурпурна (червен точковиден обрив), бъбречни проблеми, импотенция, потенциални.



- Много редки (срещат се при по-малко от 1 на 10 000 потребители): обърканост, сърдечносъдови нарушения (неритмичен пулс, ангина пекторис (гръдна жаба), сърден инфаркт), еозинофилна пневмония (рядък вид пневмония), ринит (запущен нос или хрема), тежки кожни прояви, като например еритема мултиформе. Ако страдате от системен лупус еритематозус (вид колагеноза), може да настъпи влошаване. Има съобщения и за прояви на фоточувствителност (промени във външния вид на кожата) след излагане на слънце или изкуствени ултравиолетови лъчи.

Възможни са нарушения на кръвта, бъбреците, черния дроб или панкреаса (задстомашната жлеза) и промени в лабораторните параметри (кръвните изследвания). Може да се наложи Вашия лекар да Ви назначи изследване на кръвта за контролиране на Вашето състояние.

В случаите на чернодробна недостатъчност (проблеми с черния дроб), съществува опасност от настъпване на чернодробна енцефалопатия (дегенеративно заболяване на мозъка).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТЕРАКСАНС

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ТЕРАКСАНС след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и контейнера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте контейнера плътно затворен, за да предпазите от влага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ТЕРАКСАНС

- Активните вещества са периндоприл аргинин и индапамид. Една филмирана таблетка съдържа 10mg периндоприл аргинин (съответстващи на 6,79 mg периндоприл) и 2,5 mg индапамид. Другите съставки в сърцевината на таблетката са: лактозаmonoхидрат, магнезиев стеарат (E470B), малтодекстрин, силициев диоксид, хидрофобен колоиден (E551), натриев нишестен гликолат (тип A), а във филмовото покритие на таблетката: глицерол (E422), хипромелоза (E464), макрогол 6000, магнезиев стеарат (E470B), титанов диоксид (E171).

Как изглежда ТЕРАКСАНС и какво съдържа опаковката

ТЕРАКСАНС, филмирани таблетки, са бели кръгли филмирани таблетки. Една филмирана таблетка съдържа 10 mg периндоприл аргинин и 2,5 mg индапамид.

Таблетките се продават в контейнери от 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 или 500 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба :

Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly sur Seine – Франция

Производител:

Les Laboratoires Servier Industrie



905 route de Saran
45520 Gidy - Франция

и

Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Arklow - Co. Wicklow – Ирландия

Местен представител:

Сервие Медикал ЕООД

Тел: 02/921 57 00

София

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните членкие на ЕИА под следните имена:

Белгия	TERAXANS 10 mg /2,5 mg
България	TERAXANS 10 mg /2.5 mg
Кипър	TERAXANS 10 mg /2.5 mg
Чешка република	Perindopril arginine 10 mg / indapamide 2,5 mg Servier
Дания	TERAXANS 10 mg /2.5 mg
Естония	Perindopril 10 mg / Indapamide 2.5 mg Servier
Финландия	TERAXANS 10 mg /2.5 mg
Франция	PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE SERVIER 10mg/2,5 mg
Гърция	TERAXANS 10 mg /2,5 mg
Унгария	PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE EGIS 10mg /2,5mg filmtabletta
Исландия	TERAXANS 10 mg /2.5 mg
Ирландия	TERAXANS 10 mg /2.5 mg
Италия	TERAXANS 10 mg /2,5 mg
Латвия	Perindopril arginine 10 mg / indapamide 2.5 mg
Литва	TERAXANS 10 mg /2,5 mg plévele dengtos tabletės
Люксембург	TERAXANS 10 mg /2,5 mg
Малта	TERAXANS 10 mg /2.5 mg
Холандия	Perindopril arginine 10 mg / indapamide 2.5 mg Servier
Полша	Peryndopryl arginine + Indapamid Anpharm
Португалия	PREDONIUM 10mg/2,5mg
Румъния	TERAXANS 10 mg /2,5 mg
Словашка република	Perindopril arginine 10 mg / indapamide 2.5 mg
Словения	TERAXANS 10 mg /2.5 mg filmsko obložene tablete
Испания	Perindopril arginine 10 mg /indapamide 2,5 mg Servier
Великобритания	PRETERVAL 10mg/2.5mg Film-coated Tablets

Дата на последно одобрение на листовката:

