

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**Ibuprofen Alchemia 600 mg film-coated tablets**  
**Ибупрофен Alchemia 600 mg филмирани таблетки**

С П Р  
И-49 18/19.05.09

Ibuprofen/ Ибупрофен

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Ибупрофен Alchemia и за какво се използва
2. Преди да приемете Ибупрофен Alchemia
3. Как да приемате Ибупрофен Alchemia
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ибупрофен Alchemia
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИБУПРОФЕН ALSHEMIA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Ибупрофен Alchemia е от група лекарства наречени НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства), които действат като намаляват болката, възпалението и повишената температура.

Ибупрофен Alchemia 600 mg се използва за лечение на ревматоиден артрит, остеоартрит или други възпалителни или болезнени ставни заболявания, както и при възпаления и болки на меките тъкани, като мускули.

**2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ИБУПРОФЕН ALSHEMIA**

**Не приемайте Ибупрофен Alchemia**

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към ибупрофен или към някоя от останалите съставки на Ибупрофен Alchemia
- ако сте имали алергични реакции като астма, хрема, кожен обрив със сърбеж или оток на устните, лицето, езика или гърлото, след приема на лекарства съдържащи ацетилсалицилова киселина (например аспирин) или други болкоуспокояващи и противовъзпалителни средства (НСПВС).
- ако имате язва или кървене от стомаха или дванадесетопръстника, дължащи се на предишна употреба на на противоболкови и противовъзпалителни средства (НСПВС)
- ако имате язва или кървене от стомаха или дванадесетопръстника или сте имали два или повече такива епизоди в миналото
- ако страдате от тежки заболявания на черния дроб, бъбреците или сърцето (включително коронарна болест на сърцето)
- ако сте в последното тримесечие на бременността
- ако страдате от значително обезводняване (причинено от повръщане, диария или недостатъчен прием на течности)
- ако имате някакво активно кървене (включително в мозъка)
- ако имате неизяснени смущения в кръвообразуването
- деца под 6 годишна възраст

**Обърнете специално внимание при употребата на Ибупрофен Alchemia**



- ако страдате от системен лупус еритематодес (SLE) или друго аутоимунно заболяване
- ако имате наследствени нарушения в червения кръвен пигмент – хемоглобин (порфирия)
- ако страдате от хронични възпалителни чревни заболявания като възпаление на дебелото черво с язви (улцерозен колит), възпаление на храносмилателния тракт (болестта на Крон) или други стомашно-чревни заболявания
- ако имате смущения в кръвообразуването
- ако имате нарушения в механизма на кръвосъсирването
- ако страдате от алергии, сенна хрема, астма, хроничен оток на носната лигавица, синусите, аденоидите или хронична обструктивна болест на дихателните пътища, тъй като съществува по-голям риск от стесняване на дихателните пътища и затруднено дишане (бронхоспазъм)
- ако имате нарушения в кръвообращението в артериите на ръцете или краката
- ако имате нарушения на черния дроб, бъбреците, сърцето или високо кръвно налягане
- ако наскоро сте прекарвали сериозна операция
- ако сте в първите шест месеца на бременността
- ако кърмите

#### *Пациенти в напреднала възраст*

Ако сте в напреднала възраст, Вие сте по-склонни към нежелани лекарствени реакции, особено кървене и перфорация на храносмилателния тракт, което може да има фатални последици.

#### *Язви, перфорация и стомашно-чревни кръвоизливи*

Ако в миналото сте имали стомашно-чревна язва и особено, ако е била усложнена от перфорация или съпътствана с кръвоизлив, трябва да внимавате за някакви необичайни коремни симптоми и да уведомявате Вашия лекар за такива, особено ако се появят в началото на лечението. Причината е, че рискът от кръвоизлив или улцерация на храносмилателния тракт е по-висок в този случай, особено при пациенти в напреднала възраст. Ако настъпи кървене или улцерация на храносмилателния тракт, лечението трябва да бъде преустановено.

Кървене, улцерация или перфорация на стомашно-чревния тракт могат да настъпят без предупредителни симптоми даже и при пациенти, които никога преди не са имали такива проблеми. Последиците могат да бъдат фатални.

Рискът от язви, перфорация или кървене от стомашно-чревния тракт обикновено нараства при по-високи дози ибупрофен. Рискът се увеличава и при едновременен прием на ибупрофен с други лекарства (виж „Прием на други лекарства“)

#### *Кожни реакции*

Приемът на Ибупрофен трябва да се преустанови при първите признаци на кожен обрив, лезии на лигавицата или други признаци на алергия, тъй като това може да бъде показателно за сериозни кожни реакции (ексфолиативен дерматит, еритема мултиформе, синдром на Стивънс-Джонсън, синдром на Лайъл), понякога с фатални последици. Най-висок риск от такива реакции има през първия месец на лечението.


#### *Ефекти върху сърцето и мозъка*

Лекарства като Ибупрофен се свързват със слабо повишен риск от сърдечен инфаркт (инфаркт на миокарда) или инсулт. Рискът се увеличава при прием на високи дози и продължително лечение. Не надвишавайте препоръчаната доза или продължителността на лечението.

Ако имате сърдечни заболявания, прекаран инсулт или смятате, че сте изложени на риск от такива заболявания (например ако имате високо кръвно налягане, диабет, висок холестерол или сте пушач), трябва да обсъдите лечението си с Вашия лекар или фармацевт.

#### *Ефекти върху бъбреците*

Ибупрофен може да причини нарушения в бъбречната функция даже при пациенти, които преди това не са имали проблеми с бъбреците. Това може да доведе до отоци по краката и даже до сърдечна недостатъчност или високо кръвно налягане при предразположени пациенти.





Ибупрофен може да причини увреждане на бъбреците, особено при пациенти, които вече имат бъбречно, сърдечно или чернодробно заболяване или които приемат диуретици или АСЕ инхибитори, както и при пациенти в напреднала възраст. Преустановяването на приема на ибупрофен обикновено води до възстановяване на пациента.

#### *Други предпазни мерки*

При продължителна употреба на болкоуспокояващи във високи дози е възможно да настъпи главоболие, което не трябва да се лекува с високи дози от това лекарство. Обичайната употреба на болкоуспокояващи може да причини трайно увреждане на бъбреците и риск от бъбречна недостатъчност.

Ибупрофен може да прикрие симптомите или признаците на инфекция (фебрилитет, болка и оток) и временно да удължи времето на кървене.

Ибупрофен може да намали шансовете Ви за забременяване. Трябва да информирате Вашия лекар, ако планирате бременност или ако имате проблеми със забременяването.

#### **Прием на други лекарства**

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Страничните ефекти на Ибупрофен могат да се засилят, ако приемате едновременно други лекарства. От друга страна, Ибупрофен може да засили или отслаби ефекта на други лекарства или да засили техните странични ефекти при едновременна употреба.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате:

- други НСПВС
- ацетилсалицилова киселина (аспирин)
- антикоагуланти (противосъсирващи средства): варфарин или хепарин
- инхибитори на тромбоцитната агрегация (противосъсирващи средства): тиклопидин или клопидрогел
- метотрексат (за лечение на ракови и автоимунни заболявания)
- дигоксин (за лечение на различни сърдечни заболявания)
- фенитоин (за предпазване от епилептични гърчове)
- литий (за лечение на депресия и мании)
- диуретици (отводняващи таблетки), включително калий-съхраняващи диуретици
- антихипертензивни средства (за лечение на високо кръвно налягане), като:
  - АСЕ-инхибитори, например каптоприл
  - Бета-блокери
  - Ангиотензин II рецепторни антагонисти
- Холестирамин (за лечение на висок холестерол)
- Аминогликозиди (антибактериални средства)
- SSRI (антидепресанти): пароксетин, сертралин, циталопрам
- Моклобемид (RIMA – за лечение на депресивни състояния или социална фобия)
- Циклоспорин, такролим (за потискане на имунната система след трансплантация на орган)
- Зидовудин или ритонавир (за лечение на пациенти с HIV)
- Мифепристон
- Пробеницид или сулфинпиразон (за лечение на подагра)
- Хинолонови антибиотици
- Сулфонилурейни продукти (за лечение на диабет тип 2)
- Кортикостероиди (противовъзпалителни)
- Бисфосфонати (използват се при остеопороза, болест на Пейджет и за понижаване нивото на калций в кръвта)
- Окспентифилин (пентоксифилин) за лечение на нарушено кръвообращение в артериите на краката или ръцете



- Баклофен (мускулен релаксант)

### **Прием на Ибупрофен Alchemia с храни и напитки**

Ибупрофен се приема с чаша вода по време на хранене или след това.

Избягвайте консумацията на алкохол, тъй като той може да засили страничните ефекти на ибупрофен, особено стомашно-чревните или мозъчните.

### **Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Ибупрофен не трябва да се приема през последните 3 месеца на бременността, тъй като може да причини сериозни сърдечни, белодробни и бъбречни увреждания при нероденото дете. Ако се приема в края на бременността, може да причини предразположение към кървене при майката и детето и да отслаби контракциите на матката, с което ще забави раждането. Лечение през първите 6 месеца от бременността може да се назначава само от лекар при ясни индикации.

Ибупрофен може да затрудни забременяването. Необходимо е да информирате Вашия лекар, ако планирате бременност или имате проблеми със забременяването.

Ибупрофен се излъчва в кърмата в много малко количество и обикновено не се налага да се спира кърменето по време на краткосрочно лечение. Ако е назначено продължително лечение, трябва да се помисли за ранно отбиване на кърмачето.

### **Шофиране и работа с машини**

Ибупрофен обикновено не повлиява способността за шофиране и работа с машини. Все пак, тъй като при високи дози могат да се наблюдават някои нежелани реакции като умора, сънливост, световъртеж (често съобщавана) и зрителни смущения (нечести), в отделни случаи те могат да се отразят на способността за шофиране и работа с машини. Този ефект се засилва от едновременната консумация на алкохол.

## **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ Ибупрофен Alchemia**

Винаги приемайте Ибупрофен Alchemia точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Нежеланите реакции могат да се намалят до минимум, като се използва най-ниската ефективна доза за възможно най-краткия период, необходим за овладяване на симптомите.

Дозата на ибупрофен зависи от възрастта и телесното тегло на пациента. Максималната еднократна дневна доза за възрастни не трябва да надвишава 800 mg ибупрофен.

Обичайната доза е:

#### ***Ревматични заболявания***

##### ***Възрастни:***


Обичайната доза е 400 mg – 600 mg 3 пъти дневно. Вашият лекар може да Ви предпише и по-ниски дози. В зависимост от естеството и сериозността на заболяването, лекарят може да увеличи дозата до максимално 2400 mg дневно, в 3 или 4 приема.

##### ***Юноши над 12 години:***

Препоръчаната доза е 20 mg/kg до максимум 40 mg/kg телесно тегло разделена на 3 или 4 приема.

Възможно е тези таблетки да не са подходящи за тази възрастова група, тъй като може да имат по-високо съдържание на ибупрофен в 1 таблетка от препоръчителното за съответното телесно тегло.

Таблетките се поглъщат с чаша вода по време на хранене или след това. За по-лесно преглъщане или точна дозировка, таблетките могат да се делят на две равни половини.



### **Пациенти в напреднала възраст**

Ако сте в напреднала възраст, Вие сте предразположени още повече към нежелани лекарствени реакции, особено кървене и перфорация на храносмилателния тракт, които могат да бъдат фатални. Консултирайте се с Вашия лекар.

### **Намалена бъбречна или чернодробна функция**

Ако имате нарушена бъбречна или чернодробна функция, консултирайте се с Вашия лекар.

### **Ако сте приели повече от необходимата доза Ибупрофен Alchemia**

Ако сте приели повече от необходимата доза Ибупрофен Alchemia, потърсете лекар, спешна медицинска помощ или се консултирайте с фармацевт.

Симптомите на предозиране могат да включват: гадене, повръщане, стомашна болка или диария. Могат да настъпят също така шум в ушите, главоболие, замаяване, световъртеж и стомашно-чревен кръвоизлив. При по-сериозни случаи на предозиране могат да настъпят сънливост, възбуда, дезориентация, кома, конвулсии, крампи (особено при деца), замъглено виждане и очни смущения, бъбречна недостатъчност, чернодробно увреждане, понижено кръвно налягане, затруднено дишане, посиняване на устните, езика и пръстите, както и засилена тенденция към кървене. При астматици може да настъпи влошаване на астмата.

### **Ако сте пропуснали да приемете Ибупрофен Alchemia**

Ако сте пропуснали да приемете една доза, вземете я при първа възможност, освен ако остават по-малко от четири часа до следващия прием.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

## **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, Ибупрофен Alchemia може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Вероятността от настъпване на нежелани лекарствени реакции е по-голяма, ако се използват по-високи дози и лечението е по-продължително.

Лекарства като ибупрофен се свързват с леко повишен риск от сърдечен инфаркт (инфаркт на миокарда) или инсулт. Във връзка с употребата на НСПВС се съобщава за задържане на течности (оток), високо кръвно налягане и сърдечна недостатъчност.

Нежеланите реакции са групирани по честота, както следва:

Много чести: повече от 1 на 10

Чести: 1-10 на 100

Нечести: 1 -10 на 1,000

Редки: 1-10 на 10,000


С неизвестна честота: не може да се определи от наличните данни

*Следните нежелани лекарствени реакции са важни и изискват незабавни действия. Трябва да преустановите приема на Ибупрофен Alchemia и да се консултирате незабавно с Вашия лекар, ако забележите следните симптоми:*

**Чести:**

- Катраненочерни изпражнения или повръщане с петна от кръв (язва на храносмилателния тракт с кървене)

**Много редки:**





- Оток на лицето, езика или гърлото (ларинкс), което може да затрудни до голяма степен дишането (ангиоедем), ускорен пулс, драстично понижаване на кръвното налягане или животозастрашаващ шок
- Внезапна алергична реакция със задъхване, кихане и понижаване на кръвното налягане
- Сериозен обрив с мехури по кожата, особено по краката, горната и долна част на ръцете, стъпалата, а може да обхване и лицето и устните (еритема мултиформе, синдром на Стивънс-Джонсън). Обривът може да стане още по-сериозен, мехурите – по-големи и разпрострени, а част от кожата може да се обели (синдром на Лайъл). Може също така да настъпи сериозна инфекция с разрушаване (некроза) на кожата, подкожната тъкан и мускулите.

*Необходимо е да преустановите приема на лекарството и да се свържете с Вашия лекар възможно най-бързо, ако забележите следните нежелани реакции:*

*Много често:*

- Стомашни киселини, коремна болка, лошо храносмилане

*Нечесто:*

- Замъглено виждане или други очни смущения като например чувствителност към светлината
- Реакции на свръхчувствителност като кожен обрив, сърбеж, астматични пристъпи (понякога с ниско кръвно налягане)

*Редки:*

- Загуба на зрението

*Много редки:*

- Внезапно напълване на белите дробове с вода, което затруднява дишането, високо кръвно налягане, задържане на течности и повишаване на телесното тегло

*Други възможни нежелани реакции свързани с приема на Ибупрофен Alchemia :*

*Много често:*

- Смущения в храносмилателния тракт: диария, гадене, повръщане, газове, запек

*Често:*

- Стомашна язва със или без перфорация
- Възпаление на червата и обостряне възпалението на дебелото черво(колит) и храносмилателния тракт (болест на Крон), усложнения на дивертикулите на дебелото черво (перфорация или фистула)
- Микроскопично кървене от матката, което може да предизвика анемия
- Язви и възпаление в устната кухина
- Главоболие, сънливост, световъртеж, умора, възбуда, безсъние и раздразнимост

*Нечесто:*


- Възпаление на стомашната лигавица
- Бъбречни смущения включително развитие на оток, възпаление на бъбреците и бъбречна недостатъчност
- Хронична хрема
- Затруднено дишане (бронхоспазъм)

*Редки:*

- Депресия, объркване, халюцинации
- Синдром на лупус еритематодес
- Повишено ниво на азот в кръвната урея и други чернодробни ензими, понижени стойности на хемоглобин и хематогрит, намалена тромбоцитна агрегация и удължено време на кървене, намалено ниво на калций в серума и повишени стойности на пикочната киселина в серума.

*Много редки:*

- Неприятно усещане за сърцебиене, сърдечна недостатъчност, инфаркт или повишено кръвно налягане
- Нарушения в кръвообразуването (със симптоми като : повишена температура, възпалено гърло, повърхностни язви в устната кухина, грипоподобни симптоми, тежка умора, кървене от носа и кожата)
- Звън или шум в ушите



- Възпаление на езофагуса или панкреаса
- Стеснение на червата
- Остро възпаление на черния дроб, оцветяване в жълто на кожата или бялото на очите, нарушена функция на черния дроб, увреждане или чернодробна недостатъчност
- Възпаление на мозъчните мембрани (без бактериална инфекция)
- Увреждане на бъбречната тъкан
- Косопад

Ибупрофен може да доведе до намаляване броя на белите кръвни клетки и Вашата резистентност към инфекции може да бъде понижена. Ако имате инфекция със симптоми като повишена температура и сериозно влошаване на общото Ви състояние, или повишена температура със симптоми на локална инфекция като възпалено гърло/фаринкс/устна кухина или проблеми с пикочните пътища, трябва незабавно да се консултирате с лекар. Ще Ви бъде направена кръвна картина, за да се провери възможно намаление на белите кръвни клетки (агранулоцитоза). Важно е да уведомите Вашия лекар за лекарствата, които приемате.

По време на лечението с ибупрофен се наблюдават някои случаи на менингит (симптоми като схванат врат, главоболие, гадене, повръщане, повишена температура или дезориентация) при пациенти със съществуващи аутоимунни нарушения, напр. системен лупус еритематодес или смесена съединителнотъканна болест.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

## 5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ Ибупрофен Alchemia

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Ибупрофен Alchemia след срока на годност отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарственият продукт не изисква специални условия на съхранение.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### Какво съдържа Ибупрофен Alchemia

- Активното вещество е ибупрофен. Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg ibuprofen.
- Другите съставки са:  
Ядро на таблетката: микрокристална целулоза, силициев диоксид, колоиден безводен, хидроксипропилцелулоза, натриев лаурилсулфат, кроскармелоза натрий, талк  
Таблетна обвивка: (Opatru (бял) 06B28499): хитромелоза, макрогол 400, титанов диоксид (E171).

### Как изглежда Ибупрофен Alchemia и какво съдържа опаковката

#### Филмирани таблетки

Бели, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки с делителна черта от едната страна.  
Таблетките могат да се делят на две еднакви половини.



*Размер на опаковките:*

Блистери: 6, 10, 12, 20, 24, 30, 50, 60, 90, 100 и 250 филмирани таблетки.

Таблетни контейнери: 10, 20, 30, 50, 100 и 250 филмирани таблетки.

**Притежател на разрешението за употреба и производител**

*Притежател на разрешението за употреба:*

Alchemia Limited  
5th floor, 86 Jermyn Street  
London SW1Y 6AW  
Великобритания

*Производител*

Actavis UK Limited  
Whiddon Valley  
Barnstaple  
North Devon  
EX32 8NS, Великобритания


или

**Valkanpharma – Dupnitsa AD**

Ул. Самоковско шосе 3  
2600 Дупница  
България

**Този рекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕИЗ под следните имена:**

Малта	Ibuprofen Alchemia
Австрия	Ibuprofen Alchemia 200 mg Filmtabletten Ibuprofen Alchemia 400 mg Filmtabletten Ibuprofen Alchemia 600 mg Filmtabletten Ibuprofen Alchemia 800 mg Filmtabletten
Белгия	Ibuprofen Alchemia 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Alchemia 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Alchemia 600 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Alchemia 800 mg filmomhulde tabletten
Чешка Република	Ibuprofen Alchemia 200 mg Ibuprofen Alchemia 400 mg Ibuprofen Alchemia 600 mg Ibuprofen Alchemia 800 mg
Дания	Ibuprofen Alchemia
Естония	Ibuprofen Alchemia 200 mg Ibuprofen Alchemia 400 mg Ibuprofen Alchemia 600 mg Ibuprofen Alchemia 800 mg
Гърция	Ibuprofen / Alchemia
Финландия	Ibuprofen Alchemia 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ibuprofen Alchemia 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ibuprofen Alchemia 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ibuprofen Alchemia 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Ирландия	Ibuprofen Alchemia 200 mg film coated tablets Ibuprofen Alchemia 400 mg film coated tablets Ibuprofen Alchemia 600 mg film coated tablets Ibuprofen Alchemia 800 mg film coated tablets





Исландия	Ibuprofen Alchemia
Италия	Ibuprofen Alchemia 600 mg compresse rivestite con film
Литва	Ibuprofen Alchemia 200 mg plėvele dengtos tabletės
	Ibuprofen Alchemia 400 mg plėvele dengtos tabletės
	Ibuprofen Alchemia 600 mg plėvele dengtos tabletės
	Ibuprofen Alchemia 800 mg plėvele dengtos tabletės
Латвия	Ibuprofen Alchemia 200 mg apvalkotās tabletes
	Ibuprofen Alchemia 400 mg apvalkotās tabletes
	Ibuprofen Alchemia 600 mg apvalkotās tabletes
	Ibuprofen Alchemia 800 mg apvalkotās tabletes
Холандия	Ibuprofen Alchemia 200 mg
	Ibuprofen Alchemia 400 mg
	Ibuprofen Alchemia 600 mg
	Ibuprofen Alchemia 800 mg
Норвегия	Ibuprofen Alchemia
Полша	Ibuprofen Alchemia
Португалия	Ibuprofeno Actavis
Румъния	Ibuprofen Alchemia 200 mg comprimate filmate
	Ibuprofen Alchemia 400 mg comprimate filmate
	Ibuprofen Alchemia 600 mg comprimate filmate
	Ibuprofen Alchemia 800 mg comprimate filmate
Швеция	Ibuprofen Alchemia
Словакия	Ibuprofen Alchemia 200 mg
	Ibuprofen Alchemia 400 mg
	Ibuprofen Alchemia 600 mg
	Ibuprofen Alchemia 800 mg

**Дата на последно одобрение на листовката:** Март 2009 г.

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската агенция по лекарствата.

