

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ФУРОТАЛГИН® 2,5 mg/31,25 mg/87,5 mg/ml капки за уши, разтвор
FUROTALGIN® 2,5 mg/31,25 mg/87,5 mg/ml ear drops, solution
нитрофурал/тетракаиннов хидрохлорид/феназон
(nitrofurural/tetracaine hydrochloride/phenazone)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар.

В тази листовка:

1. Какво представлява Фуроталгин и за какво се използва
2. Преди да използвате Фуроталгин
3. Как да прилагате Фуроталгин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Фуроталгин
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
<i>Листовка - Приложение 2</i>
Към РУ №: <u>И-5159, 08.06.09</u>
Одобрено: <u>34 / 24.03.09</u>

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФУРОТАЛГИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Фуроталгин е комбиниран лекарствен продукт с антимикробно, противовъзпалително и обезболяващо действие. Прилага се при остри възпалителни процеси на ушния канал и средното ухо.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФУРОТАЛГИН

Не прилагайте Фуроталгин

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества (нитрофурал, тетракаин, феназон) или към помощното вещество.
- лекуващият лекар няма да назначи Фуроталгин ако имате спукано тъпанче или инфекция на ухото, причинена от гъбички (отомикоза).

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Фуроталгин може да се прилага при бременни и кърмачки след преценка от лекуващия лекар. Ако сте бременна, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Фуроталгин не повлиява способността за шофиране и работа с техника или машини.

3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ ФУРОТАЛГИН



Винаги използвайте Фуроталгин точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Фуроталгин е лекарствен продукт, предназначен за накапване в ушите. Да не се прилага в носа и очите! Да не се приема през устата!

Прилагайте капките след почистване на ушния канал. Главата трябва да се наклони странично, така че капките да останат в ухото за няколко минути, след което ушният канал се запушва с памук.

Необходимо е разтворът предварително да се загрее до телесната температура, за да се избегне неприятния контакт със студените капки.

Дозировка:

Възрастни и деца над 3 години: по 6-10 капки 3-4 пъти дневно;

Деца до 3 години: по 3-4 капки 2 пъти дневно.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Фуроталгин

Няма съобщения за случаи на предозиране при правилно приложение на Фуроталгин.

Ако сте пропуснали да приложите Фуроталгин

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Фуроталгин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможни са алергични реакции, които се изразяват в дразнене или зачервяване на слуховия канал.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФУРОТАЛГИН

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да се съхранява под 25°C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Фуроталгин след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Можете да ползвате Фуроталгин до 1 месец след отваряне на бутилката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Фуроталгин

- Активните вещества са: нитрофурал (nitrofurural) 2,5 mg, тетракаинов хидрохлорид (tetracaine hydrochloride) 31,25 mg, феназон (phenazone) 87,5 mg в 1 ml разтвор (27 капки).

- Другата съставка е глицерол.

Как изглежда Фуроталгин и какво съдържа опаковката

Бистра, жълта течност, със зеленикав оттенък, без мирис.



По 5 ml разтвор в стъклена или полипропиленова бутилка, с откапващо устройство, в картонена кутия с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител
СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно одобрение на листовката: февруари, 2009.

