

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Аурорикс 150 mg филмирани таблетки
Aurorix 150 mg film-coated tablets

R-3831/22-05-09

Моклобемид (Moclobemide)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Аурорикс и за какво се използва
2. Преди да приемете Аурорикс
3. Как да приемате използвате Аурорикс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Аурорикс
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АУРОРИКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Аурорикс филмирани таблетки съдържат активното вещество моклобемид, което е от групата лекарства, известни като антидепресанти. Аурорикс е обратим инхибитор на моноаминооксидазата тип A (RIMA), който предизвиква намаление на метаболизма на норадреналина, допамина и серотонина (5-HT), което води до повишени извънклетъчни концентрации на тези невронни трансмитери.

Аурорикс е лекарство, което се използва за лечение на депресия и социална фобия.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ АУРОРИКС

Не приемайте Аурорикс

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към моклобемид или към някоя от останалите съставки на Аурорикс.
- При деца.
- Ако приемате болкоуспокояващото лекарство петидин или селегилин за лечение на болестта на Паркинсон.
- Ако приемате или насърко сте престанали да приемате друго лекарство за лечение на депресия (включително и лекарства, известни като SSRIs).
- Ако имате тумор на надбъбречните жлези (Вашият лекар може да нарича това заболяване "феохромоцитом").
- Ако страдате от объркване.
- Ако вземате лекарства, съдържащи дексетрометорфан, т.е. лекарства за лечение на кашлица, закупени от аптеката.

Обърнете специално внимание при употребата на Аурорикс

Не забравяйте да информирате Вашия лекар, ако:



- Приемате някакви други лекарства. Тук спадат и закупените от аптеката лекарства за лечение на кашлица и настинка, съдържащи ефедрин, псевдофефедрин или фенилпропаноламин.
- Страдате от друго психично заболяване.
- Имате проблеми с щитовидната жлеза.
- Имате чернодробно заболяване.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или нас скоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Някои лекарства като морфин, фентанил и симетидин могат да повлият ефекта на Аурорикс. Ако приемате някое от тези лекарства, информирайте Вашия лекар, преди да започнете лечение с Аурорикс.

Прием на Аурорикс с храни и напитки

Не се налагат специални ограничения в диетата, когато приемате тези таблетки. Тъй като някои пациенти са особено чувствителни към тирамин, би следвало да избягвате да приемате големи количества храна, съдържащи това съединение. Такива храни са зрялото сирене, екстракти от дрожди и ферментирани продукти от соеви зърна (съдържащи се в някои китайски храни). Поради това Вашият лекар може да Ви даде съвет за начина на хранене, който трябва да спазвате.

Бременност и кърмене

По принцип бременните жени не трябва да приемат това лекарство. Важно е да информирате Вашия лекар, ако сте бременна или допускате, че сте бременна, тъй като лекарят може да прецени, че не трябва да приемате това лекарство.

Ако приемате тези таблетки, не трябва да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква Аурорикс да повлияе способността Ви да шофирате или да работите с машини. Независимо от това, трябва да сте особено внимателни при започване на лечение с Аурорикс.

Мисли за самоубийство и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство

Ако сте депресирани и/или имате тревожно разстройство, понякога може да имате мисли за самонараняване или самоубийство. Тези мисли може да се засилят, когато за първи път приемате антидепресанти, тъй като при всички тези лекарства е необходимо време, за да започнат да действат - обикновено около две седмици, но понякога и по-дълго.

Вие можете да бъдете по-предразположени да мислите по този начин:

- Ако и преди сте имали мисли за самоубийство или самонараняване;
- Ако сте млад човек. Данни от клинични проучвания показват повишен риск от поведение, свързано със самоубийство при млади хора (под 25 години) с психични заболявания, които са лекувани с антидепресант.

Ако по което и да е време у Вас се появят мисли за самонараняване или самоубийство, свържете се с Вашия лекар или незабавно отидете в болница. Може да прецените, че е полезно да споделите с роднина или близък приятел, че сте депресирани или имате тревожно разстройство, и да ги помолите да прочетат тази листовка. Можете да ги помолите да Ви кажат, ако смятат, че Вашата депресия или тревожност се влошават или са обезпокоени от промени в поведението Ви.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АУРОРИКС



- Винаги приемайте Аурорикс точно както Ви е казал Вашият лекар. Обичайната доза е между една и две таблетки, които се приемат два пъти дневно (т.е. между две до четири таблетки дневно).
- Таблетките винаги трябва да се приемат след ядене с вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Аурорикс

Ако приемете по погрешка повече от необходимата доза таблетки или ако някой друг погрешка вземе от Вашето лекарство, свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или с най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Аурорикс

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка доза.

Ако сте спрели приема на Аурорикс

Дори състоянието Ви да се подобри, трябва да продължите да приемате таблетките, докато Вашият лекар не прекрати лечението.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Аурорикс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Едновременно с благоприятния ефект това лекарство може да причини и някои нежелани реакции. Това са: нарушение на съня, напрежение, чувство за тревожност, беспокойство, раздразнителност, световъртеж, главоболие, вцепеняване и пищене в ушите, сухота в устата, промени в зрението, гадене или повръщане, диария, запек, подуване или необичайно ниски нива на натрий в кръвта, което може да Ви накара да почувствате слабост, съниливост, объркане или да предизвика гърчове. Могат още да се появят кожни реакции като обриви, сърбеж или зачервяване.

Ако имате въпроси относно тези или други нежелани реакции, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АУРОРИКС

Няма специални изисквания за съхранение.

Не използвайте Аурорикс след срока на годност (Годен до), отбелязан върху картонената опаковка.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Аурорикс

- Активното вещество е: моклобемид.
- Всяка таблетка съдържа 150 mg моклобемид.
- Другите съставки са: лактоза, царевично нишесте, повидон K30, натриев нишестен гликолат, магнезиев стеарат, хидроксипропил метилцелулоза, полиетиленгликол 6,000, талк, титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172).

Как изглежда Аурорикс и какво съдържа опаковката

Светложълти таблетки в блистерна опаковка, поставена в картонена кутийка.



Една опаковка съдържа 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstraße 1

61352 Bad Homburg v.d. Höhe

Германия

Phone: (06172) 888-2429

Fax: (06172) 888-1112

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употреба:

БУЛГЕРМЕД ВЕ ООД

Ул. Светослав Тертер 24

1124 София

Тел: (02) 942 70 70

Дата на последно одобрение на листовката 04/2009 г.

