

КЪМ РУ №: 5125 , 08.06.09  
Одобрено: 35 / 19.04.09

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**Нурофен Стопколд 200mg / 30mg филмирани таблетки  
Ибупрофен / Псевдоефедрин**

**Nurofen® Stopcold 200mg / 30mg film-coated tablets  
Ibuprofen / Pseudoephedrine**

**Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.** Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 10 дни.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Нурофен Стопколд и за какво се използва
2. Преди да използвате Нурофен Стопколд
3. Как да използвате Нурофен Стопколд
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нурофен Стопколд
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НУРОФЕН СТОПКОЛД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Нурофен Стопколд съдържа ибупрофен, който принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС).

НСПВС осигуряват облекчение, като променят отговора на организма към болка, възпаление и висока температура.

Псевдоефедринът оказва съдосвиващо действие на кръвоносните съдове и облекчава симптомите при запушен и течащ нос.

Нурофен Стопколд е ефективен при течащ или запушен нос и синуси, облекчава болката, главоболието, температурата, както и дискомфорта при болки в гърлото.

**2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НУРОФЕН СТОПКОЛД**

**Не приемайте Нурофен Стопколд ако**

- сте имали алергична реакция към ибупрофен, ацетилсалицилова киселина или към някоя от останалите съставки на Нурофен Стопколд.
- сте получавали влошаване на астма, алергични обриви или сърбежи, появява се алергична хрема, когато сте приемали ибупрофен, ацетилсалицилова киселина или подобни на тях лекарствени продукти
- сте имали или имате язва на стомаха



- имате сърдечно заболяване, високо кръвно налягане, проблеми с простатата или повишена функция на щитовидната жлеза.
- имате диабет или глаукома.
- вашата възраст е под 12 години
- сте бременна или кърмите
- сте спортисти, поради положителен допинг тест

**Обърнете специално внимание при употребата на Нурофен Стопколд ако**

- имате астма или сте получавали астматични пристъпи
- имате бъбречни, сърдечни или чернодробни проблеми, особено ако сте в напреднала възраст.
- имате системен лупус еритематозус или друго смесено съединително-тъканно заболяване

**Предупреждения:**

Лекарства като Нурофен Стопколд могат да бъдат свързани с леко увеличен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и при продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението 3 дни.

Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.

**Прием и употреба на други лекарства**

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Обърнете специално внимание при употребата на Нурофен Стопколд ако редовно приемате други лекарствени продукти, особено ако това са:

- лекарствени продукти за разреждане на кръвта (антикоагуланти)
- антидепресанти, включително трициклични антидепресанти
- деконгестанти или потискащи апетита лекарства
- лекарства за сърце или високо кръвно налягане, например лекарства засилващи отделянето на урина (диуретици)
- други облекчаващи болката лекарства, съдържащи ацетилсалицилова киселина, ибупрофен или други от групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти.
- моноаминооксидазни инхибитори приемани през последните 14 дни
- метотрексат или литиеви препарати
- зидовудин

**Бременност и кърмене**

Има данни за единични случаи на употреба на НСПВС лекарствени продукти, прилагани продължително и при по-високи дози, които могат да повлияят временно и обратимо възможността за забременяване.

**3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ НУРОФЕН СТОПКОЛД**

Винаги приемайте Нурофен Стопколд точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



За възрастни, пациенти в напреднала възраст и деца над 12 години:

Първоначално се приемат 2 таблетки с вода, след това ако е необходимо се вземат 1 или 2 таблетки на всеки 4 часа. Не приемайте повече от 6 таблетки за 24 часа.

Не е подходящ за деца под 12 години.

**Ако сте приели повече от необходимата доза Нурофен Стопколд**

Ако случайно или умишлено сгрешите и приемете повече таблетки от посочената доза, незабавно се обърнете към личния си лекар или най-близкото лечебно заведение.

Ако симптомите продължат повече от 10 дни и болката и температурата не се повлияват или се появят нови симптоми, консултирайте се с лекар или фармацевт

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства Нурофен Стопколд може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нурофен Стопколд обикновено се приема добре от повечето хора, въпреки това в отделни случаи могат да се появят следните нежелани реакции: стомашен дискомфорт или болка, гадене, повръщане, стомашна язва, оцветени в черно изпражнения, обриви, сърбеж, астматични пристъпи, необяснимо свиркащо дишане или недостиг на въздух, изпотяване, жажда, мускулна слабост или тремор, безсъние, болка в гърдите или сърцебиене (ускорен неритмичен пулс), бъбречни и чернодробни проблеми, главоболие, замаяване и смущения в слуха, по-рядко затруднения в уринирането, промяна в настроението, безпокойство, лющене на кожата, лесна поява на синини по кожата и подуване на лицето.

*Увреждания на стомаха и червата* включващи стомашни смущения, болка, гадене, стомашна язва, повръщане, оцветени в черно изпражнения.

*Кръвни увреждания*, изразяващи се в безпричинна или необичайна поява на синини.

*Алергични реакции* включващи влошаване на астма, необяснимо свиркащо затруднено дишане или недостиг на въздух, отоци на лицето, обриви и сърбеж, лющене на кожата.

*Чернодробни нарушения*, по-специално при дългосрочно лечение.

*Бъбречни нарушения*, които може да се изразяват в затруднено уриниране.


*Нарушения на нервната система* изразяващи се в главоболие, замаяност и нарушения на слуха, мускулна слабост или тремор.

*Психични нарушения* - безсъние, промяна в настроението, напр. безпокойство

*Сърдечни нарушения* - болка в гърдите или сърцебиене (ускорен неритмичен пулс)

Лекарства като Нурофен Стопколд могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт.

**Ако се появят някой от тези нежелани реакции или други необичайни симптоми или проблеми, спрете да приемате лекарствения продукт и се консултирайте с Вашия лекар.**



## **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НУРОФЕН СТОПКОЛД**

Не използвайте Нурофен Стопколд след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 25° С, на сухо място.

**Запомнете:** Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа Нурофен Стопколд**

- Активните вещества са: ибупрофен 200mg и псевдоефедрин хидрохлорид 30mg.
- Другите съставки са: Микрокристална целулоза, Кармелоза омрежена натриева сол, Повидон, Калциев фосфат, Магнезиев стеарат, Хипромелоза, Талк, оцветители (съдържат алуминий и E110), Опакод черен –S-1-8152 HV (съдържа железен оксид, шеллак, соев лецитин и антипенител DC1510) или Черно мастило за печат (съдържа железен оксид, шеллак, пропиленгликол).

### **Как изглежда Нурофен Стопколд и какво съдържа опаковката**

Опаковка Нурофен Стопколд съдържа 12 или 24 таблетки  
Не всички опаковки са пуснати на пазара.

**Притежател на разрешението за употреба:**  
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.  
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH  
Великобритания

**Производител:**  
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.  
Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB  
Великобритания

Тази листовката дава най-важната информация на пациента за Нурофен Стопколд. Ако имате повече въпроси след прочитането ѝ, попитайте вашия лекар или фармацевт, те ще ви дадат допълнителна информация.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Дата на последна ревизия на текста: февруари 2009

