

5020 / 28.05.09

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Лароксин SR 37.5 mg твърди капсули с удължено освобождаване
Laroxin SR 37.5 mg prolonged release capsules, hard

Лароксин SR 75 mg твърди капсули с удължено освобождаване
Laroxin SR 75 mg prolonged release capsules, hard

Лароксин SR 150 mg твърди капсули с удължено освобождаване
Laroxin SR 150 mg prolonged release capsules, hard

Венлафаксин
Venlafaxine

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Лароксин SR и за какво се използва
2. Преди да започнете приема на Лароксин SR
3. Как да приемате Лароксин SR
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как да се съхранява Лароксин SR
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛАРОКСИН SR И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Лароксин SR е антидепресант, който принадлежи към група лекарства, наречени инхибитори на обратното захващане на серотонин и норадреналин. Тази група лекарства се използва за лечение на депресия и други състояния като тревожни разстройства. Счита се, че хората, които са депресирани и/или в тревожно състояние, имат по-ниски нива на серотонин и норадреналин в мозъка. Не е напълно ясно как действат антидепресантите, но те могат да помагат чрез повишаване нивата на серотонина и норадреналина в мозъка.

Лароксин SR е лечение за възрастни с депресия. Лароксин SR е също лечение за възрастни със следните тревожни разстройства: генерализирано тревожно разстройство, социално тревожно разстройство (страх и избягване на социални ситуации) и паническо разстройство (пристъпи на паника). Правилното лечение на депресията или тревожните разстройства е важно, за да се почувствате по-добре. Ако не се лекува, Вашето състояние може да не отшуми и може да стане по-сериозно и по-трудно за лечение.



2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРИЕМА НА ЛАРОКСИН SR:

Не приемайте Лароксин SR:

- Ако сте алергични към венлафаксин или към някоя от останалите съставки на Лароксин SR.
- Ако приемате също или сте приемали някога в рамките на последните 14 дни някакви лекарства, известни като необратими моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ), използвани за лечение на депресия или болестта на Паркинсон. Приемането на необратим МАОИ заедно с други лекарства, включително Лароксин SR, може да причини сериозни или дори животозастрашаващи нежелани реакции. Също така трябва да изчакате поне 7 дни, след като спрете да приемате Лароксин SR, преди да приемате някакви МАОИ (вижте също точките “Серотонинов синдром” и “Прием на други лекарства”).

Обърнете специално внимание при употребата на Лароксин SR

- Ако използвате други лекарства, които, приети едновременно с Лароксин SR, биха могли да повишат риска от развитие на серотонинов синдром (вж. точка “Прием на други лекарства”).
- Ако имате очни проблеми като определени видове глаукома (повишено налягане в окото).
- Ако имате анамнеза за високо кръвно налягане.
- Ако имате анамнеза за сърдечни проблеми.
- Ако имате анамнеза за припадъци (гърчове).
- Ако имате анамнеза за ниски нива на натрий и кръвта (хипонатремия).
- Ако имате склонност да образувате синини или склонност да кървите лесно (анамнеза за нарушения на кръвосъсирването), или ако приемате други лекарства, които могат да повишат риска от кървене.
- Ако нивата на холестерола Ви се покачват.
- Ако имате анамнеза, или ако някой във Вашето семейство е имал мания или биполарно разстройство (чувствате се свръхвъзбудени или еуфорични).
- Ако имате анамнеза за агресивно поведение.

Лароксин SR може да причини усещане за безпокойство или неспособност да се стои спокойно в седнало или изправено положение. Трябва да кажете на Вашия лекар, ако това Ви се случи.

Ако някое от тези състояния се отнася за Вас, моля кажете на Вашия лекар, преди да приемате Лароксин SR.

Мисли за самоубийство и влошаване на Вашето депресивно или тревожно разстройство

Ако сте депресирани и/или имате тревожни разстройства, можете понякога да имате мисли да се самонараните или самоубиете. Те могат да се засилят, когато започнете да приемате за пръв път антидепресанти, тъй като за всички тези лекарства е необходимо време, преди да започнат да действат, обикновено около две седмици, но понякога и по-дълго.

Има по-голяма вероятност да мислите така:

- Ако преди това сте имали мисли да се самоубиете или да се самонараните.
- Ако сте младеж. Информацията от клиничните проучвания показва повишен риск за суицидно поведение (склонност към самоубийство) при младежи (под 25 годишна възраст) с психиатрични състояния, които са били лекувани с антидепресанти.



Ако някога имате мисли за самонараняване или самоубийство, свържете се с Вашия лекар или незабавно отидете в болница.

Може да е полезно да кажете на роднина или близък приятел, че сте депресирани или имате тревожно разстройство, и да ги помолите да прочетат тази листовка. Можете да ги помолите да Ви кажат, ако мислят, че Вашите депресия или тревожност се влошават или ако те се тревожат за промени във Вашето поведение.

Сухота в устата

Сухота в устата се съобщава при 10% от пациентите, лекувани с венлафаксин. Това може да повиши риска от кариес. Ето защо трябва да обърнете специално внимание за хигиената на Вашите зъби.

Употреба при деца и юноши под 18-годишна възраст

Лароксин SR трябва нормално да не се използва за деца и юноши под 18 години. Също така трябва да знаете, че пациентите под 18 имат повишен риск от нежелани реакции, като суициден опит, суицидни мисли и враждебност (предимно агресия, опозиционно поведение и гняв), когато приемат този клас лекарства. Независимо от това Вашият лекар може да предпише Лароксин SR за пациенти под 18 години, тъй като той/тя решава дали това е в техен най-голям интерес. Ако Вашият лекар е предписал Лароксин SR за пациент под 18 години и Вие искате да обсъдите това, моля обърнете се отново към Вашия лекар. Трябва да информирате Вашия лекар, ако се появи или влоши някой от изброените по-горе симптоми, когато пациентите под 18 приемат Лароксин SR. Освен това дългосрочните ефекти на Лароксин SR върху безопасността за растежа, съзряването и развитието на познавателните способности и поведението в тази възрастова група все още не са демонстрирани.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Вашият лекар трябва да реши дали можете да вземате Лароксин SR с други лекарства. Не започвайте и не спирайте да приемате каквито и да е лекарства, включително и тези, купувани без рецепта, природни или билкови лекарства, преди да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

- Моноаминооксидазни инхибитори (MAOI: вж. точка “Преди да приемете Лароксин SR”)
- Серотонинов синдром: Серотониновият синдром, който е потенциално животозастрашаващо състояние (вж. точка “Възможни нежелани реакции”), може да се появи при лечение с венлафаксин, особено когато той се приема с други лекарства. Примерите за такива лекарства включват:
 - Триптани (използвани за мигрена)
 - Лекарства за лечение на депресия, например SNRI, SSRIs, трициклични антидепресанти или лекарства, съдържащи литий
 - Лекарства, съдържащи линезолид, който е антибиотик (използван за лечение на инфекции)
 - Лекарства, съдържащи моклобемид, който е обратим MAOI (използван за лечение на депресия)
 - Лекарства, съдържащи сибутрамин (използван за понижаване на теглото)
 - Лекарства, съдържащи трамадол (болкоуспокояващо)
 - Продукти, съдържащи жълт кантарион (наричан още *Hypericum perforatum*, който е природно или билково лекарство, използвано за лечение на лека депресия)
 - Продуктите, съдържащи триптофан (използвани за проблеми например с мигрена и



депресия)

Признаците и симптомите на серотонинов синдром могат да включват комбинация от следните: неспокойство, халюцинации, загуба на координация, ускорена сърдечна дейност, повишена телесна температура, бързи промени в кръвното налягане, свръхактивни рефлексии, диария, кома, гадене, повръщане. Потърсете незабавно медицинска помощ, ако мислите, че получавате серотонинов синдром.

Следните лекарства могат също да взаимодействат с Лароксин SR и трябва да се използват с повишено внимание. Особено важно е да споменете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате лекарства, съдържащи:

- Кетоконазол (противогъбично лекарство)
- Халоперидол или рисперидон (за лечение на психиатрични състояния)
- Метопролол (бета-блокатор за лечение на високо кръвно налягане и на сърдечни проблеми)

Прием на Лароксин SR с храни и напитки

Лароксин SR трябва да се приема с храната (вж. точка 3).

Трябва да избягвате употребата на алкохол, докато приемате Лароксин SR.

Бременност и кърмене

Кажете на Вашия лекар, ако забременеете или ако се опитвате да забременеете. Трябва да използвате Лароксин SR едва след като обсъдите потенциалните ползи и потенциалните рискове за Вашето неродено дете с Вашия лекар.

Ако приемате Лароксин SR по време на бременност, уведомете Вашите акушерка и/или лекар, тъй като Вашето бебе може да има някакви симптоми, когато се роди. Тези симптоми обикновено започват през първите 24 часа след раждането на детето. Те включват недостатъчно хранене и проблеми с дишането. Ако Вашето бебе има тези симптоми, когато се роди, и Вие имате притеснения, свържете се с Вашите лекар и/или акушерка, които ще могат да Ви посъветват.

Лароксин SR преминава в кърмата. Има риск да окаже ефект върху бебето. Ето защо трябва да обсъдите това с Вашия лекар и той/тя ще реши дали трябва да спрете да кърмите или да спрете терапията с Лароксин SR.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не използвайте никакви уреди или машини, докато не разберете как Ви влияе Лароксин SR.

Важна информация за някои от помощните вещества на Лароксин SR

Капсули 37.5 mg:

Помощното вещество оцветител червен (E124) включено в състава на капсулната обвивка, може да предизвика алергични реакции.

Капсули 75 mg:

Помощното вещество оцветител жълт (E110) включено в състава на капсулната обвивка, може да предизвика алергични реакции.

Капсули 150 mg:

Помощното вещество оцветител жълт (E110), включено в състава на капсулната обвивка, може да предизвика алергични реакции.

Освен това този лекарствен продукт съдържа захароза. Ако лекарят Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, уведомете го преди да започнете да приемате Лароксин SR.



3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЛАРОКСИН SR

Винаги приемайте Лароксин SR точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайно препоръчваната начална доза за лечение на депресия, генерализирано тревожно разстройство и социално тревожно разстройство е 75 mg на ден. Дозата може да бъде повишавана от Вашия лекар постепенно, и ако е необходимо, дори до максимум 375 mg дневно за депресия. Ако се лекувате за паническо разстройство, Вашият лекар ще започне с по-ниска доза (37,5 mg) и след това ще повишава дозата постепенно. Максималната доза за генерализирано тревожно разстройство, социално тревожно разстройство и паническо разстройство е 225 mg/ден.

Приемайте Лароксин SR по приблизително едно и също време всеки ден или сутрин, или вечер. Капсулите трябва да се поглъщат цели с течност и да не се отварят, разчупват, дъвчат или разтварят.

Лароксин SR трябва да се приема с храна.

Ако имате чернодробни или бъбречни проблеми, говорете с Вашия лекар, тъй като може да е необходимо Вашата доза Лароксин SR да се промени.

Не спирайте приема на Лароксин SR, без да се консултирате с Вашия лекар (вж. точка "Ако сте спрели приема на Лароксин SR").

Ако сте приели повече от необходимата доза Лароксин SR

Обадете се незабавно на Вашия лекар или фармацевт, ако сте приели повече от необходимата доза Лароксин SR, предписана от Вашия лекар.

Симптомите на евентуално предозиране могат да включват ускорено сърцебиене, промени в нивото на будност (вариращи от сънливост до кома), замълено виждане, гърчове или припадъци и повръщане.

Ако сте пропуснали да приемете Лароксин SR

Ако пропуснете доза, приемете я веднага след като си спомните. Ако обаче е настъпило време за следващата доза, прескочете пропуснатата доза и приемете само единична доза, както обикновено. Не вземайте повече от дневното количество Лароксин SR, което Ви е било предписано за един ден.

Ако сте спрели приема на Лароксин SR

Не спирайте да приемате Вашето лечение и не понижавайте дозата без съвет от Вашия лекар, дори ако се чувствате по-добре. Ако Вашият лекар смята, че повече не се нуждаете от Лароксин SR, той/тя може да Ви помоли бавно да понижите Вашата доза преди да спрете изцяло лечението. Известно е, че настъпват нежелани реакции, когато хората спират употребата на Лароксин SR, особено когато Лароксин SR се спира внезапно или дозата се понижава твърде бързо. Някои пациенти могат да почувстват симптоми като умора, световъртеж, замаяност, главоболие, сънливост, нощни кошмари, сухота в устата, загуба на апетит, гадене, диария, нервност, ажитираност, обърканост, шум в ушите, мравучкане или, рядко, усещания като от електрически шок, слабост, потене, гърчове или грипоподобни симптоми.

Вашият лекар ще Ви посъветва за това как трябва постепенно да спрете лечението с Лароксин SR. Ако почувствате някой от тези или други симптоми, които Ви притесняват, обърнете се към Вашия лекар за допълнителен съвет.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Лароксин SR може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не се притеснявайте, ако забележите малки бели гранули във Вашите изпражнения след като приемете Лароксин SR. Отвътре капсулите Лароксин SR представляват микросфери или малки бели топченца, които съдържат активното вещество венлафаксин. Тези микросфери се освобождават от капсулата във Вашия стомашно-чревен тракт. Когато микросферите преминават по цялата дължина на Вашия стомашно-чревен тракт, венлафаксин бавно се освобождава. „Обвивката“ на микросферите остава неразтворена и се елиминира във Вашите изпражнения. Затова въпреки че можете да забележите микросфери във Вашите изпражнения, Вашата доза венлафаксин е била абсорбирана.

Алергични реакции

Ако получите някоя от следните реакции, не приемайте Лароксин SR. Незабавно кажете на Вашия лекар или отидете в спешното отделение на най-близката болница:

- Стягане в гърдите, хрипове, затруднено преглъщане или дишане
- Подуване на лицето, гърлото, ръцете или ходилата
- Чувство за нервност или тревожност, замаяност, чувство за пулсиране, внезапно зачервяване на кожата и/или чувство за топлина
- Тежък обрив, сърбеж или уртики (повдигнати плаки от червена или бледа кожа, които често сърбят)

Сериозни нежелани реакции

Ако забележите някои от следните признаци, може да се нуждаете от спешна медицинска намеса:

- Сърдечни проблеми като ускорен или неправилен сърдечен ритъм, повишено кръвно налягане
- Проблеми с очите като замъглено виждане, разширени зеници
- Проблеми с нервите като замаяност, усещане за иглички, нарушения на движенията, гърчове или припадъци
- Психиатрични проблеми като свръхактивност и еуфория
- Синдром на спиране на лечението (вж. точка "КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЛАРОКСИН SR, Ако сте спрели приема на Лароксин SR").

Пълен списък на нежеланите реакции

Честотата (вероятността за поява) на нежеланите реакции се класифицира както следва:

Много чести	Повлияват повече от 1 потребител на 10
Чести	Повлияват от 1 до 10 потребители на 100
Нечести	Повлияват от 1 до 10 потребители на 1 000
Редки	Повлияват от 1 до 10 потребители на 10 000
С неизвестна честота	От наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата

Нарушения на кръвта

Нечести: кръвонасядане; смолисто черни изпражнения или кръв в изпражненията, което може да е признак на вътрешен кръвоизлив

С неизвестна честота: намален брой тромбоцити в кръвта Ви, което води до повишен риск от кръвонасядане или кървене; нарушение на кръвта, което може да доведе до повишен риск от инфекции



Нарушения на метаболизма и храненето

Чести: загуба на тегло; повишен холестерол

Нечести: наддаване на тегло

С неизвестна честота: леки промени в кръвните нива на чернодробните ензими; понижени нива на натрия; сърбеж, жълта кожа или пожълтяване на очите, тъмна урина или грипоподобни симптоми, които са симптоми на възпаление на черния дроб (хепатит); обърканост, прекомерен прием на вода; патологично отделяне на кърма.

Нарушения на нервната система

Много чести: сухота в устата; главоболие.

Чести: патологични сънища; понижено либидо; замаяност; повишен мускулен тонус; безсъние; нервност; иглички и тръпки; сънливост; тремор; обърканост; чувство за изолираност (или отделеност) от самия себе си и действителността.

Нечести: загуба на чувства или емоции; халюцинации; неволеви движения на мускулите; възбуденост; нарушени координация и равновесие.

Редки: чувство за безпокойство или невъзможност да се стои спокойно в седнало или изправено положение; гърчове или припадъци; чувство за свръхвъзбуденост или еуфория.

С неизвестна честота: висока температура с ригидни мускули, обърканост или ажитираност и потене, или ако почувствате внезапни мускулни движения, които не можете да контролирате, това може да са симптоми на сериозни състояния, известни като злокачествен невролептичен синдром; еуфорични чувства, сънливост, постоянни бързи движения на очите, трема, неспокойство, чувство като че ли сте пияни, потене или напрегнати мускули, които са симптоми на серотонинергичен синдром; дезориентираност и обърканост, съпроводени често от халюцинация (делир); скованост, спазми и неволеви движения на мускулите; мисли за самонараняване или самоубийство.

Нарушения на зрението и слуха

Чести: замъглено виждане.

Нечести: променени вкусови усещания; шум в ушите.

С неизвестна честота: болки в очите и повишено вътреочно налягане.

Нарушения на сърцето или кръвообращението

Чести: повишено кръвно налягане; зачервяване; сърцебиене.

Нечести: чувство за замаяност (особено когато се изправяте прекалено бързо), припадъци, ускорена сърдечна дейност.

С неизвестна честота: понижено кръвно налягане; абнормна, ускорена или неравномерна сърдечна дейност, която може да доведе до припадане.

Нарушения на дишането

Чести: прозяване.

С неизвестна честота: кашлица, хрипове, задух и висока температура, които са симптоми на възпаление на белите дробове, свързано с повишение на белите кръвни клетки (белодробна еозинофилия).

Стомашно-чревни нарушения

Много чести: гадене.

Чести: намален апетит; запек; повръщане.

Нечести: скърцане със зъби; диария.

С неизвестна честота: тежки болки в корема или гърба (които биха могли да показват сериозен проблем в червата, черния дроб или панкреаса).



Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много често: потене (включително нощно изпотяване).

Нечесто: обрив; патологична загуба на коса.

С неизвестна честота: кожен обрив, който може да доведе до тежко изприщване и белене на кожата; сърбеж; лек обрив.

Нарушения на мускулно-скелетната система

С неизвестна честота: необяснима мускулна болка, чувствителност или слабост (рабдомиолиза).

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Често: затруднено отделяне на урина; повишена честота на уриниране.

Нечесто: невъзможност да се отдели урина.

Нарушения на възпроизводителната система

Често: патологична еякулация/оргазъм (мъже); липса на оргазъм; еректилна дисфункция (импотентност); нередовна менструация като засилено кървене или засилено нередовно кървене.

Нечесто: абнормен оргазъм (жени).

Общи нарушения

Често: слабост (астения); студени тръпки.

Нечесто: чувствителност към слънчева светлина.

С неизвестна честота: подуто лице или език, задух или затруднено дишане често с обриви (това може да е сериозна алергична реакция).

Лароксин SR понякога причинява нежелани реакции, които може да не усетите като повишение на кръвното налягане или абнормен сърдечен ритъм; леки промени в кръвните нива или чернодробните ензими, натрия или холестерола. По-рядко Лароксин SR може да понижи функцията на тромбоцитите в кръвта Ви, което води до повишен риск от кръвонасядане или кървене. Затова Вашият лекар може от време на време да желае да извършва кръвни изследвания, особено ако сте приемали Лароксин SR дълго време.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЛАРОКСИН SR

Съхранявайте на места, недостъпни за деца.

Не използвайте Лароксин SR след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката. Датата на изтичане срока на годност се отнася до последния ден от месеца.

Не са необходими специални условия за съхранение на това лекарство.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в отпадните води или в битовите отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не са Ви необходими. Тези мерки ще Ви помогнат да опазите околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Лароксин SR:

Активното вещество е: Венлафаксин

Капсули 37.5 mg:

Всяка капсула съдържа венлафаксин хидрохлорид еквивалентен на 37.5 mg венлафаксин.

Помощните вещества са:



Съдържание на капсулата:

Захарни сфери (съдържа захароза)
Хидроксипропилцелулоза
Хипромелоза
Талк
Етилцелулоза
Дибутилсебакат
Олеинова киселина
Силициев диоксид, колоиден безводен

Капсулна обвивка:

Желатин
Натриев лаурилсулфат
Оцветители:
Червен (E124)
Хинолоново жълто (E104)
Титанов диоксид (E171)

Капсули 75 mg:

Всяка капсула съдържа венлафаксин хидрохлорид еквивалентен на 75 mg венлафаксин.

Помощните вещества са:

Съдържание на капсулата:

Захарни сфери (съдържа захароза)
Хидроксипропилцелулоза
Хипромелоза
Талк
Етилцелулоза
Дибутилсебакат
Олеинова киселина
Силициев диоксид, колоиден безводен

Капсулна обвивка:

Желатин
Натриев лаурилсулфат
Оцветители:
Жълт (E110)
Хинолоново жълто (E104)
Титанов диоксид (E171)

Капсули 150 mg:

Всяка капсула съдържа венлафаксин хидрохлорид еквивалентен на 150 mg венлафаксин.

Помощните вещества са:

Съдържание на капсулата:

Захарни сфери (съдържа захароза)
Хидроксипропилцелулоза
Хипромелоза
Талк
Етилцелулоза
Дибутилсебакат
Олеинова киселина
Силициев диоксид, колоиден безводен



Капсулна обвивка:

Желатин
Натриев лаурилсулфат
Оцветители:
Жълт (E110)
Хинолоново жълто (E104)
Син (E131)
Титанов диоксид (E171)

Как изглежда Лароксин SR и съдържание на опаковката:

Лароксин SR 37.5 mg твърди капсули с удължено освобождаване:

Бели до почти бели гранули в капсула размер "3" с прозрачно тяло и оранжево капаче.

Лароксин SR 75 mg твърди капсули с удължено освобождаване:

Бели до почти бели гранули в капсула размер "1" с прозрачно тяло и жълто капаче.

Лароксин SR 150 mg твърди капсули с удължено освобождаване:

Бели до почти бели гранули в капсула размер "0" с прозрачно тяло и бежово капаче.

Капсулите с удължено освобождаване се предлагат в опаковки по 20, 28, 30, 50, 98 и 100 капсули с удължено освобождаване, в блистери от PVC/алуминиево фолио. Предлагат се и в банки от HDPE, които съдържат 50 и 100 твърди капсули с удължено освобождаване.

20, 28, 30, 50, 98 и 100 капсули в блистери от (PVC/ алуминиево фолио).
50 и 100 капсули в банки от HDPE, с винтова капачка от HDPE и сушител.

Не всички видове опаковки могат да се намерят на пазара.

Притежател на разрешението за употреба:

Actavis Group PTC ehf
Reykjavíkurvegur 76-78
220 Hafnarfjörður
Исландия

Производители:

FARMA-APS Produtos Farmacêuticos, SA

Rua Joao de Deus, nº 19, Venda Nova

2700-487 Amadora

Португалия

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstrasse 1

84529 Tittmoning

Германия

Actavis Nordic A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

Дания

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните членки на ЕС със следните имена:



Австрия:	Venlafaxin Actavis 75 mg Retardkapseln Venlafaxin Actavis 150 mg Retardkapseln
Чехия:	Venlafaxin SR Actavis 37,5 mg Venlafaxin SR Actavis 75 mg Venlafaxin SR Actavis 150 mg
Германия:	Venlafaxin-Actavis 37,5 mg Retardkapseln Venlafaxin-Actavis 75 mg Retardkapseln Venlafaxin-Actavis 150mg Retardkapseln
Дания:	Venlafaxin Actavis
Естония:	Venlafaxin Actavis
Испания:	VENLAFAXINA ACTAVIS 75 mg cápsulas de liberación retardada VENLAFAXINA ACTAVIS 150 mg cápsulas de liberación retardada
Франция:	Venlafaxin Actavis LP, gélule à libération prolongée
Финландия:	Venlafaxin Actavis
Унгария:	Xalopin
Исландия:	Venlafaxin Actavis
Италия:	Venlafaxina Actavis PTC 75 mg compresse a rilascio prolungato Venlafaxina Actavis PTC 150 mg compresse a rilascio prolungato
Литва:	Venlafaxin Actavis 37.5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės Venlafaxin Actavis 75 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės Venlafaxin Actavis 150 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės
Латвия:	Venlafaxin Actavis
Малта:	Efevelon XL
Норвегия:	Venlafaxin Actavis depotkapsel
Полша:	Efevelon SR
Португалия:	Venlafaxina Actavis
Румъния:	Venlafaxin Actavis 37,5 mg capsule cu eliberare prelungita Venlafaxin Actavis 75 mg capsule cu eliberare prelungita Venlafaxin Actavis 150 mg capsule cu eliberare prelungita
Швеция:	Venlafaxin Actavis
Словения:	Velahibin
Словакия:	Venlafaxin Actavis 37,5 mg Venlafaxin Actavis 75 mg Venlafaxin Actavis 150 mg
Великобритания:	Venlafaxin XL 37.5 mg prolonged-release capsules Venlafaxin XL 75 mg prolonged-release capsules Venlafaxin XL 150 mg prolonged-release capsules

Дата на последно одобрение на листовката: Февруари 2009 г.

