

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение
Към РУ №: И-4983, 25.05.09
Одобрено: 35/14.07.09

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**  
**BIOLIN 100 mg tablets**  
**БИОЛИН 100 mg таблетки**  
(nimesulide)

*Уважаеми пациенти,*

*Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в листовката, моля уведомете Вашия лекар.*

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?**

Всяка таблетка BIOLIN съдържа като лекарствено вещество 100 mg nimesulide, както и следните помощни вещества: лактоза монохидрат, царевично нишесте, микрокристална целулоза, колоидален безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат и хипромелоза.

**BIOLIN** се използва за:

- лечение на остра болка;
- симптоматично лечение на болезнени остеоартрити;
- първична дисменорея.

**2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ BIOLIN**

**Не приемайте този лекарствен продукт при следните случаи:**

- пациенти със свръхчувствителност към нимезулид или някое от помощните вещества;
- анамнеза за реакции на свръхчувствителност (bronхоспазм, ринити, уртикария) към ацетилсалицилова киселина или други нестероидни противовъзпалителни средства;
- анамнеза за чернодробно увреждане след прием на нимезулид;
- активна стомашна или дуоденална язва, анамнеза за повтарящи се улцерации или гастроинтестинално кървене;
- мозъчносъдово кървене, друго активно кървене или заболявания на кръвотворенето, тежки заболявания свързани с нарушено кръвосъсирване;
- тежка сърдечна недостатъчност;
- тежка бъбречна недостатъчност;
- чернодробна недостатъчност;
- деца под 12 годишна възраст;
- трети триместър на бременността и кърмене.

**ПРИ СЪМНЕНИЕ ВИНАГИ ПИТАЙТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА СЪВЕТ!**

**Обърнете специално внимание при лечението с BIOLIN**

BIOLIN трябва да се използва с особено внимание при болни с чернодробни, сърдечно-съдови, стомашно-чревни или бъбречни заболявания, при заболявания на кръвосъсирването и болни с високо кръвно налягане.

Използването на Биолин може да потисне фертилитета при жени и не се препоръчва при жени, които правят опит да забременеят. При жени с проблемно забременяване или такива, подлежащи на изследвания във връзка с безплодие се препоръчва да се спре приемът на Биолин.



Лечението с BIOLIN трябва веднага да се спре:

- при пациенти с промени в чернодробната функция (намален апетит, гадене, повръщане, жълтеница, повишени нива на чернодробните трансминази, билирубин, алкална фосфатаза и гама-ГТП). В тези случаи да не се използва повече;
- при поява на зрителни нарушения.

#### Приложение при деца

За повече информация се обърнете към Вашия лекар.

#### **Употреба на други лекарства**

*За да се избегнат възможни взаимодействия между няколко медицински продукта, винаги информирайте вашия лекар или фармацевт, когато приемате и други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.*

При едновременно приложение със салицилова киселина, валпроена киселина, варфарин, литий, толбутамид е възможно засилване токсичността на Nimesulide. Biolin може да засили токсичността на метотрексат, циклоспорин и салицилова киселина. Biolin намалява диуретичния ефект на фуросемид. Ефикасността на теофилин намалява при едновременно приложение с Biolin. Рискът от кървене от стомашно-чревния тракт се повишава при комбинация с калциеви блокери. Biolin намалява диуретичните и антихипертензивните ефекти на бримковите, калий-съхраняващите и тиазидните диуретици и на ACE инхибиторите. Biolin не трябва да се приема едновременно с други лекарства, увреждащи черния дроб.

#### **Прием с храни и напитки**

BIOLIN не трябва да се приема едновременно с алкохол.

#### **Бременност и кърмене**

##### Бременност

*Ако сте бременна, консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете това лекарство.*

Не се препоръчва употребата на BIOLIN по време на бременност.

##### Кърмене

Не се знае дали BIOLIN се екскретира с майчиното мляко. Не се препоръчва приемането на BIOLIN по време на кърмене поради липса на клинични данни.

#### **Шофиране и работа с машини**

Няма изследвания върху ефектите на BIOLIN върху способността за шофиране или работа с машини. Пациентите, които изпитват замаяност, отпуснатост или сънливост, след прием на лекарството не трябва да шофират и работят с машини.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ BIOLIN**

Таблетката BIOLIN се изпива с чаша вода.

BIOLIN трябва да се използва за възможно най-кратък период, според указанията на лекаря.

#### *Възрастни и деца над 12 годишна възраст:*

по 1 таблетка от 100 mg 2 пъти дневно, след хранене, с чаша вода.

#### *Гериатрични пациенти:*

при гериатрични пациенти не се налага намаляване на дозата.

#### *Пациенти с бъбречна недостатъчност*

При пациенти със слабо до средно изразена бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс от 30 до 80 ml/min) не се налага коригиране на дозата. BIOLIN е противопоказан при тежка бъбречна недостатъчност.



#### *Чернодробна недостатъчност*

BIOLIN е противопоказан при чернодробна недостатъчност.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза BIOLIN**

Свържете се незабавно с лекар, ако сте приели повече от необходимата доза BIOLIN !

#### **Ако сте пропуснали да приемете BIOLIN**

Трябва да вземате BIOLIN както Ви е предписан. В случай, че пропуснете една доза не вземайте допълнителни таблетки, а продължете приема по обичайната схема.

#### **Ако сте спрели приема на BIOLIN**

Внезапното спиране на BIOLIN не би трябвало да се свърза с рязко увеличаване на кръвното налягане.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Обикновено BIOLIN се понася добре и не води до възникване на нежелани реакции при повечето пациенти. При евентуална поява те обикновено са леки и бързо преходни и не изискват прекратяване на приема на лекарството.

Към BIOLIN са описани следните нежелани ефекти:

често - диария, гадене и повръщане; повишаване нивата на чернодробните ензими;  
не често - замаяност; хипертония; задух; констипация, газове, гастрити; сърбеж, обрив;  
повишено изпотяване; оток;

рядко - анемия, еозинофилия; свръхчувствителност; повишени нива на калий в кръвта;  
тревожност, нервност, нощни кошмари; замъглено виждане; учестен пулс; хеморагии;  
промяна в кръвното налягане; топли вълни; еритема, дерматити; болка при уриниране, кръв в урината, задръжка на урина; общо неразположение, отпуснатост.

**НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА ПИТАТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА СЪВЕТ.  
ИНФОРМИРАЙТЕ ГИ ЗА ВСЕКИ НЕЖЕЛАН ИЛИ НЕПРИЯТЕН ЕФЕКТ, КОЙТО СТЕ  
ЗАБЕЛЯЗАЛИ И НЕ Е ОТБЕЛЯЗАН В ТАЗИ ЛИСТОВКА.**

#### **5. СЪХРАНЕНИЕ НА BIOLIN**

Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25<sup>0</sup>С. Да се съхранява на място, далеч от погледа и достъпа на деца.

Не използвайте BIOLIN след срока на годност и ако забележите нарушаване целостта или промяна в цвета на таблетките.

#### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Как изглежда и какво съдържа опаковката BIOLIN**

2 или 3 блистера PVC/алуминиево фолио с по 10 таблетки в картонени кутии.

**Производител и притежател на разрешението за употреба:**

ИНБИОТЕХ ООД, София 1000, ул Триадица 5А, тел.: 987 9537; факс: 988 0457  
e-mail: [biopharm@mbox.infotel.bg](mailto:biopharm@mbox.infotel.bg)

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последна редакция на листовката: 10.02.07 г.

