



листовка за пациента

Уважаеми пациенти,

- Моля прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете да употребявате този лекарствен продукт.
- Запазете тази листовка, може да Ви се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично за Вас и не трябва да го преотстъпвате на други пациенти. То може да им навреди, дори и да имат същите симптоми като вашите.

**®OFTALAR eye drops, solution**  
**(ОФТАЛАР капки за очи, разтвор)**

**Pranoprofen 0.1% (1mg/ml)**

**Състав:**

**OFTALAR (ОФТАЛАР)** капки за очи, разтвор съдържа като лекарствено вещество *pranoprofen* (пранопрофен) 0.1% (1 mg/ml).

И следните помощни вещества: бензалкониев хлорид, борна киселина, полисорбат 80, натриев тетраборат, натриев едетат и пречистена вода.

**Притежател на разрешението за употреба и производител:**

ALCON CUSI, S.A.

Camil Fabra, 58

08320 El Masnou - Barcelona, Spain

**Свойства:**

OFTALAR съдържа лекарственото вещество пранопрофен, което има болкоуспокояващ ефект и противовъзпалително действие. OFTALAR е представител на група лекарствени продукти, наречени нестероидни противовъзпалителни средства.

**Показания (за какво се използва):**

OFTALAR е предназначен за лечение на остри и хронични неинфекциозни, възпалителни заболявания на предния очен сегмент (блефарити, конюнктивити, блефароконюнктивити, предни увеити). Постоперативно, след хирургични интервенции на предния очен сегмент, след екстракция на катаракта, с или без имплантация на вътреочна леща.

**Противопоказания (кога НЕ трябва да се използва):**

Не използвайте OFTALAR ако имате установена свръхчувствителност към пранопрофен или някое от помощните вещества на лекарствения продукт.

**Специални предупреждения и предпазни мерки:**

**Важна информация за помощните вещества в OFTALAR:**

- Ако носите меки контактни лещи, не използвайте капките докато лещите са в очите. Изчакайте 15 минути след накапването, преди да поставите лещите обратно в очите. Консервантът, който съдържа OFTALAR, бензалкониев хлорид, може да обезцвети вашите меки контактни лещи.



- OFTALAR съдържа и *борна киселина* - противопоказана при бебета и деца под 3 години.

#### **Употреба на други лекарствени продукти**

Независимо, че не са описани случаи на взаимодействия с други лекарствени продукти, моля, уведомете Вашия лекуващ лекар или фармацевт ако вземате/ или доскоро сте вземали/ някакви други лекарствени продукти. Не забравяйте също така да споменете и тези без рецепта.

#### **Бременност и кърмене:**

В периодите на бременност и кърмене OFTALAR трябва да се прилага само тогава, когато очакваният ефект оправдава риска за плода.

#### **Шофиране и работа с машини:**

Възможно е непосредствено след поставянето на OFTALAR да установите, че зрението ви е краткотрайно замъглено. Вие трябва да изчакате докато зрението ви се проясни и едва тогава да шофирате или да работите с машини.

#### **Приложение и дозировка:**

**Винаги използвайте OFTALAR, така както ви е предписал лекуващия лекар.** Препоръчаната дозировка е по две капки в засегнатото око/очи - четири пъти на ден (на всеки 6 часа).

**Използвайте OFTALAR само като капки за очи!**

#### **Указания за правилна употреба:**

- Наклонете главата назад, издърпайте долния клепач надолу и погледнете нагоре.
- Капнете капка в конюнктивния сак (мястото между клепача и окото).
- Затворете очите за няколко секунди.

**Ако капката не попадне в окото – опитайте отново.**

**Ако пропуснете една доза OFTALAR, поставете я колкото е възможно по-скоро (когато се сетите).** Ако вече е дошло време за следващата доза, прескочете пропуснатата доза и се върнете към Вашата обичайна схема на дозировка. **Не накапвайте двойно количество, за да възстановите пропуснатото.**

**Ако поставите в окото по-голямо количество OFTALAR отколкото е необходимо, изплакнете с топла вода.**

Изчакайте поне 5 минути, ако трябва да поставите друг лекарствен продукт за очно приложение.

#### **Възможни нежелани лекарствени реакции:**

Както всички лекарствени продукти, така и OFTALAR може да причини нежелани лекарствени реакции.

Много рядко са наблюдавани случаи на зачервяване на очите, сърбеж и дразнене. Ако забележите някаква друга нежелана лекарствена реакция, различна от вече описаните, консултирайте се с лекар или фармацевт.



**Съхранение:**

- Лекарственият продукт не трябва да се използва едновременно от няколко пациенти.
- Приложението трябва да се извършва при максимално хигиенни условия, като се внимава върха на шишенцето да не докосва клепача, за да не се замърси съдържанието му.
- Шишенцето трябва да се затваря добре след всяко приложение.
- Опаковката трябва да се изхвърли след приключване на курса на лечение.
- Капките трябва да се съхраняват на сигурно място – недостъпно за деца.
- Да не се съхранява при температура над 25 °С. На защитено от светлина място.
- Не използвайте капките след изтичането на срока на годност, отбелязан върху шишенцето и картонената кутия (Годен до:).

**Лекарствена форма и опаковка:**

OFTALAR е капки за очи, разтвор и се доставя в пластмасови шишенца от 5 ml (тип DROP-TAINER®) с капачка на винт.

**Ако имате допълнителни въпроси, свързани с OFTALAR(ОФТАЛАР), обърнете се към вашия лекар или фармацевт.**

*За повече информация: ALCON – представителство за България  
ул. "Д.Манов"10, София 1408  
Тел. 950 15 65; 950 15 66*

*Лекарственият продукт е разрешен за употреба в България – Рег. № 9900295*

*Тази листовка е одобрена през Юни, 2004.*

