

**ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА****ПИРАНТЕЛ  
PYRANTEL****СЪСТАВ**

Активна вещества : Пирантел памоат - 720 мг е еквивалентен на Пирантел - 250 мг .

Помощни вещества: Сорбитол, Манитол, Повидон К 25, Винена киселина, Магнезиев стеарат, МакроГол 6000, Натурална лимонова есенция, Сух оранжев тетрагол.

**ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА**

Таблетки за дъвчене 250 мг по 3 броя в опаковка.

**ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Балканфарма-Дупница АД,  
гр. Дупница, 3, Самоковско шосе, п.к.2600

Тел. (0701) 2-42-81/2-90-21/29

Факс: (0701) 2-42-81/82; 2-81-62

**НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ**

Пирантел е противоглисто /антихелминтно/ средство, което се употребява при заразяване с остици и кръгли глисти. Предизвиква парализа на глистите, в резултат на което те се изхвърлят с изпражненията от червата.

**ПОКАЗАНИЯ**

**Приема се само по лекарско предписание!**

За лечение на самостоятелни или смесени форми на заразяване с остици и кръгли глисти, включително и при деца над 2 годишна възраст.

**ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНОТО СРЕДСТВО****ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Не се прилага при свърхчувствителност към препарата или към пиразинови производни.

**СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА**

**Препараторът се прилага само под лекарски контрол!**

Не се изисква специален диетичен режим по време на лечението с пирантел.

Едновременно трябва да се лекуват всички членове на семейството или целия колектив (в детските заведения) като терапията се повтаря след 2-3 седмици. Спалното бельо не трябва да се изтърсва, а да се изварява.

При наличието на анемия да се приемат железни препарати.

Пирантел трябва да се използва внимателно при пациенти с нарушена чернодробна функция и повишени стойности на чернодробните ензими

#### **ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАЙМОДЕЙСТВИЯ:**

**Предупредете Вашия лекар, ако приемате други медикаменти!**

Пиперазин намалява противоглистния /антихелминтния/ ефект на Piрантел, затова не се прилагат едновременно.

#### **СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ**

При липса на алтернатива може да се приема по време на бременност (с изключение на първите 3 месеца).

При належаща за майката употреба, кърменето трябва да се спре.

#### **ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРНЕ И РАБОТА С МАШИНИ**

Няма данни за неблагоприятно повлияване на способността за шофиране и работа с машини.

#### **ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНОТО СРЕДСТВО**

#### **ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА**

**Прилага се по лекарско предписание!**

Приема се през устата, еднократно по 10 мг/кг тегло. Схемата на дозиране, която е в зависимост от възрастта и теглото, е следната:

Възраст на пациента	Тегло	Таблетки по 250 мг
От 2 до 6 год	10 – 22 кг	1 табл.
От 6 до 12 год	22 – 41 кг	2 табл.
Над 12 год	До 85 кг	3 табл.
Възрастни	Над 85 кг	4 табл.

При аскаридоза е достатъчна доза от 5 мг/кг тегло. При тежки заразявания дозите могат да се увеличат – приема се по 10 мг/кг тегло 3 пъти (3 последователни дни) или по 20 мг/кг тегло (2 последователни дни).

## **ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО**

Продължителността на лечението се определя от лекар, обичайната доза е 5-10 мг/kg, приета еднократно през устата.

## **НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ**

Високите дози от препарата предизвикват засилване на нежеланите лекарствени реакции.

Обърнете се към лекар! Лечението е симптоматично, с мерки за отстраняване на поетите количества лекарство от стомашно-чревния тракт.

## **НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОПУСКАНЕ НА ДОЗА**

При пропускане на доза (при много тежки заразявания) да се приеме следващата, с оглед поддържане на постоянно количество на лекарството в кръвта .Ако следващият прием е близо, може да се изчака, за да не се наруши установената ритмичност.

## **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

Уведомете лекуващия лекар при поява на нови оплаквания, независимо дали са описани в листовката!

По време на лечението може да се появят: липса на апетит, гадене, повръщане, диария, стомашни болки и крампи.

Възможна е и поява на главоболие, световъртеж, отпадналост, безсъние, обриви.

Може да се засегне черния дроб (промени в чернодробните преби)

По преценка на лекаря лечението може да се прекрати.

## **СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място, при температура под 25 С°

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, указан на опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

## **СРОК НА ГОДНОСТ**

4 /четири/ години от датата на производство.

## **ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА**

Март 2001 год.