

Информационна листовка за пациента

Актовегин 20% гел
Actovegin 20% gel

Притежател на разрешението за употреба и производител

Nucomed Austria GmbH,
St. Peter Strasse 25, 4020 Linz
Австрия

Състав

1 g съдържа:

Депротеинизиран хемодериват от телешка кръв
отговарящ на суха маса 8 mg.

Свойства и ефективност

Актовегин е свободен от протеини екстракт от телешка кръв. Той подобрява използването на кислорода и подпомага приемането на хранителните вещества от клетката.

Така, процесите с високи енергийни потребности, като заздравяване на рани, се ускоряват.

Показания

Рани и възпаления на кожата и лигавиците като слънчево изгаряне малки кожни дефекти/лезии (напр. изрязани на кожни участъци), охлузвания, изгаряния.

За подпомагане на тъканното възстановяване след изгаряне и попарване.

За профилактика и лечение на радиационни реакции на кожата и лигавиците.

За начално лечение на рани със замърсена повърхност.

Лечение на раневи повърхности при трансплантации.

Начин на приложение и дозиране

Гелът се нанася в тънък слой върху засегнатият участък.

За начално лечение на язви се нанася плътен слой гел. Слойт гел може да се покрие с тънък компрес съдържащ Актовегин маз или с неадхезивна марля за да се избегне залепването с раната.

Превръзката трябва да се сменя един път дневно, при силно секретирани рани няколко пъти дневно.

Лечението се продължава с Актовегин крем 5%, а се завършва с Актовегин маз 5%

Противопоказания



Лекарството не трябва да се прилага при случаи на известна алергия към неговите съставки.

Нежелани лекарствени реакции

Пациенти склонни към свръхчувствителност могат да развият алергични реакции в редки случаи.

В началото на лечението с Актовегин 20% гел рядко може да се наблюдава болка дължаща се на повишената секреция. Това не е признак за невъзприемчивост.

Лекарствени взаимодействия

Няма известни до момента

Специални предупреждения

Ако оплакванията продължават или не е получен очакваният успех от прилагането на лекарството, незабавно се консултирайте с лекар.

Обърнете внимание на датата на срока на годност.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Опаковка

20 g

Условия за съхранение

Да се съхранява при температура под 25°C.

Ако имате някакви въпроси консултирайте се с лекар или фармацевт.

Дата на последна редакция на текста

12.2003 година

