

ИАЛ  
ОДОБРЕН  
ДАТА 08.08.05.

**Прочетете листовката преди да започнете да вземате това лекарство!**

Запазете тази листовка. По-късно може да се наложи да я прочетете отново.

Ако не разбираете нещо, консултирайте се с лекуващия си лекар или фармацевт.

Това лекарство ви е предписано лично на вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди дори и ако симптомите им са подобни на вашите.

**1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

**PREDOZONE 20 mg coated tablets**

**ПРЕДОЗОН 20 mg обвити таблетки**

**2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ**

Всяка таблетка съдържа: trimetazidine dihydrochloride, 20 mg.

Помощни вещества:

**Сърцевина:** микрокристална целулоза (Avicel pH 102), предварително желатинизирано царевично нишесте, манитол, повидон, глицерол, магнезиев стеарат.

**Обвивка:** Eudragit E 100, талк, титаниев диоксид (E-171), червен железен оксид (E-172), полиетилен гликол 6000.

**3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ОПАКОВКАТА**

ПРЕДОЗОН се произвежда под формата на обвити таблетки в опаковки, съдържащи 60 таблетки.

**4. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА:**

**Ozone Laboratories LTD,**  
180 Tottenham Court Road, Queens House  
W1 T 7PD, London, U.K.

**ПРОИЗВОДИТЕЛ:**

**Laboratorios Belmac, S.A.**  
Polígono Malpica. Calle C 4 – 50016,  
Zaragoza, Spain

**5. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА**

ПРЕДОЗОН принадлежи към групата лекарства, известни като периферни вазодилататори.

**6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

ПРЕДОЗОН се използва в:

• Кардиология:

Продължително лечение на исхемична болест на сърцето: профилактика на ангинозни пристъпи с монотерапия или при комбинирано прилагане с други препарати.

• ОРЛ - заболявания

Лечение на кохлео-вестибуларни проблеми от исхемичен произход, като световъртеж, шум в ушите, хипоакузия.

## **7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

**Кога не трябва да вземате ПРЕДОЗОН:**

При свръхчувствителност към лекарственото вещество или някое от помощните вещества.

**Кога трябва да внимавате с ПРЕДОЗОН:**

Виж раздел: "Бременност и кърмене".

**Бременност и кърмене:**

Консултирайте се с лекуващия си лекар или фармацевта преди да вземете това лекарство!

Трябва да избягвате да вземате ПРЕДОЗОН през периода на бременността.

Продуктът може да използва след като лекарят прецени сътношението полза рисък от лечението с него.

Поради липса на данни за екскреция в кърмата не се препоръчва по време на кърмене.

**Шофиране и работа с машини:**

Лекарството не повлиява тези дейности.

**Списък на помощните вещества, познаването на които е от значение за безопасността и ефективността на продукта**

Това лекарство съдържа глицерол като помощно вещество.

Той може да предизвика главоболие, стомашна болка и диария.

**Взаимодействия с други лекарства:**

Консултирайте се с лекуващия си лекар или фармацевта, ако вземате или наскоро сте вземали други лекарства, включително лекарства без лекарско предписание.

Препоръчва се да се избягва едновременната употреба с лекарства, използвани за лечение на депресия, известни като МАО инхибитори.

## **8. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА УПОТРБА**

**Дозировка**

**ПРЕДОЗОН** се прилага през устата.


Дозата е една таблетка от 20 mg два или три пъти дневно.

**Начин на употреба и път на въвеждане:**

Таблетките трябва да се прогълтнат с малко вода по време на хранене.

Спазвайте тези указания, освен ако лекарят не Ви предпише нещо друго. Не забравяйте да вземате лекарството си.

Вашият лекар ще определи продължителността на лечение с ПРЕДОЗОН. Не прекъсвайте лечението, защото симптомите може да се появят отново.



**Ако вземете свръхдоза ПРЕДОЗОН:**

Няма съобщения за случаи на интоксикация.

Интоксикацията може да се прояви с понижено артериално налягане. В този случай трябва да се приложи симптоматично лечение.

**Ако забравите да вземете ПРЕДОЗОН:**

Вземете дозата колкото е възможно по-рано. Ако остава малко време до следващата доза, изчакайте и я вземете тогава.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената.

**Ефекти, които се появяват при прекъсване на лечението ПРЕДОЗОН:**

Ако прекъснете лечението преди времето, предписано от лекуващия ви лекар, заболяването може да се появи отново.

**9. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ**

Както всички други лекарства, ПРЕДОЗОН може да има нежелани ефекти. Има

няколко съобщения за стомашно-чревни нарушения като гадене и повръщане.

Ако получите някакви други нежелани реакции, които не са описани по-горе, трябва да се консултирате с лекуващия си лекар или фармацевта.

**10. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ**

*Съхранявайте ПРЕДОЗОН на места, където децата не могат да го стигнат и да го видят.*

Съхранявайте го в оригиналната опаковка.

**СРОК НА ГОДНОСТ:**

**2 години**

Не използвайте ПРЕДОЗОН след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката

**ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА**

Юли, 2003

