

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ...10.06.03...

Информационна листовка

Износител: ЩИЕХ ПОЛФА

Reladorm
Реладорм
Таблетки

Състав

Лекарствено вещество Diazepam 0,01 g
 Cyclobarbital 0,10 g

Помощни вещества Картофено нишесте, талк, желатин, лактоза

Свойства и действие

Реладорм е комбинация на циклобарбитал и диазепам. Съкращава времето за заспиване, задълбочава съня и увеличава продължителността му.

Показания

Нарушения на съня:


- безсъние на фона на емоционални нарушения
- трудности при заспиване
- краткотраен, недълбок сън

Противопоказания

- свръхчувствителност към някои от съставките на лекарствения продукт
- нарушения на дишането от централен произход, тежки състояния на дихателна недостатъчност, независимо от причината
- нарушени функции на черния дроб и бъбреците
- порфирия
- глаукома
- чувство на умора, мускулна слабост
- нарушен съзнание и равновесие
- бременност и кърмене
- злоупотреба с алкохол, барбитурати иベンзодиазепини

Нежелани лекарствени реакции

- сънливост през деня, замъглено съзнание
- чувство на умора, мускулна слабост
- нарушена концентрация на вниманието и движенията
- световъртеж, кожни алергични реакции, понижено кръвно налягане
- психическа и физическа зависимост
- запек и сухота в устата



Лекарствени и други взаимодействия

Сънтворни, наркотични обезболяващи, успокоителни, противоепилептични, антихистаминови лекарствени продукти усилват действието на Реладорма.

Реладорм намалява ефективността на кумариновите противосъсирващи средства, противозачатъчните средства, приемани през устата, намаляващите кръвната захар продукти, доксициклина, гризофулвина.

Етиловият алкохол усилва депресивното действие на Реладорм върху ЦНС. При едновременна употреба са възможни психосоматична възбуда, агресивност, състояние на патологично опиянение, симптоми на дълбока депресия на психическите и физиологическите функции на мозъка, включително кома и нарушение на вегетативните функции.

В периода на лечение с Реладорм и три дни след приключването му, да не се приема алкохол.

Дозировка и начин на приложение

Обикновено се предписват по $\frac{1}{2}$ - 1 таблетка час преди лягане.

При болни с бъбречна или чернодробна недостатъчност да се редуцират дозите.

Реладорм може да се употребява в течение само на няколко дни. Продължителната употреба (в течение на седмици) може да предизвика психическа и физическа зависимост.

Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

- Да се прилага само по предписание на лекар.
- Не се препоръчва да се приема от деца и лица на възраст над 65 години.
- В случай на нежелани лекарствени реакции да се уведоми незабавно лекуващия лекар.
- Да не се приема едновременно с продукти, потискащи ЦНС.

Бременност и кърмене

Да не се прилага по време на бременност и кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Реладорм може да предизвика силно нарушение психомоторните и опознавателни функции. Възможни са нарушения на пространствената оценка – дезориентация, забавени реакции. Болният може да реагира недостатъчно бързо и нецелесъобразно. В процеса на лечение и три дни след приключването му да не се управляват превозни средства и да не се обслужват механични устройства в движение.

Срок на годност

3 години

Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25°C .

Да се съхранява на място, защитено от светлина и влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

Опаковка



Двуслойна лента с 10 таблетки, опакована в картонена кутия с всички необходими означения и информационна листовка.

Име и адрес на производителя

Tarchomin Pharmaceutical Works "Polfa" S.A.
2 Fleminga str.,
03-176 Warsaw
Poland

Дата на последна редакция

