



## РОВАХОЛ

### ROWACHOL

**Състав:** Активни вещества: Alpha Pinen 13.6 mg; Beta pinene 3.4 mg; Camphene 5.0 mg; Cineol 2.0 mg, Menthone 6.0 mg; Menthol 32.0 mg; Borneol 5.0 mg;

Помощно вещество: маслиново масло Olive oil 33.0 mg в една мека разтваряща се в червата (ентеросолвентна) желатинова капсула.

Всяка капсула съдържа 0.1 g течен Ровахол.

**Действие:** Ровахол спомага за разграждането на жълчни камъни. Посредством Ровахол се разтварят холестериновите камъни в жълчката и се намалява концентрацията на холестерол в жълчката. Препарата има мощно стимулиращо отделянето на жълчка (холеретично) действие, вследствие на което се увеличава жълчната секреция и се намалява задържането на жълчка (холестазата). В резултат на болкоуспокояващото действие на лекарствения продукт се намаляват болките, дължащи се на спазъм. Отстраняват се съпътстващите нарушения на храносмилането, без необходимост от назначаване на допълнителни лекарствени продукти. Обикновено диетичните ограничения биха могли да се намалят скоро след започване на лечението с Ровахол, като след известно време биха могли напълно да се премахнат.

**Показания :** Заболявания на черния дроб и жълчните пътища, включващи холелитиаза – камъни в жълчката, холецистит – възпаление на жълчния мехур, спазъм на жълчния мехур, дискинезия на жълчните пътища – нарушенa двигателна активност на жълчните пътища, холангит – възпаление на жълчните пътища. Препоръчва се също така при преоперативно и постоперативно лечение на черния дроб и жълчните пътища и с оглед предотвратяване на повторно образуване на камъни.

**Противопоказания :** Свръхчувствителност към активните или някое от помощни вещества.

**Предпазни мерки :** Използването на Ровахол трябва да се започва след като се вземе предвид опасността от усложнения при вече съществуващи камъни в жълчните пътища, като механична жълтеница, възпаление на жълчните пътища, възпаление на задстомашната жлеза и др. Да се пази от деца!

**Лекарствени взаимодействия :** Ровахол не трябва да се използва при пациенти, приемащи противосъсирващи кръвта лекарства през устата или други медикаменти, които се преработват в черния дроб.

Препоръчва се намаляване приема на холестерол.



**Бременност и кърмене :** Въпреки, че не е отбелязан отрицателен ефект по отношение на плода, не трябва да се прилага Ровахол през първите три месеца на бременността. Въпреки отсъствието на данни, не трябва да се прилага при кърмещи майки.

**Нежелани лекарствени реакции:** При малък брой болни са отбелязани прояви на оригване или ментов вкус след хранене, които могат да се намалят или избегнат чрез прием на лекарствения продукт, тридесет минути преди хранене. При незначителен брой болни са отбелязани болезненост и разязяване на лигавицата на устната кухина, която бързо отзуучава след преустановяване на приема на лекарството.

**Начин на приложение и дозировка:** По една капсула 3-4 пъти дневно преди хранене или както е назначено от лекаря.

**Деца:** При деца от 6 до 14 години по една капсула 1-2 пъти дневно преди хранене.

**Срок на годност:** 5 години

**Опаковка :** Флакони, съдържащи по 30 и 50 капсули, метална кутия , съдържаща 100 капсули.

**Съхранение:** Да се съхранява при температура под 25° С. На недостъпно за деца място.

**Производител и притежател на разрешението за употреба:** Rowa-Wagner GmbH&Co KG Германия.

**Последна редакция на текста:** 2003г.

