

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ..22.10.2002..

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
SCABIN
СКАБИН

СЪСТАВ:

Активно вещество:

1 ml дермален разтвор съдържа 285 mg benzyl benzoate

Помощни вещества:

Рициново масло, етанол (96 %)

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

150 ml дермален разтвор в стъклена бутилка в картонена кутия;

150 ml бутилка от полиетилентерефталат в картонена кутия.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Балканфарма Троян АД

5600, Троян Ро Box 82

Тел (0670) 22 607

ДЕЙСТВИЕ

Скабин се използва за лечение на краста и въшливост. Нанесен върху кожата лекарственият продукт унищожава въшките и акарите (причинителите на крастата), като атакува нервната система на паразитите.

ПОКАЗАНИЯ

Продуктът се прилага за лечение на краста и въшливост.

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Противопоказания

Скабин е противопоказан при свръхчувствителност към продукта и някое от помощните вещества.

Продуктът да не се прилага при наличие на наранявания и разяззвания по кожата и скалпа.

Специални предпазни мерки при употреба

При употребата на продукта трябва да се внимава последният да не попада в очите и лигавиците.

Скабин има дразнещо действие върху мукоза и разязвена кожна повърхност.

Лекарствени и други взаимодействия

Скабин не се прилага заедно или след кортикоидни мази.

Приложение при бременни и в периода на кърмене

Няма данни за увреждащи плода ефекти, при хора, причинени от Скабин. Въпреки това прилагането на продукта по време на бременност трябва да се назначава от лекар, при оценка съотношението полза/рисък.

Няма данни за преминаването на Скабин в кърмата, но не се препоръчва употребата му в периода на кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни за неблагоприятно повлияване на активното внимание, рефлексите и двигателната активност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

Дозировка и начин на приложение

Продуктът се прилага върху кожата и косата.

За лечение на краста:

Възрастни: Еднократно.

Деца над 2 години: еднократно, като Скабин се разрежда с вода в съотношение 1:1. Продуктът се нанася по кожата на цялото тяло непосредствено след изкъпване и подсушаване (започва се от врата, вкл и петите на краката). След 24 часа продуктът се измива.

За лечение на педикулоза:

Възрастни: еднократно.

Деца над 2 години: еднократно, като Скабин се разрежда с вода в съотношение 1:1. Продуктът се прилага на измита и изсушена коса в количество, необходимо да намокри напълно косата и скалпа. След 24 часа косата се измива и изсушава, след което се разресва с фин гребен с цел да се отстраният останали гниди.

При тежки случаи цялата процедура на лечението може да се повтори след 24 часа.

Поведение при предозиране

Изключително рядко при нанасяне на продукта на обширна площ по цялото тяло са описани, силно зачервяване на кожата, појва на були, разяззвания, системни алергични нежелани реакции. Лечението включва отмиване на продукта и прилагането на симптоматични средства.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Рядко се наблюдават алергичен дерматит, зачервяване и леко парене по кожата в момента на нанасянето, както и обрив и дразнене на кожата особено при деца.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25° C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ

2(две) години от датата на производство.

Период на ползване след отваряне – 30 дни.

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ
Юли 2002 г.