

Информация за пациента

SYMPATHYL

СИМПАТИЛ

Обвити таблетки

**Състав:**

Eschscholtzi extractum siccum 20.00 mg - екстракт от калифорнийски мак  
Crataegi folii cum flore extractum siccum 75.00 mg – екстракт от цветчета на глог  
Magnesium oxide 124.35 mg Equivalent to 75 mg elemental magnesium, i.e. 6.2 mEq.

**Помощни вещества:** микрокристална целулоза, натриева карбоксиметилцелулоза, микроенизирана стеаринова киселина, гумен лак, поливинилпиролidon, ацетилирани моноглицериди, алкохол, хидроксипропилметилцелулоза, титанов диоксид (E171), PEG 6000, индигокармин(E132), азорубин(E122), жълт железен оксид(E172), талк в следи, общо до 375 mg обвитата таблетка. Кутия с 40 таблетки.

**Фармако-терапевтична категория:** Фитотерапия и минерални елементи с успокоително действие.

**Кога трябва да се използва това лекарство?**

- За симптоматично лечение на повишена нервна възбуда при възрастни
- При леки нарушения на съня
- При нарушения, дължащи се на повишена сърдечна възбудимост при възрастни със здраво сърце

**Предупреждение! Кога не трябва да се използва това лекарство? Това лекарство не трябва да се използва в случаи на алергия към някоя от съставките му, тежка бъбречна недостатъчност(нарушения на бъбречната функция). Това лекарство не бива да използва с квинидино-подобни лекарства, освен ако не е изрично предписано от лекар.**

**АКО ИМАТЕ СЪМНЕНИЯ, СПОДЕЛЕТЕ ГИ С ВАШИЯТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.**

**Лекарствени и други взаимодействия:** ако вече имате предписано лечение на сърдечния ритъм(квинидиноподобни лекарства) не трябва да използвате това лекарство. **ВИНАГИ ИНФОРМИРАЙТЕ ВАШИЯТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ, АКО ПРОВЕЖДАТЕ ЕДНОВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.**

**Бременност и кърмене:** Не трябва да се използва това лекарство по време на бременност и кърмене. Ако забременеете по време на лечение с това лекарство, посъветвайте се с лекар, преди да продължите употребата му.

Съветвайте се с Вашия лекар или фармацевт при всички случаи на приемане на лекарства по време на бременност и кърмене.

**Списък на помощните вещества за безопасна употреба:азорубин(E122).**

**Как да дозираме това лекарство?** Дозата е само за възрастни: 2 таблетки сутрин и 2 таблетки вечер, приемани преди храна с чаша вода.

**Продължителност на лечението:**

Да не се използват продължително време без медицински съвет.

Нежелани лекарствени реакции: Посъветвайте се с лекар за всяко нежелано и безпокоящо Ви действие, което свързвате с употребата на този и други продукти.Рядко смущения в храносмилателния тракт, коремни болки или диария.

**Съхранение:** Да се съхраняват при температура до 25 °C. Да се пазят на места недостъпни за деца. Да не се използват след срока на годност обозначен на опаковката.

**Притежател на разрешението за употреба:**

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL 7/9, Avenue Francois Vincent Raspail  
94110 Arcueil

Производител: INNOTHERA CHOUZY, L'Isle Vert



**Производител: INNOTHERA CHOUZY, L'Isle Vert**  
41 150 Chouzy-sur- Cisse – France

**Дата на последната редакция на листовката: Май 1999**

