



# NOBEL Pharma

73 Persenk Str., 1164 Sofia, Bulgaria  
tel: (+359 2) 862 54 35, 862 54 36  
fax: (+359 2) 862 54 62  
[www.nobel.com.tr](http://www.nobel.com.tr)

ИАЛ  
ОДОБРЕННОЈ  
ДАТА ...../3. 09. 05г.

## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като в нея се съдържа важна за Вас информация. Ако искате да научите повече за този продукт или част от информацията в листовката не Ви е ясна, моля консултирайте се с Вашия лекар.

### Tylol® Hot Pediatric / Тайлол® Хот за деца

#### СЪСТАВ:

Всяко саше Tylol® Hot Pediatric съдържа: Paracetamol 250 mg, Chlorpheniramine maleate 2 mg, Pseudoephedrine HCl 30 mg.

Помощни вещества: лимонена киселина, винена киселина, натриев бикарбонат, натриев карбонат (безводен), PVP K 30, рафинирана захар, натриев бензоат, прах с аромат на портокал, и алкохол (96%).

Оцветител: E 104; E110

#### ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Tylol® Hot Pediatric може да намерите в опаковка по 12 сашета прах за перорална употреба

#### ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

NOBEL ILAC SANAYII ve TICARET A.S.  
Barbaros Bulvari 76-78  
34353 Besiktas, ISTANBUL, Turkey

#### ПРОИЗВОДИТЕЛ

PLANTAPHARMA ILAC SANAYII ve TICARET A.S.  
Sancaklar Koyu 81100 / Duzce, Turkey

#### ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ

Tylol® Hot Pediatric има аналгетично, антипиретично, антихистаминово и намаляващо отока на лигавицата на горните дихателни пътища действие, което се дължи на Paracetamol, Chlorpheniramine maleate и Pseudoephedrine HCl.

Paracetamol облекчава болката и понижава телесната температура.

Chlorpheniramine maleate има антагонистично действие спрямо така наречените H<sub>1</sub>-рецептори, по този начин облекчава следните симптоми: хрема, оток на носната лигавица, зачеряване и/или свръхчувствителност на очите.

Pseudoephedrine HCl намалява отока на лигавицата на горните дихателни пътища.

#### ПОКАЗАНИЯ

Tylol® Hot Pediatric е показан за облекчаване на следните симптоми на простуда и грип:

- назална конгестия (запушване на носа)
- хрема
- кихане
- повишена телесна температура
- лека до умерена болка от различен произход

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

**TyloI® Hot Pediatric** не трябва да се използва от пациенти, свръхчувствителни към Paracetamol, Chlorpheniramine maleate, Pseudoephedrine HCl или някоя от останалите съставки на продукта, както и от пациенти със захарен диабет, тежки чернодробни и бъбречни заболявания. Пациентите не трябва да приемат психофармакологични средства (МАО инхибитори) заедно с **TyloI® Hot Pediatric**; те трябва да бъдат спрени поне 2 седмици преди началото на лечението с **TyloI® Hot Pediatric**.

## **СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА**

**TyloI® Hot Pediatric** трябва да се прилага с особено внимание в някои случаи, затова преди да започнете лечението с **TyloI® Hot Pediatric** информирайте Вашия лекар, ако страдате от:

- чернодробни увреждания
- бъбречни увреждания
- белодробни увреждания
- предшестваща анемия
- тежки сърдечни заболявания
- бронхиална астма
- глаукома (повишено вътречно налягане)
- хипертиреоидизъм (повишена функция на щитовидната жлеза)
- хипертония
- захарен диабет

Пациенти, които употребяват антихипертензивни лекарства и/или антидепресанти, трябва да се посъветват със съответния специалист.

Употребата на **TyloI® Hot Pediatric** при деца под 6 години трябва да става само под лекарски контрол.

При лечение с **TyloI® Hot Pediatric**, трябва да се избягва употребата на алкохол, защото бдителността може да се понижи.

Консултация с лекар е наложителна, ако високата температура продължи повече от 3 дни, а другите симптоми – повече от 5 дни.

Трябва да се избягва едновременното приложение на **TyloI® Hot Pediatric** с други Paracetamol – съдържащи продукти, тъй като то може да доведе до предозирането на Paracetamol.

Да не се превишава препоръчаната максимална дневна доза или тази предписана от лекаря.

## **Бременност и кърмене**

**TyloI® Hot Pediatric** е предназначен за деца. Въпреки това, да се има предвид, че за бременни и кърмачки е препоръчителен лекарски контрол.

## **ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

При дози, надвишаващи препоръчаните се потенцира ефекта на продължително прилагани антикоагуланти (противосъсирващи лекарства). Едновременният прием на някои лекарства за лечение на депресия, успокоителни, лекарства за епилепсия, както и големи количества алкохол, увеличава вероятността от появя на нежелани лекарствени реакции, предизвикани от Paracetamol. Рядко може да настъпи повишаване на артериалното налягане, при едновременното приложение на Pseudoephedrine HCl с деконгестанти, трициклични антидепресанти, медикаменти подтикващи апетита, амфетамини като психостимуланти и МАО инхибитори. Антихипертинзивната ефективност на метилдопа, алфа и бетаадренергични блокери, гуанетидин намалява при едновременно приложение с Pseudoephedrine HCl.

## **ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ**

**TyloI® Hot Pediatric** е предназначен за деца. Въпреки това, да се има предвид възможността за появя на умора, сънливост и световъртеж.

## **ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Tylo<sup>®</sup> Hot Pediatric се приема през устата.

Препоръчителната дозировка на Tylo<sup>®</sup> Hot Pediatric е посочена по-долу:

Съдържанието на всяко саше се разтваря в 80 ml топла вода (половин стандартна чаша) и се изпива веднага, без изчакване. Ако е необходимо, следващата доза да се вземе след интервал от 6 часа. Препоръчителната максимална дневна доза е **4 сашета**.

## **ПРЕДОЗИРАНЕ**

Най-честите симптоми на предозиране са: гадене, повръщане, коремни болки, световъртеж, появата на алергични реакции от страна на кожата (най-често зачервяване и сърбеж), халюцинации и др.

В случай на предозиране незабавно информирайте Вашия лекар.

## **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

Tylo<sup>®</sup> Hot Pediatric се понася добре. В терапевтични дози, обикновено Paracetamol се понася добре. В редки случаи може да предизвика алергични реакции, като например обрив и сърбеж. В редки случаи при продължителен прием на по-високи дози може да се наблюдават различни промени в кръвната картина. Страницните действия на Pseudoephedrine HCl са много редки. В резултат на превъзбудждане на централната нервна система може да възникне нарушение на съня. В много редки случаи се съобщава за халюцинации, алергични реакции и задържане на урината, свързани с Pseudoephedrine HCl. Chlorpheniramine maleate може да причини сънливост и алергични реакции.

## **КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ.**

## **НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ**

**ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ ПОСОЧЕН ВЪРХУ ОПАКОВКАТА**

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25<sup>0</sup>C.

Да се пази от светлина и влага.

**Регистрационен №:**

**Дата на последна редакция на листовката: септември 2005 г.**