


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, прочетете внимателно тази информация преди да започнете да употребявате лекарството!

**VALIDOLEX
ВАЛИДОЛЕКС**



СЪСТАВ

Лекарствено вещество: Menthyl valerate 60 mg в една таблетка.

Помощни вещества: сорбитол, захароза, магнезиев карбонат, магнезиев стеарат, лек.

ДЕЙСТВИЕ

Валидолекс е лекарствен продукт с успокояващо и съдоразширяващо действие. Притежава потискащо повръщането действие.

ПОКАЗАНИЯ

Болки в сърдечната област при сърдечна невроза, помощно средство при краткотрайни пристъпи на стенокардия, при исхемична болест на сърцето, неврози, хистерия, "морска болест", "въздушна болест". Ефективен е при леко гадене с неврогенен произход.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Валидолекс не трябва да се прилага при:

- Свръхчувствителност към лекарственото и/или помощните вещества на продукта;
- При деца под 6-годишна възраст.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Валидолекс трябва да се прилага с повишено внимание в следните случаи:

- При тежка хипотензия (понижено кръвно налягане).
- При пациенти с вродена непоносимост към фруктоза Валидолекс може да бъде неподходящ, тъй като съдържа 1135 mg сорбитол в една таблетка. Може да причини стомашно дразнене и диария.
- Продуктът съдържа 150 mg захароза в една таблетка и може да бъде неподходящ при пациенти с вродена непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захаразно/изомалтазен дефицит.

Употреба при бременност и кърмене

Лекарственият продукт може да се прилага при бременни и в периода на кърмене в дози, не по-високи от посочените.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Не оказва неблагоприятно влияние.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Не са установени клинично значими взаимодействия на Валидолекс с други лекарствени продукти.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Сублингвални таблетки. Поставете се под езика до пълното им разтваряне. Да не се дъвче! Да не се гълта!

Възрастни: по 1 таблетка под езика до пълното ѝ разтваряне 3-4 пъти дневно

Деца: при деца над 6 годишна възраст се прилага 1/2 от дозата за възрастни



НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Като всяко друго лекарство и Валидолекс може да предизвика нежелани реакции.

В единични случаи може да се появят гадене, виене на свят, сълзене на очите, прояви на свръхчувствителност (обриви); непоносимост към миризмата.

ПРЕДОЗИРАНЕ

При предозирание е възможна поява на горепосочените нежелани лекарствени реакции, които преминават след спиране на лечението.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Сублингвални таблетки, по 10 или 20 броя в опаковка (1 или 2 блистера, заедно с листовка, в картонена кутия).

СЪХРАНЕНИЕ

В оригиналната опаковка, на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ

2 години от датата на производство.

Не употребявайте лекарството след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката!

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

СОФАРМА АД

София 1220, ул. "Илиенско шосе" 16

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

НИХФИ АД

София 1797, бул. "Климент Охридски" 3

СОФАРМА АД

София 1220, ул. "Илиенско шосе" 16

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА - юли, 2003 г.

