

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
VALEROL
ВАЛЕРОЛ



СЪСТАВ:

Лекарствено вещество в една таблетка: Menthyl valerate 60 mg .

Помощни вещества: сорбитол, безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

10 броя таблетки в блистер от PVC/ алуминиево фолио.

1 блистер в картонена кутия.

2 блистера в картонена кутия.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Balkanpharma-Dupnitsa AD

гр. Дупница, ул. "Самоковско шосе"3

Тел. (0701) 2-42-81/82; 2-90-21/29

Факс: (0701) 2-23-65; 2-81-62

ДЕЙСТВИЕ

Лекарственият продукт има успокояващо и съдоразширяващо действие.

Има слабо изразен ефект против повръщане.

ПОКАЗАНИЯ

- Психо-емоционални състояния протичащи с емоционална и нервна възбуда;
- Невро - вегетативна дистония с преобладаващи сърдечни оплаквания;
- Против повръщане при морска и въздушна болест.

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност към активната и/или помощните съставки на продукта.

Не се прилага при деца под 6 години.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Продуктът съдържа сорбитол (1285.00 mg в единична доза Валерол), който има леко слабително действие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ

Прилага се с повишено внимание при пациенти с тежка хипотония (понижено кръвно налягане).

При случаи на наследствена непоносимост към фруктоза може да предизвика диария.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННИ И В ПЕРИОДА НА КЪРМЕНЕ

Лекарственият продукт може да се прилага при бременни жени и в периода на кърмене в дози, не по-големи от посочените.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Сублингвални таблетки.

Поставят се под езика до стапянето им. Да не се дъвче! Да не се гълта!

При възрастни: по 1-2 таблетки под езика до пълното им разтваряне до 3-4 пъти дневно.

Лекарственият продукт съдържа сорбитол и може да се приема и от болни с диабет.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

В единични случаи може да се появят гадене, виене на свят, сълзене на очите, прояви на свръхчувствителност- обриви.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Таблетки по 60 mg, по 10 броя в опаковка.

10 броя таблетки в блистер от PVC/ алуминиево фолио.

1 блистер в картонена кутия.

2 блистера в картонена кутия.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25⁰С.

Да се пази на място, недостъпно за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ

18 месеца от датата на производство.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ

Юни 2002 г.