

Макет на първична опаковка

**Paraffin liquid
40 g
Течен парафин**

**ИАЛ
ОДОБРено!
ДАТА 26.04.2004г.**

oral solution (перорален разтвор)

Без лекарско предписание

Показания

Леко слабително средство за краткотрайно лечение при хроничен запек

Начин на употреба:

Приема се вътрешно по 1-2 супени лъжици дневно за препоръчване преди лягане от седнало или изправено положение. Не е желателно да се приема 2 часа преди/след прием на храна и/или лекарства, тъй като може да се повлияе тяхната резорбция. Ефектът настъпва след 2-3 часа.

Противопоказания

Не се прилага при свръхчувствителност към парафин и пълна и непълна чревна непроходимост.

Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Продуктът не се дава на деца под 6 годишна възраст, тъй като тази група пациенти са склонни към аспириране на маслени капчици, които могат да предизвикат развитието на липидна пневмония. Не се препоръчва прилагането и при възрастни, лежащи болни пациенти, тъй като тази група пациенти също са склонни към аспириране на маслени капчици, които могат да предизвикат развитието на липидна пневмония. Да не се използва при болки в стомаха, при позиви за повръщане, освен ако не е предписано от лекар. При кървене от ануса, или при кръв в изпражненията, приема на течен парафин трябва да се спре, тъй като това може да е индикация за сериозен проблем. Да не се употребява продължително време, тъй като червата изгубват нормалната си перисталтика.

Лекарствени и други взаимодействия

Продуктът задържа резорбцията в организма на мастноразтворимите витамини, което е нежелателно, освен това може да повлияе върху калийзадържащото действие на калийсъхранявящите диуретици. Може да повлияе нормалната резорбция и да намали ефикасността на следните лекарства: орални антикоагуланти – кумаринови и индандионови производни, орални контрацептиви, дигитализови гликозиди, както и може да намали резорбцията на витамин K, което от своя страна води до увеличаване на антикоагулантните ефекти.

Може да се употребява при бременност и кърмене под лекарски контрол.

Нежелани лекарствени реакции:

Възможна е появя на алергични реакции.

Приложението на продукта може да предизвика привикване на организма при продължително приемане. Прилагането на лекарствения продукт може да е придружено с коликообразни болки, гадене и повръщане.

Препоръки при употреба

Продуктът е за краткотрайно лечение на констипация. Не се препоръчва продължителното му приемане.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

Да се съхранява на защитено от пряка слънчева светлина място, при температура под 25°C.

Продуктът да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Годен до:

Per №:

Парт. №:

АПТЕЧНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2000 АД, ул."Мармарлийска" 37, гр. Велико Търново



Макет на първична опаковка

Paraffin liquid
80 g
Течен паракин

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 26.07.2004г.

oral solution (перорален разтвор)

Без лекарско предписание

Показания

Леко слабително средство за краткотрайно лечение при хроничен запек

Начин на употреба:

Приема се вътрешно по 1-2 супени лъжици дневно за препоръчване преди лягане от седнало или изправено положение. Не е желателно да се приема 2 часа преди/след прием на храна и/или лекарства, тъй като може да се повлияе тяхната резорбция. Ефектът настъпва след 2-3 часа.

Противопоказания

Не се прилага при свръхчувствителност към паракин и пълна и непълна чревна непроходимост.

Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Продуктът не се дава на деца под 6 годишна възраст, тъй като тази група пациенти са склонни към аспириране на маслени капчици, които могат да предизвикат развитието на липидна пневмония. Не се препоръчва прилагането и при възрастни, лежащи болни пациенти, тъй като тази група пациенти също са склонни към аспириране на маслени капчици, които могат да предизвикат развитието на липидна пневмония. Да не се използва при болки в стомаха, при позиви за повръщане, освен ако не е предписано от лекар. При кървене от ануса, или при кръв в изпражненията, приема на течен паракин трябва да се спре, тъй като това може да е индикация за сериозен проблем. Да не се употребява продължително време, тъй като червата изгубват нормалната си перисталтика.

Лекарствени и други взаимодействия

Продуктът задържа резорбцията в организма на мастноразтворимите витамини, което е нежелателно, освен това може да повлияе върху калий задържащото действие на калий-съхраняващите диуретици. Може да повлияе нормалната резорбция и да намали ефикасността на следните лекарства: орални антикоагуланти – кумаринови и индандинонови производни, орални контрацептиви, дигитализови гликозиди, както и може за намали резорбцията на витамин K, което от своя страна води до увеличаване на антикоагулантните ефекти.

Може да се употребява при бременност и кърмене под лекарски контрол.

Нежелани лекарствени реакции:

Възможна е появя на алергични реакции.

Приложението на продукта може да предизвика привикване на организма при продължително приемане. Прилагането на лекарствения продукт може да е придружено с коликообразни болки, гадене и повръщане.

Препоръки при употреба

Продуктът е за краткотрайно лечение на констипация. Не се препоръчва продължителното му приемане.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

Да се съхранява на защитено от пряка слънчева светлина място, при температура под 25°C.

Продуктът да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелзан върху опаковката.

Годен до:

Reg №:

Шарт. №

АПТЕЧНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2000 АД, ул."Мармарийска" 37, гр. Велико Търново

