

**Макет на първична опаковка- Този етикет ще бъде нагънат и прикрепен към бутилката по съответен начин**

**OLEUM RICINI 40 ml**

**Рициново масло**

**oral liquid (перорална течност)**

**Състав:** Castor oil 40 ml; помощни вещества няма

**Показания**

Слабително средство за краткотрайно лечение при запек.

**Начин на употреба:**

За възрастни: приема се вътрешно по 15-30 g (1-2 супени лъжици дневно), може да се приема с топло кафе или лимонов сок; за деца над 6 година възраст: (1-3 чаени лъжички дневно), може да се приема с мед в съотношение 1:1 или разбъркано с кристална захар. Маслото по възможност да се изсипва на задната половина на езика. Ефектът настъпва след 2-6 часа.

**Противопоказания**

Да не се употребява продължително време, тъй като червата изгубват нормалната си перисталтика и при продължителна употреба може да има привикване.

Да не се прилага при отравяне с мастноразтворими вещества (бензол, фосфороганични съединения и др.) и екстракт от мъжка папрат.

Да не се прилага при: хемороидални кръвотечения, възпалителни заболявания на коремните органи (перитонит, апендицит, язвен ентероколит, остръ холецистит и др.), запек вследствие на механични препятствия (илеус, инкарцерирана херния и др.), в менструалния период, при обща слабост и склонност към колапс, (особено реконвалесцентни изтощени болни и старческа възраст), при висока температура (особено при болни с отрицателен воден баланс), при спастичен запек и жълтеница, при хроничен запек и остри и хронични бъбречни заболявания. Продуктът да не се дава на деца под 6 годишна възраст. Да не се прилага при лечение с мъжка папрат.

**Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба**

Да не се използва при болки в стомаха, при позиви за повръщане, освен ако не е предписано от лекар. При кървене от ануса, или при кръв в изпражненията, приема на рициново масло трябва да се спре, тъй като това може да е индикация за сериозен проблем.

Рициновото масло стимулира маточните контракции. Да не се приема късно вечер – ефектът настъпва в рамките на 2-6 часа.

**Лекарствени и други взаимодействия**

Продуктът задържа резорбцията в организма на мастноразтворимите витамини, което е нежелателно. Може да повлияе върху калий-задържащото действие на калий-съхранявящите диуретици.

**Да не се употребява при бременност.**

**Нежелани лекарствени реакции:**

Възможна е появя на алергични реакции.

Приложението на продукта може да предизвика привикване на организма при продължително приемане. Прилагането на лекарствения продукт може да е придружено с коликообразни болки, гадене и повръщане. При контакт с очите и/или кожата може да предизвика дразнене.

При предозиране е възможно да се усилят стомашните коликообразни болки и да предизвика гадене, повръщане, колики, тежка диария.

**Препоръки при употреба**

Продуктът е за краткотрайно лечение на констипация. Не се препоръчва продължителното му приемане.

**Да се съхранява на място, недостъпно за деца**

Да се съхранява на защитено от светлина място, в добре затворени опаковки, при температура под 25°C.

Продуктът да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелзан върху опаковката.

Годен до:

Reg №:

Парт. №:

Без лекарско предписание

ЕТ „Богомил Василев – Евелин 29”

гр. Перник, ул. „Битоля” № 17, тел 02 920 02 73

26.07.05 г.



**Макет на първична опаковка**

**OLEUM RICINI**

**1000 ml**

**Рициново масло**

**oral liquid (перорална течност)**

**ЗА БОЛНИЧНА УПОТРЕБА**

**Състав:** Castor oil 1000 ml; помощни вещества няма

**Показания**

Слабително средство за краткотрайно лечение при запек.

**Начин на употреба:**

За възрастни: приема се вътрешно по 15-30 g (1-2 супени лъжици дневно), може да се приема с топло кафе или лимонов сок; за деца над 6 годишна възраст: (1-3 чаени лъжички дневно), може да се приеме с мед в съотношение 1:1 или разбъркано с кристална захар. Маслото по възможност да се изсипва на задната половина на езика. Ефектът настъпва след 2-6 часа.

**Противопоказания**

Да не се употребява продължително време, тъй като червата изгубват нормалната си перисталтика и при продължителна употреба може да има привикване.

Да не се прилага при отравяне с мастноразтворими вещества (бензол, фосфорогранични съединения и др.) и екстракт от мъжка папрат.

Да не се прилага при: хемороидални кръвотечения, възпалителни заболявания на коремните органи (перитонит, апендикит, язвен ентероколит, остръ холецистит и др.), запек вследствие на механични препятствия (илеус, инхарцирирана херния и др.), в менструалния период, при обща слабост и склонност към колапс, (особено реконвалесцентни изтощени болни и старческа възраст), при висока температура (особено при болни с отрицателен воден баланс), при спастичен запек и хълтеница, при хроничен запек и остри и хронични бъбречни заболявания. Продуктът да не се дава на деца под 6 годишна възраст. Да не се прилага при лечение с мъжка папрат.

**Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба**

Да не се използва при болки в стомаха, при позиви за повръщане, освен ако не е предписано от лекар. При кървене от ануса, или при кръв в изпражненията, приема на рициново масло трябва да се спре, тъй като това може да е индикация за сериозен проблем. Рициновото масло стимулира маточните контракции. Да не се приема късно вечер – ефектът настъпва в рамките на 2-6 часа.

**Лекарствени и други взаимодействия**

Продуктът задържа резорбцията в организма на мастноразтворимите витамини, което е нежелателно. Може да повлияе върху калий-задържащото действие на калий-съхраняващите диуретици.

Да не се употребява при бременност.

**Нежелани лекарствени реакции:**

Възможна е появя на алергични реакции.

Приложението на продукта може да предизвика привикване на организма при продължително приемане. Прилагането на лекарствения продукт може да е придружено с коликообразни болки, гадене и повръщане. При контакт с очите и/или кожата може да предизвика дразнене.

При предизiranе е възможно да се усилят стомашните коликообразни болки и да предизвика гадене, повръщане, колики, тежка диария.

**Препоръкъ при употреба**

Продуктът е за краткотрайно лечение на констипация. Не се препоръчва продължителното му приемане.

**Да се съхранява на място, недостъпно за деца**

Да се съхранява на защитено от светлина място, в добре, при температура под 25°C. затворени опаковки

Продуктът да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелаян върху опаковката.

**Годен до:**

Per №:

Парт. №

Без лекарско предписание

ЕТ „Богомил Василев – Евелин 29“

гр. Перник, ул. „Битоля“ № 17, тел 02 920 02 73

26. 07. 05.

