

ВИШНЕВСКИ®
WISHNEVSKY®

маз

СЪСТАВ. 1g маз съдържа 0,03g Bismuthi Tribromphenol и 0,03g Juniper Tar и като помощни вещества Силициев диоксид, колоиден безводен, Полиетоксилирано рициново масло.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА. Маз, 75g или 135g в алуминиеви туби.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА. "ВетПром"-АД, 2400 гр.Радомир, България, ул."Отец Паисий" №26.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ. Приложен локално продуктът оказва антисептичен, анестетичен и противовъзпалителен ефект, способства отделянето на некротичните материи, ускорява регенерацията на тъканите, гранулацията и епителизацията на раните.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ. При гнойно възпалителни процеси от различен произход, гнойни рани, варикозни язви, декубитални и диабетични рани, диабетично стъпало, флебити, тромбофлебители.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Изключително рядко, в случаите на свръхчувствителност /алергия/ към някои от съставките.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА. Не трябва да се прилага върху лигавици, устна кухина, очи.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Не са установени.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА ПРИ БРЕМЕННО И КЪРМЕЩИ. При провеждане на лечение с лекарствения продукт Wishnevsky, не са установени нежелани лекарствени реакции.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ. Употребата на Wishnevsky не се отразява върху способността за шофиране и работа с машини.

НАЧИН НА УПОТРЕБА И ДОЗИРОВКА. Външно, за прилагане върху кожата.

Ако лекарят не е предписал друго, при варикозни язви, диабетични рани, флебити, тромбофлебители - марлена превръзка, напоена с продукта се поставя върху болния участък, а върху нея се поставя полиетиленово фолио. Компресът се сменя 1-2 пъти седмично, а при гнойни възпалителни процеси превръзката се сменя в зависимост от гнойната секреция.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ. В някои случаи, при продължителна употреба е възможна локална реакция със зачервяване на кожата, парене, възпаление, оток, при което лечението се преустановява до отминаване на ефекта. При случайно поглъщане на големи количества е необходимо промиване на устната кухина и стомаха, при нужда симптоматично лечение.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ. Не са известни, освен в редки случаи на алергични дерматити, причинени от някои от съставките.

СЪХРАНЕНИЕ. При температура под 25°C, на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ. 2 (две) години.

Продуктът да не се използва след датата на изтичане срока на годност, посочена върху опаковката.

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА - февруари 2004 г.

