

## Макет на първична опаковка

Ricini oleum  
40 g  
Рициново масло

ИАЛ  
ОДОБРЕНО:  
ДАТА 26. 04. 2009

oral solution (перорална течност)

### Показания

Слабително средство за краткотрайно лечение при запек.

### Начин на употреба:

За възрастни: приема се вътрешно по 15-30 g (1-2 супени лъжици дневно), може да се приема с топло кафе или лимонов сок; за деца над 6 годишна възраст: (1-3 чаени лъжички дневно), може да се приема с мед в съотношение 1:1 или разбъркано с кристална захар. Ефектът настъпва след 2-6 часа.

### Противопоказания

Да не се употребява продължително време, тъй като червата изгубват нормалната си перисталтика. Да не се прилага при отравяне с мастноразтворими вещества (бензол, фосфорогранични съединения и др.) и екстракт от мъжка пацрат.

Да не се прилага при: хемороидални кръвотечения, възпалителни заболявания на коремнините органи /перитонит, апендицит, язвен ентероколит, остръ холецистит и др./, запек вследствие на механични препятствия /илеус, инкарцерирана херния и др./, в менструалния период, при обща слабост и склонност към колапс, /особено реконвалесцентни изтощени болни и старческа възраст/, при флебитни и трескави състояния /особено при болни с отрицателен воден баланс/, при спастичен запек и жълтеница.

### Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Продуктът да не се дава на деца под 6 годишна възраст. Да не се използва при болки в стомаха, при позиви за повръщане, освен ако не е предписано от лекар. При кървене от ануса, или при кръв в изпражненията, приема на рициново масло трябва да се спре, тъй като това може да е индикация за сериозен проблем. Рициновото масло стимулира маточните контракции. Да не се приема късно вечер – ефектът настъпва в рамките на 2-6 часа.

### Лекарствени и други взаимодействия

Продуктът задържа резорбцията в организма на мастноразтворимите витамини, което е нежелателно. Може да повлияе върху калий-задържащото действие на калий-съхранявящите диуретици.

### Да не се употребява при бременност.

### Нежелани лекарствени реакции:

Възможна е поява на алергични реакции.

Приложението на продукта може да предизвика привикване на организма при продължително приемане. Прилагането на лекарствения продукт може да е придружено с коликообразни болки, гадене и повръщане. При контакт с очите и/или кожата може да предизвика дразнене.

При предозиране е възможно да се усилят стомашните коликообразни болки и да предизвика гадене, повръщане, колики, тежка диария.

### Препоръки при употреба

Продуктът е за краткотрайно лечение на констипация. Не се препоръчва продължителното му приемане.

### Да се съхранява на място, недостъпно за деца

Да се съхранява на защитено от светлина място, в добре затворени опаковки, при температура под 25°C.

Продуктът да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелаян върху опаковката.

### Годен до:

Reg №:

Парт. №:

Без лекарско предписание

АПТЕЧНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2000 АД, ул."Мармарийска" 37, гр. Велико Търново

