

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА ...24.02.03

**КИСЛОРОДНА ВОДА 3% w/w 100 ml**  
**HYDROGEN PEROXIDATUM 3% w/v**

**Състав :Hydrogen peroxide 30% w/w 10.328 g**

**Помощни вещества :Фенациетин 0.02 g**

**Пречистена вода до 100 ml**

**Разтвор дермален**

**БЕЗ ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ!**

**ВЪНШНО**

**ПОКАЗАНИЯ –** дезинфекционно и антисептично средство за външно приложение при рани и язви на кожата.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ –** повишена чувствителност към перхидрол, лица с генетичен дефект - екатализия.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ –** да не се промиват големи рани и закрити кухини.  
Да не се прилага върху лигавици. Да не се прилага под форма на компреси.  
Да не се приема вътрешно.

Продуктът трябва да се прилага с повищено внимание при бременност и кърмене.

**ПРЕДОЗИРАНЕ –** При продължителна употреба върху големи отворени рани може да се раздие газова емболия.

**НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ –** алергични реакции и покална токсичност.

**НАЧИН НА УПОТРЕБА –** само за дермално приложение чрез промивки на засегнатите места един - два пъти дневно.

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.  
Период на използване след отваряне на опаковката – 2 месеца.

**СЪХРАНЕНИЕ;** на тъмно, при 1° под 25°, на място недостъпно за деца.

Per. N

"Алтенио- В. Търново 2000 АД"

Парт: N

Галенова лаборатория

Годен до:

Ул. "Мармарлийска" 37



тел: 062 62 34 03 факс: 062 62 20 74



19.05.03

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА 27. 02-03

**КИСЛОРОДНА ВОДА 3% w/w 1000 ml**  
**HYDROGENII PEROXIDATUM 3% w/w**

**Състав :Hydrogen peroxide 30%w/w 103.28 g**

**Помощни вещества :Фенацетин 0.20g**

**Пречистена вода до 1000 ml**

**Разтвор дермален**

**ЗА БОЛНИЧНА УПОТРЕБА!**

**ВЪНШНО**

**ПОКАЗАНИЯ** -- дезинфекционно и антисептично средство за външно приложение при рани и язви на кожата.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ** - повишена чувствителност към перхидрол, лица с генетичен дефект - акаталазия.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** - да не се промиват големи рани и закрити кухини. Да не се прилага върху лигавици. Да не се прилага под форма на компреси.

Да не се приема вътрешно. Продуктът трябва да се прилага с повишено внимание при бременност и кърмене.

**ПРЕДОЗИРАНЕ** -- При продължителна употреба върху големи отворени рани може да се разгие газова емболия.

**НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ** - алергични реакции и локална токсичност.

**НАЧИН НА УПОТРЕБА** -- само за дермално приложение чрез промивки на засегнатите места един - два пъти дневно.  
Да не се употребява след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.  
Период на използване след отваряне на опаковката - 2 месеца.

**СЪХРАНЕНИЕ**; на тъмно, при t° под 25°, на място недостъпно за деца.

Per. N

"Аптечно- В. Търново 2000 АД"

Парт: N

Галенова лаборатория

Годен до:

Ул. "Мармарийска" 37



тел: 062 62 34 03 факс: 062 62 20 74

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА 27. 02-03