

ИАЛ
ОДОБРЕННО
ДАТА 28.06.2004

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.

INFLUCID® - ИНФЛУИД

Таблетки

Състав:

1 таблетка (250 mg) съдържа:

Aconitum trit. D3	25 mg
Bryonia trit. D2	25 mg
Eupatorium perfoliatum trit. D1	25 mg
Gelsemium trit. D3	25 mg
Ipecacuanha trit. D3	25 mg
Phosphorus trit. D5	25 mg

Помощни вещества:

Лактоза моногидрат, магнезиев стеарат, пшенично нишесте

Какво представлява Инфлуид?

Инфлуид е хомеопатичен лекарствен продукт.

60 таблетки за смучене в опаковка, блистери с по 20 броя таблетки.

Инфлуид е комбинация от шест добре доказани отделни хомеопатични средства, която е особено подходяща за лечение на простудни и грипни заболявания с внезапно начало и бързо развитие. *Aconitum* е полезен в началните фази на остри инфекции на респираторния тракт, особено когато са придружени с температура. За ефикасното повлияване на общата настинка помага и компонентът *Bryonia*, който има ефект при сухите бронхити с болезнена, дразнеща кашлица. *Ipecacuanha* предизвиква втечняването на бронхиалните секрети и по този начин подпомага изхвърлянето им. *Gelsemium* е особено ефикасен при настинки, грип, синузити, придружени с отрадна лост и умора, главоболие и болки в тялото, както и при възпалено гърло и пресипна лост. *Phosphorus* има положителен ефект върху състоянието на изтощение, невралгия и главоболие по време на остри и хронични респираторни заболявания. Освен това той засилва имунната система и по този начин ускорява оздравителния процес. Тази комбинация е допълнена с *Eupatorium perfoliatum* – често използвано в хомеопатията средство за лечение на настинка и грип.

Благодарение на широкия си спектър на действие, Инфлуид има бързо и ефикасно въздействие при настинки с температура, като грип. Инфлуид е подходящ и за профилактика на вирусни инфекции.

За какво се използва Инфлуид?

За лечение на простудни и гриповидни заболявания, съпровождани с повишената температура.



Кога не трябва да приемате Инфлуцид?

Инфлуцид не трябва да се приема при свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба на Инфлуцид?

Ако оплакванията Ви продължават или състоянието Ви се влоши, посъветвайте се с лекуващия Ви лекар.

Специални предупреждения:

1 таблетка Инфлуцид съдържа 90 mg лактозаmonoхидрат. Неподходящ при хора с лактазна недостатъчност, галактоземия или глукозен / галактозен синдром на малабсорбция.

Инфлуцид съдържа шпенично нишесте. Може да представлява опасност за хора с цъолиакия (глутенова ентеропатия)

Какво трябва да имате предвид ако сте бременна или кърмене?

Както всички останали лекарства, по време на бременност или кърмене, Инфлуцид трябва да се приема само след консултация с лекар.

Кои други лекарства могат да повлияят ефекта на Инфлуцид или могат да бъдат повлияни?

Няма данни за взаимодействия с други лекарства или с храни.

Как можете да използвате Инфлуцид?

Да се следва посочената дозировка или както е предписано от лекуващия лекар.

Възрастни: При остри оплаквания се приема по една таблетка на едночасови интервали, докато настъпи подобрене до максимум 12 таблетки на ден. За по-нататъшно лечение да се приемат от 1 до 3 таблетки дневно.

Деца под 12 годишна възраст: При остри оплаквания се приема по една таблетка на всеки два часа, докато настъпи подобрене, до 8 таблетки дневно. За по-нататъшно лечение или за лекуване на хронични състояния, да приемат от една до три таблетки дневно.

За профилактика на простудни и грипни заболявания е препоръчително да се приемат по 1-2 таблетки три пъти дневно. Деца под 12 годишна възраст могат да приемат профилактично 1 таблетка 3 пъти дневно.

Да не се прилага при деца под една година, поради липсата на достатъчно данни за употребата на продукта в тази възраст.

Таблетките да се приемат половин час преди или след хранене и да се оставят да се разтопят бавно в устата. За малки деца е препоръчително таблетките да се разтварят в малко вода.

Какви нежелани лекарствени реакции може да предизвика Инфлуцид?

В много редки случаи е възможна проява на свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.



При приемане на хомеопатични лекарствени продукти съществуващи оплаквания могат временно да се влошат (начално влошаване). В такива случаи е необходимо да се консултирате с лекар и да преустановите лечението.

Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество от Инфлуцид?

Няма съобщени случаи на предозиране.

Инструкции за съхранение на Инфлуцид:

Да се съхранява при стайна температура

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

Срок на годност:

3 години

Производител и притежател на разрешението за употреба:

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottistraße 24

76227 Karlsruhe

Germany

Медицинско представителство за България

Либра АД

Дата на последна редакция на текста

Юни 2004

