


## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.

### Mastodynon® - Мастодинон



#### Състав:

1 таблетка съдържа:

Agnus castus Ø	162.0 mg
Caulophyllum thalictroides D.4	81.0 mg
Cyclamen D 4	81.0 mg
Ignatia D 6	81.0 mg
Iris D 2	162.0 mg
Lilium tigrinum D 3	81.0 mg

**Помощни вещества:** лактоза монохидрат, картофено нишесте, магнезиев стеарат

#### Какво представлява Мастодинон?

Хомеопатичен лекарствен продукт с приложение в гинекологията.

Таблетки в опаковки от 60, 120 и 240 таблетки, по 20 броя в блистер.

#### За какво се използва Мастодинон таблетки?

За лечение при жени в случаи на:

- смущения в менструалния цикъл и/или безплодие, дължащи се на недостатъчност на жълтото тяло;
- оплаквания при менструация (пременструален синдром) като напрегнатос и болки в гърдите, психична лабилност, запек, отоци, главоболие/мигрена;
- фиброкистозна мастопатия.

Мастодинон не е предназначен за лечение на злокачествени образувания на млечните жлези.

#### Кога не трябва да приемате Мастодинон таблетки?

При свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

#### Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба на Мастодинон таблетки?

Ако симптомите са неясни, упорити или нови трябва да се консултирате с лекар за отхвърляне на други причини за състоянието Ви.

Ако оплакванията Ви продължават или състоянието Ви се влоши, посъветвайте се с лекуващия Ви лекар.

#### Специални предупреждения:

Поради съдържанието на лактоза, този продукт не е подходящ за пациенти, страдащи от вродена галактозна непоносимост, генетично обусловена лактазна недостатъчност или глюкозо-галактозна малабсорбция.

#### Какво трябва да предприемете ако сте бременна или кърмите?

Няма достатъчно данни за употребата на продукта по време на бременност и кърмене. При настъпване на бременност преустановете лечението с Мастодинон таблетки, защото симптомите, които се повлияват от този лекарствен продукт, изчезват поради хормоналните промени в тялото.



Мастодинон не трябва да се прилага по време на кърмене, тъй като данните от проведените изследвания с животни свидетелстват за понижаване на лактацията.

**Влияние върху способността за шофиране и работа с машини:**

Мастодинон таблетки не оказва влияние при шофиране и работа с машини.

**Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Мастодинон таблетки или могат да бъдат повлияни?**

Ако приемате други лекарствени продукти трябва да се консултирате с лекар преди да започнете прием на Мастодинон, защото има данни за взаимно потискане на ефекта при едновременен прием на Мастодинон и допамин-рецепторни антагонисти.

**Как можете да използвате Мастодинон таблетки?**

Ако друго не е предписано от лекар приемайте по една таблетка два пъти дневно с малко течност.

Мастодинон трябва да се приема в продължение най-малко на три месеца, като приема не се прекъсва по време на менструация. Подобрене в състоянието се наблюдава обикновено след 6 седмично лечение. Ако оплакванията се появят отново след прекъсване на лечението, то трябва да бъде продължено след консултация с лекар. Поради добрата поносимост към лекарствения продукт, той е подходящ за продължително лечение.

Да не се прилага при деца под 12 години, поради липсата на достатъчно опит с употребата на продукта в тази възраст.

**Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество от Мастодинон таблетки?**

Няма съобщени случаи на предозиране.

**Какви нежелани реакции може да предизвика Мастодинон таблетки?**

В много редки случаи могат да бъдат наблюдавани нежелани реакции като гадене, стомашни оплаквания, леко увеличаване на телесното тегло, обрив, съпроводен със сърбеж, акне и главоболие.

В изолирани случаи преходна психомоторна възбуда, състояние на обърканост и халюцинации могат да се появят след употреба на продукти, съдържащи Agnus Castus.

**Съхраняване на Мастодинон таблетки:**

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Да се съхранява под 25°C!

**Срок на годност:**

Срокът на годност е 3 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката!

**Производител и притежател на разрешението за употреба:**

BIONORICA AG

Kerschensteinerstrasse 11-15

D-92318 Neumarkt / Germany

Медицинско представителство в България:

Либра АД

Дата на последна редакция на листовката: Септември 2004

