

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВИЕ

ПРОДУКТОВА ОЦЕНКА

Информация за пациента

N=1/44.02.02

Еднач

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.

Наименование на лекарствения продукт

Cefagil® - Цефагил®

Състав

10 ml капки съдържат:

Активно вещество: Turnera diffusa dil. D2 10 ml

Помощни вещества: няма

Какво представлява Цефагил® Капки?

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Капки перорални, разтвор – в бутилки с капкомер – 50 / 100 ml.

За какво се използва Цефагил® Капки?

Цефагил® Капки се използва според хомеопатичните принципи на лечение при функционални сексуални нарушения.

Кога не трябва да взимате или да използвате Цефагил® Капки?

Цефагил® Капки не се използва при алкохолна болест. Поради съдържание на алкохол, Цефагил® Капки трябва да се прилага в случаи на чернодробни заболявания, епилепсия и органични заболявания на мозъка само след консултация с лекар.

Какви предизвънни мерки трябва да имате предвид при употреба на

Цефагил® Капки?

Ако оплакванията Ви продължават или състоянието Ви се влошава, посъветвайте се с лекуващия Ви лекар.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Цефагил® Капки или могат да бъдат повлияни?

Няма взаимодействия с други лекарства или с храни.

Специални предупреждения

Цефагил® Капки съдържа 70 обемни % етанол. В максималната еднократна доза от 10 капки (0,2 g) се съдържат 0,12 g етанол.

Цефагил® Капки не се използва при деца.

По време на бременност и кърмене трябва да се използва само след консултация с лекар.

Цефагил® Капки не оказва влияние при шофиране и работа с машини.

Как можете да използвате Цефагил® Капки?

Ако не е предписано друго, при остри случаи се взимат по 5-10 капки на всеки половин или цял час, най-много до 12 приема. При хронични случаи се взимат по 5-10 капки 1 до 3 пъти дневно.

Продължителността на лечението е неограничено.

Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество от Цефагил® Капки?

Няма съобщени случаи на предозиране.

Какво трябва да правите, ако сте пропуснали прием на Цефагил® Капки или преждевременно прекратите лечението?

Ако сте пропуснали прием, продължете както обикновено. Не приемайте двойна доза от лекарството, за да компенсирате пропуснатия прием.

Липсва нежелан ефект при спиране на лечението с Цефагил® Капки.

Какви нежелани реакции може да предизвика Цефагил® Капки?

Няма известни нежелани реакции.

Съществуващи оплаквания могат временно да се влошат при приемане на хомеопатични медикаменти (начално влошаване). В такива случаи е необходимо да се консултирате с лекар и да преустановите лечението.

Съхраняване на Цефагил® Капки.

Не се изискват специални условия за съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

Срокът на годност е 5 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката!

Производител и притежател на разрешението за употреба

Cefak KG

Ostbahnhofstr. 15

D-87437 Kempten, Germany

Медицинско представителство в България:

Либра АД

Бул. "Джеймс Баучер" 114 А

1407 София

Дата на последна редакция на листовката

Април 2001

Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.