


**Информация за пациента**

**EMEND®**  
**ЕМЕНД**  
 (aprepitant)  
 твърди капсули 80mg



**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да взимате това лекарство**

- Запазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате други въпроси, моля, попитайте Вашия лекар или Вашия фармацевт
- Този лекарствен продукт е предписан лично на Вас и Вие не трябва да го давате на други хора. Той може да е вреден за тях, дори ако симптомите им са същите като Вашите.

**Съдържание на листовката:**

1. За какво се използва EMEND и как се предлага?
2. Преди да приемате EMEND
3. Как да приемате EMEND
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхраняване на EMEND
6. Допълнителна информация

**EMEND (ЕМЕНД) 80 mg**  
 твърди капсули (aprepitant)

Активната съставка е aprepitant. Всяка 80 mg твърда капсула съдържа 80 mg aprepitant.

Останалите съставки включват: захароза, микрокристална целулоза(E 460), хидроксипропил целулоза(E 463), натрий лаурил сулфат, желатин, титаниев двуокис (E 171), шеллак, калиева основа и черен железен оксид (E 172).

**Притежател на разрешението за употреба е:**  
 Merck Sharp & Dohme IDEA Inc.  
 Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glatbrugg  
 Switzerland

**Производител е:**  
 Merck Sharp & Dohme B. V. Waarderweg 39,  
 Postbus 581 NL-2003 PC Haarlem  
 Холандия

1. За какво се използва EMEND и как се предлага?

**За какво се използва EMEND?**

EMEND се използва **ЗАЕДНО С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА** за предотвратяване на гадене и повръщане, причинени от химиотерапевтично лечение. EMEND е неврокинин 1 (NK<sub>1</sub>) рецепторен антагонист.

**Как изглежда EMEND и как се предлага**

Твърдите капсули от 80 mg са непрозрачни, с бяло тяло и капаче, с отпечатани различно с черно мастило върху тялото на капсулата "461" и "80 mg".



EMEND 80 mg твърди капсули се предлагат в следните опаковки:

- Блистерни опаковки, съдържащи една EMEND 80 mg капсула
- Опаковка за 2-дневно лечение, съдържаща две EMEND 80 mg капсули
- Блистерни опаковки, съдържащи пет EMEND 80 mg капсули

Възможно е на пазара да не се предлагат всички видове опаковки.

## 2. Преди да приемате EMEND

**Уведомете Вашия лекар, ако:**

- имате чернодробно заболяване

**Не приемайте EMEND,**

- ако имате алергия към arperitant или към някое от помощните вещества.
- с лекарства, съдържащи пимозид (използван за лечение на психиатрични заболявания), терфенадин и астемизол (използвани за сенна хрема и други алергични състояния), цисаприд (използван за лечение при нарушения на стомашно-чревния тракт). Уведомете Вашия лекар, ако взимате такива продукти, тъй като лечението Ви трябва да бъде променено преди да започнете да взимате EMEND.

### **Бременност**

Преди да започнете да взимате EMEND е важно да уведомите Вашия лекар ако сте бременна или планирате да забременеете.

Противозачатъчните таблетки също могат да не действат; трябва да се използва друга форма за предпазване от забременяване както по време на лечението с EMEND, така и до 2 месеца след като сте използвали EMEND.

### **Кърмене**

Преди да започнете да взимате EMEND е важно да уведомите Вашия лекар, ако кърмите или планирате да кърмите.

### **Шофиране и работа на машини**

Не се очаква EMEND да повлияе на Вашата способност да шофирате или работите на машини. В същото време индивидуалните отговори към прилаганото лекарство могат да бъдат различни.

### **Приложение при деца и подрастващи**

Не давайте EMEND на пациенти на възраст под 18 години.

### **Приложение при пациенти в напреднала възраст**

При пациенти в напреднала възраст не се налага промяна в дозата.

### **Важна информация за някои от съставките на EMEND**

EMEND съдържа захароза. Ако сте били уведомени от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете този лекарствен продукт.

### **Премане на EMEND с други лекарства**

EMEND може да повлияе върху други лекарства както по време, така и след лечение с него. Има някои лекарства, които не трябва да се взимат с EMEND или които налагат коригиране на дозата (виж също Не приемайте EMEND). EMEND трябва да се използва внимателно, когато се прилага едновременно с други лекарства. Поради това, преди да започнете лечението е важно да уведомите Вашия лекар за други лекарства или билки, които взимате, взимали сте наскоро или планирате да вземате, дори и за такива, които се получават без рецепта.

## 3. Как да приемате EMEND



Винаги взимайте EMEND точно по начина, по който Ви е предписан от лекаря.

#### **Препоръчаната доза EMEND е**

една капсула от 125 mg през устата 1 час преди да започнете химиотерапевтичното лечение

и една капсула от 80 mg всяка сутрин в продължение на 2 дни след провеждане на химиотерапия.

EMEND може да се взема с храна или без храна. Капсулата EMEND трябва да се приема цяла.

#### **Ако вземете повече EMEND отколкото трябва**

Не вземайте повече капсули от препоръчаните от лекаря. Ако вземете много капсули, незабавно уведомете Вашия лекар.

#### **Ако забравите да вземете EMEND**

Ако сте пропуснали една доза, обадете се на Вашия лекар за съвет.

### **4. Възможни нежелани лекарствени реакции**

Както всички лекарства, така и EMEND може да има нежелани лекарствени реакции. По време на изпитванията подобни нежелани лекарствени реакции са протичали като леки или средно тежки.

Най-честите нежелани лекарствени реакции (за които има вероятност да се срещнат при 1 до 10 пациента от всеки 100) са: оригване, запек, диария, световъртеж, умора, главоболие, хълцане, нарушено храносмилане, загуба на апетит и повишени стойности на чернодробните ензими.

Други не чести нежелани лекарствени реакции (за които има вероятност да се срещнат при между 1 и 10 пациента от всеки 1,000) са: нарушен сън, акне, тревожност, бактериална инфекция, подуване на корема, кръв в урината, дискомфорт в гърдите, кашлица, затруднен мисловен процес, дезориентация, сухота в устата, очна секреция и сърбеж, еуфория, прекомерно потене, прекомерна жажда, висока температура с повишен риск от инфекция, гъбична инфекция, пареща болка в гърдите, високи нива на кръвна захар, горещи вълни, повишено уриниране с болка или парене, сърбеж, ниски нива на натрий в кръвта, намаляване броя на червените кръвни телца, секреция по задната стена на гърлото, мускулни спазми или болка, гадене, мазна кожа, отделяне на газове, обрив, зачервяване на лицето, звън в ушите, чувствителност към светлина, забавено сърцебиене, кихане, възпалено гърло, възпаления в устата, възпаления на кожата, стомашна болка, язва на стомаха, оток, нарушен вкус, повръщане и загуба или наддаване на тегло.

Има единични съобщения и за следните събития: синдром на Stevens-Johnson (рядко срещана тежка кожна реакция), ангиоедем (подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, което може да затрудни преглъщането или дишането) и уртикария (сърбящ обрив).

Ако имате някакви нежелани лекарствени реакции, които не са споменати в тази листовка, моля, уведомете Вашия лекар.

### **5. Съхраняване на EMEND**

Пазете далеч от достъпа на деца

Няма специални инструкции за съхранение.

Не изваждайте капсулата от блистера докато не сте готови да я приемете.

Не вземайте капсулите, ако са с изтекъл срок на годност, ясно отбелязан върху опаковката.

Листовката е одобрена за последен път Октомври 2005г.

