

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 28.02.06г.

Информация за пациента.

Моля, прочетете внимателно!

Моля, прочетете цялата листовка внимателно, преди да започнете да вземате този лекарствен продукт.

Прочетете я, дори ако сте използвали вече този продукт; информацията може да е променена.

Запазете листовката. Възможно е да се нуждаете от нея отново.

Този лекарствен продукт е предписан лично на Вас и не трябва да го давате на друг. Той може да му навреди, независимо, че симптомите са същите като Вашите.

Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар.

FOKUSIN / ФОКУСИН

Състав

Лекарствено вещество

Tamsulosin hydrochloride 0,40 mg във всяка капсула с изменено освобождаване, еквивалентни на 0,367 mg tamsulosin.

Помощни вещества

Кополимерна дисперсия 1:1 30%, микрокристална целулоза, дибутилсебакат, полисорбат 80, колоидален хидриран силициев диоксид, талк.

Състав на капсулите (тяло и капак): азорубин (Е 122), патент синьо V (E131), желатин.

Описание на продукта: тъмно сини твърди капсули, съдържащи бели до почти бели пелети.

Лекарствена форма и опаковка

Капсули с изменено освобождаване, твърди

Съдържание на 1 опаковка:

30, 90 или 100 капсули с изменено освобождаване, твърди.


Притежател на разрешението за употреба

Зентива АД

Прага, Чешка Република

Как действа ФОКУСИН?

ФОКУСИН съдържа лекарственото вещество tamsulosin. Tamsulosin блокира алфа-1-рецепторите и намалява напрежението в мускулите на простатата и уретрата (никочния



канал). Така облекчава преминаването на урината през пикочния канал и като следствие от това улеснява уринирането.

За какво се използва ФОКУСИН?

ФОКУСИН се използва при мъже за лечение на оплаквания, свързани с доброкачествена хиперплазия на простата, като: трудно уриниране, прекъсване на уринирането, неотложна нужда от уриниране, често уриниране, както през деня, така и през нощта.

Кога не трябва да се използва ФОКУСИН?

Не употребявайте ФОКУСИН, ако сте свръхчувствителни към лекарственото вещество или към някое от помощните вещества, ако страдате от сериозно чернодробно заболяване или ако страдате от световъртеж при сядане или изправяне от легнато положение.

Специални предпазни мерки

При продължителна употреба на този продукт са необходими редовни медицински прегледи. Рядко, по време на употребата на ФОКУСИН, е наблюдавана поява на слабост. При появата на първи признания на замаяност, трябва да седнете или легнете, докато те изчезнат.

Влияе ли ФОКУСИН върху способността за шофиране и работа с машини?

Няма данни ФОКУСИН да влияе върху способността за шофиране и работа с машини. Независимо от това, трябва да се има пред вид възможността от появата на световъртеж по време на лечението. Дейностите, изискващи повишено внимание, трябва да се извършват само с разрешението на лекаря.

Взаимодействия при едновременна употреба с други лекарствени продукти

Досега няма данни за взаимно повлияване на действието на ФОКУСИН и други, едновременно приемани лекарствени продукти. Независимо от това, такова взаимодействие не може да бъде изключено при всички случаи. Ето защо, Вашият лекар трябва да бъде информиран за всички лекарствени продукти, които използвате в момента или сте използвали наскоро, дори и тези, които се продават без лекарско предписание.

Как да използвам ФОКУСИН?

Придържайте се стриктно към указанията на Вашия лекар, когато използвате ФОКУСИН. Обичайната доза е една капсула дневно. Тя трябва да се приема след закуска



или след първото хранене за деня. Капсулата трябва да се погълща цяла, в седнало или изправено положение, с чаша вода. Не дъвчете капсулата.

Предозиране

Ако приемете повече капсули едновременно или в случай на инцидентно погълдане на лекарствения продукт от дете, потърсете незабавно медицинска помощ.

Забравили сте да вземете ФОКУСИН?

Ако забравите да вземете ФОКУСИН съгласно схемата, вземете капсулата по-късно през този ден. Ако установите това едва на следващия ден, продължете с обичайната доза, съгласно схемата. Не удвоявайте дозата, за да компенсирате пропуснатата.

Нежелани лекарствени реакции

Обикновено този лекарствен продукт се понася добре, но може да се појви световъртеж, особено при рязка промяна на позицията (когато сядате или се изправяте от легнало положение); нарушения на еякулацията, слабост, главоболие, сърцебиене, хрема и реакции на свръхчувствителност (обрив, сърбеж, локално подуване).

Понякога са възможни гадене и повръщане, диария или запек.

Рядко – припадък.

Много рядко приапизъм (болезнена, продължителна, нежелана ерекция, която изисква незабавно лечение).

Информирайте Вашия лекар при появата на някоя от описаните нежелани лекарствени реакции или други необичайни реакции.

Как се съхранява ФОКУСИН?

Няма специални изисквания за съхранението на ФОКУСИН.


Внимание

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се употребява след изтичането на срока на годност, който е отбелаязан върху опаковката.

Срок на годност

2 години



Последна редакция на текста: 230305

Адрес за контакти

ТП ЗЕНТИВА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД
бул. "Н. Й. Вапцаров" № 25, София 1407
тел. 9 62 41 91, 9 62 41 40

